

## Листовка: информация за потребителя

**Меропенем Каби 500 mg прах за инжекционен или инфузионен разтвор**  
**Meropenem Kabi 500 mg powder for solution for injection or infusion**

**Меропенем Каби 1 g прах за инжекционен или инфузионен разтвор**  
**Meropenem Kabi 1 g powder for solution for injection or infusion**

Меропенем (Меропенем)

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или медицинска сестра.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаките на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

### Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Меропенем Каби и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Меропенем Каби
3. Как да използвате Меропенем Каби
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Меропенем Каби
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рев. № ..... 2010325126 .....	
Разрешение № BG MAHP - 46344-12 .....	
Одобрение № ..... / 02-07-2014 .....	

### 1. Какво представлява Меропенем Каби и за какво се използва

Меропенем Каби принадлежи към група лекарства, наречени карбапенемни антибиотици. Той действа, като убива бактериите, които може да предизвикат сериозни инфекции.

- Инфекция, засягаща белите дробове (пневмония)
- Белодробни и бронхиални инфекции при пациенти, страдащи от муковисcidоза
- Усложнени инфекции на пикочните пътища
- Усложнени инфекции в корема
- Инфекции, от които може да се заразите по време на или след раждане
- Усложнени инфекции на кожата и меките тъкани
- Остра бактериална инфекция на мозъка (менингит)

Меропенем Каби може да се използва за лечение на неутропенични пациенти с треска, за която се подозира, че може да се дължи на бактериална инфекция.

Меропенем Каби може да се използва за лечение на бактериални инфекции на кръвта, които може да са свързани с някои от гореизброените инфекции

### 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Меропенем Каби

#### Не използвайте Меропенем Каби:

- ако сте алергични към меропенем или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- ако сте алергични (свръхчувствителни) към други антибиотици, напр. пеницилини, цефалоспорини или карбапенеми, тъй като може да сте алергични също и към меропенем.



## **Предупреждения и предизвикателни мерки**

Говорете с Вашия лекар или медицинска сестра, преди да използвате меропенем:

- ако имате здравни проблеми, напр. проблеми с черния дроб или бъбреците.
- ако сте имали тежка диария след прием на други антибиотици.

Вие може да развиете положителен тест (тест на Coombs), показващ наличие на антитела, които може да разрушават червените кръвни клетки. Вашият лекар ще обсъди това с вас.

Ако не сте сигурни дали нещо от споменатото по-горе се отнася за вас, говорете с Вашият лекар или медицинската сестра преди да използвате Меропенем Каби.

## **Други лекарства и Меропенем Каби**

Информирайте Вашия лекар, ако приемате, накърно сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Това се налага, защото Меропенем Каби може да повлияе начина, по който някои лекарства действат, а някои лекарства може да окажат ефект върху Меропенем Каби.

По-специално, кажете на Вашия лекар или медицинската сестра, ако приемате някои от следните лекарства:

- Пробенецид (използван за лечение на подагра).
- Валпроева киселина/натриев валпроат/валпромид (използва се за лечение на епилепсия). Меропенем Каби не трябва да се използва, защото той може да намали ефекта на натриевия валпроат.
- Перорален антикоагулантен агент (използван за лечение или предотвратяване образуването на кръвни съсиреци).

## **Бременност, кърмене и фертилитет**

Ако сте бременна или кърмите, смятайте, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Препоръчително е да се избягва употребата на меропенем по време на бременност.

Вашият лекар ще реши дали трябва да използвате меропенем.

Важно е преди да получите меропенем, да кажете на Вашия лекар, ако кърмите или възнамерявате да кърмите. Малки количества от това лекарство преминават в кърмата. Поради това, Вашият лекар ще реши дали трябва да използвате меропенем, докато кърмите.

## **Шофиране и работа с машини**

Не са провеждани проучвания на ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

Въпреки това, Меропенем Каби се свързва с главоболие, чувство за изтърпване или бодежи по кожата (парестезии) и неволеви мускулни движения, водещи до бързо и неконтролирано треперене на тялото (конвулсии), което обикновено е придружено със загуба на съзнание; като всяко едно от тези състояния може да засегне Вашата способност да шофираме или да работим с машини.

## **Меропенем Каби съдържа натрий.**

Този лекарствен продукт съдържа 1,96 mmol (или 45,13 mg) 3,92 mmol (или 90,25 mg) натрий на доза, което трябва да се има предвид при пациенти с контролиране на натрия в диетата.

Ако имате състояние, което налага да се следи приема Ви на натрий, моля уведомете Вашия лекар или медицинска сестра.

## **3. Как да използвате Меропенем Каби**



Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо попитайте Вашия лекар.

#### **Употреба при възрастни**

- Дозата зависи от вида на инфекция, мястото на инфекцията в организма и нейната сериозност. Вашият лекар ще реши от каква доза имате нужда.
- Дозата за възрастни обикновено е между 500 mg (милиграма) и 2 g (грама). Вие обикновено ще получавате една доза през 8 часа. Може обаче да получавате дозата по-рядко, ако бъбреците ви не работят много добре.

#### **Употреба при деца и юноши**

- Дозата за деца на възраст над 3 месеца и до 12 години се определя според възрастта и теглото на детето. Обичайната доза е между 10 mg и 40 mg Меропенем Каби на всеки килограм (kg) от теглото на детето. Дозата обикновено се прилага през 8 часа. Деца, които тежат повече от 50 kg, ще получат доза за възрастни.

#### **Как да използвате Меропенем Каби**

- Меропенем Каби ще Ви се приложи като инжекция или инфузия в голяма вена.
- Обикновено Меропенем Каби ще Ви се приложи от Вашият лекар или от медицинска сестра.
- Някои пациенти, родители и болногледачи обаче са обучени да прилагат Меропенем Каби вкъщи. Указания за това са дадени в тази листовка (в точката, наречена „Указания за прилагане на Меропенем Каби самостоятелно или от някой друг вкъщи“). Винаги прилагайте Меропенем Каби точно както Вашият лекар Ви е казал. Ако не сте сигурни, попитайте Вашия лекар.
- Инжекционният разтвор не трябва да се смесва или да се добавя към разтвори, съдържащи други лекарства.
- Инжектирането може да продължи около 5 минути или между 15 и 30 минути. Вашият лекар ще ви каже как да прилагате Меропенем Каби.
- Обикновено трябва да поставяте инжекциите си по едно и също време всеки ден.

#### **Ако сте приели повече от необходимата доза Меропенем Каби**

Ако случайно приложите по-голяма от предписаната доза, свържете се веднага с Вашия лекар или с най-близката болница.

#### **Ако сте пропуснали да приемете Меропенем Каби**

Ако пропуснете инжекция, трябва да я поставите възможно най-скоро. Ако обаче вече е почти време за следващата инжекция, пропуснете забравената инжекция.

Не вземайте двойна доза (две инжекции по едно и също време), за да компенсирате пропуснатата доза.

#### **Ако сте спрели употребата на Меропенем Каби**

Не спирайте приложението на Меропенем Каби, докато Вашият лекар не Ви каже.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или медицинска сестра.

#### **4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

#### **Тежки алергични реакции**

Ако имате тежка алергична реакция, спрете приема на Меропенем Каби и веднага се обърнете към лекар. Може да се нуждаете от спешно лечение. Признаките може да включват внезапна поява на:

- Тежък обрив, сърбеж или копривна треска по кожата.



- Подуване на лицето, устните, езика или други части на тялото.
- Недостиг на въздух, хрипове или затруднено дишане.

#### **Увреждане на червените кръвни клетки (неизвестна честота)**

Признаците включват:

- Задух, когато не го очаквате.
- Червена или кафява урина.

Ако забележите нещо от споменатото по-горе, **обърнете се веднага към лекар.**

#### **Други възможни нежелани реакции:**

##### **Чести (могат да засегнат до 1 на всеки 10 души)**

- Коремна (стомашна) болка.
- Позиви за повръщане (гадене).
- Повръщане.
- Диария.
- Главоболие.
- Кожен обрив, сърбеж по кожата.
- Болка и възпаление.
- Повишен брой тромбоцити в кръвта (доказва се чрез изследване на кръвта).
- Промени в кръвните тестове, включително тестовете, които показват как работи черният дроб.

##### **Нечести (могат да засегнат до 1 на всеки 100 души)**

- Промени в кръвта. Те включват намален брой тромбоцити (което може да води до по-лесно насиеняване), повишен брой на някои бели кръвни клетки, намален брой на други бели кръвни клетки и повищено количество на вещества, наречено „билирубин“. Вашият лекар може да изследва кръвта ви от време на време.
- Промени в кръвните тестове, включително тестовете, които показват как работят бъбреците ви.
- Чувство на изтръпване (боцкане).
- Инфекции на устата или влагалището, предизвикани от гъбички (млечница).
- Възпаление на червата с диария.
- Болка във вените на мястото на инжектиране на Меропенем Каби.
- Други промени в кръвта. Симптомите включват чести инфекции, висока температура и болки в гърлото. Вашият лекар може да изследва кръвта ви от време на време.
- Внезапна появя на тежък обрив или образуване на межури или обелване на кожата. Това може да се придружава от треска и ставни болки.

##### **Редки (могат да засегнат до 1 на всеки 1 000 души)**

- Припадъци (гърчове)

#### **С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)**

Сериозни реакции на свръхчувствителност, проявяващи се с повишена температура, кожен обрив и промени в кръвните изследвания, с които се проверява как функционира черният дроб (повишени нива на чернодробни ензими), и повишаване на един вид бели кръвни клетки (еозинофилия) и увеличени лимфни възли. Това може да бъдат признаци на нарушение на функциите на много органи, известно като DRESS синдром.

#### **Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване (посочена по-долу). Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)  
ул. Дамян Груев № 8,



1303, гр. София, България  
тел.: +359 2 8903 417  
уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

## 5. Как да съхранявате Меропенем Каби

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелян върху опаковката след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да не се съхранява над 30°C.

Да не се замразява.

### Инжекция

След разтваряне: готовият разтвор за интравенозна инжекция трябва да се използва незабавно. Периодът между започване на разтварянето и края на интравенозното инжектиране не трябва да надвишава:

- 3 часа, когато разтворът се съхранява при температура до 25°C;
- 12 часа, когато разтворът се съхранява при хладилни условия (2-8°C).

### Инфузия

След разтваряне: готовият разтвор за интравенозна инфузия трябва да се използва незабавно. Периодът между започване на разтварянето и края на интравенозната инфузия не трябва да надвишава:

- 3 часа, когато разтворът се съхранява при температура до 25°C, когато Меропенем Каби е разтворен в разтвор на натриев хлорид;
- 24 часа, когато разтворът се съхранява при хладилни условия (2-8°C), когато Меропенем Каби е разтворен в разтвор на натриев хлорид;
- 1 час, когато разтворът се съхранява при температура до 25°C, когато Меропенем Каби е разтворен в разтвор на декстроза;
- 8 часа, когато разтворът се съхранява при хладилни условия (2-8°C), когато Меропенем Каби е разтворен в разтвор на декстроза;

От микробиологична гледна точка, освен ако методът за отваряне/приготвяне/разреждане изключва наличието на риск от микробиологично замърсяване, продуктът трябва да се използва незабавно.

Ако не се използва незабавно, времето и условията на съхранение са отговорност на потребителя.

Не замразявайте готовият разтвор.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлят лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

### Какво съдържа Меропенем Каби

- Активното вещество е меропенем трихидрат. Всеки флакон от 20 ml / бутилка от 100 ml съдържа 500 mg меропенем. **Всеки флакон от 20 ml/50 ml, бутилка от 100 ml съдържа 1000 mg меропенем.**
- Другата съставка е натриев карбонат.



## **Как изглежда Меропенем Каби и какво съдържа опаковката**

Меропенем Каби е бял или светло жъlt прах за инжекционен или инфузионен разтвор във флакони или бутилки.

Меропенем Каби 500 mg прах за инжекционен или инфузионен разтвор се предлага в стъклени флакони от 20 ml и стъклени бутилки от 100 ml.

Меропенем Каби 1 g прах за инжекционен или инфузионен разтвор се предлага в стъклени флакони от 20 ml и 50 ml и стъклени бутилки от 100 ml.

Размери на опаковките: 1 или 10 флакони/бутилки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

### **Притежател на разрешението за употреба**

Фрезениус Каби България ЕООД

ул. Ал. Жендов 1, ет. 6, ап. 37,

1113 София, България

### **Производители, отговорни за освобождаване на партидите**

ACS Dobfar S.p.A.

Nucleo Industriale S. Atto, S. Nicolò a Tordino, 64100 Teramo

Италия

и

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

61346 Bad Homburg v.d.H., Германия

Адрес на мястото на освобождаване:

Pfingstweide 53, 61169 Friedberg

и

LABESFAL – Laboratórios Almiro S.A. (Fresenius Kabi Group)

Lagedo, 3465-157 Santiago de Besteiros

Португалия

**Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите-членки на ЕИП под следните имена:**

Meropenem Kabi 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw.  
Infusionslösung

**Австрация** Meropenem Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw.  
Infusionslösung

Meropenem Fresenius Kabi 500 mg poeder voor oplossing voor injectie of  
infusie / poudre pour solution injectable ou pour perfusion / Pulver zur  
Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung

**Белгия** Meropenem Fresenius Kabi 1 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie /  
poudre pour solution injectable ou pour perfusion / Pulver zur Herstellung einer  
Injektionslösung oder Infusionslösung

Meropenem Kabi 500 mg  
Meropenem Kabi 1 g



<b>Кипър</b>	Meropenem Kabi 500 mg, κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση Meropenem Kabi 1g, κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση
<b>Чешка република</b>	Meropenem Kabi 500 mg Meropenem Kabi 1g
<b>Дания</b>	Meropenem Fresenius Kabi
<b>Естония</b>	Meropenem Kabi 500 mg Meropenem Kabi 1000 mg
<b>Германия</b>	Meropenem Kabi 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung Meropenem Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung
<b>Гърция</b>	Meropenem Kabi 500 mg, κόνις για παρασκευή διαλύματος προς ένεση ή έγχυση Meropenem Kabi 1g, κόνις για παρασκευή διαλύματος προς ένεση ή έγχυση
<b>Унгария</b>	Meropenem Kabi 500 mg Meropenem Kabi 1 g
<b>Ирландия</b>	Meropenem 500 mg powder for solution for injection or infusion Meropenem 1 g powder for solution for injection or infusion
<b>Латвия</b>	Meropenem Kabi 500 mg pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai Meropenem Kabi 1000 mg pulveris injekciju vai infūziju šķīduma pagatavošanai
<b>Литва</b>	Meropenem Kabi 500 mg milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui Meropenem Kabi 1000 mg milteliai injekciniam arba infuziniam tirpalui
<b>Люксембург</b>	Meropenem Kabi 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung Meropenem Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung oder Infusionslösung
<b>Нидерландия</b>	Meropenem Fresenius Kabi 500 mg poeder voor oplossing voor injectie of infusie Meropenem Fresenius Kabi 1 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie
<b>Норвегия</b>	Meropenem Fresenius Kabi 500 mg, pulver til injeksjonsvæske/ infusjonsvæske, opplosning Meropenem Fresenius Kabi 1 g, pulver til injeksjonsvæske/ infusjonsvæske, opplosning
<b>Полша</b>	Meropenem Kabi
<b>Португалия</b>	Meropenem Kabi
<b>Румъния</b>	Meropenem Kabi 500 mg pulbere pentru soluție injectabilă sau perfuzabilă Meropenem Kabi 1 g pulbere pentru soluție injectabilă sau perfuzabilă
<b>Испания</b>	Meropenem Kabi 500 mg polvo para solución inyectable o para perfusión Meropenem Kabi 1 g polvo para solución inyectable o para perfusión



	Meropenem Fresenius Kabi 500 mg, pulver till injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning
<b>Швеция</b>	Meropenem Fresenius Kabi 1 g, pulver till injektionsvätska eller infusionsvätska, lösning
<b>Словения</b>	Meropenem Kabi 500 mg prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje Meropenem Kabi 1 g prašek za raztopino za injiciranje ali infundiranje
<b>Словакия</b>	Meropenem Kabi 500 mg Meropenem Kabi 1 g
<b>Обединено кралство</b>	Meropenem 500 mg powder for solution for injection or infusion Meropenem 1 g powder for solution for injection or infusion

**Дата на последно преразглеждане на листовката януари 2019 г.**

#### Съвети/медицинско обучение

Антибиотиците се използват за лечение на инфекции, причинени от бактерии. Те нямат ефект срещу инфекции, причинени от вируси.

Понякога, някоя инфекция, причинена от бактерии, не се повлиява от курса на лечение с антибиотик. Една от най-честите причини за това е резистентността на бактериите, предизвикали инфекцията, към прилагания антибиотик. Това означава, че те може да преживяват и дори да се размножават въпреки антибиотика.

Бактериите може да станат резистентни към антибиотиците по много причини. Внимателната употреба на антибиотици може да помогне за намаляване на възможността бактериите да станат резистентни към тях.

Когато Вашият лекар предпише курс на лечение с антибиотик, той е предназначен за лечение само на текущото ви заболяване.

Като обърнете внимание на следните съвети, вие ще помогнете да се предотврати появата на резистентни бактерии, които може да попречат на действието на антибиотика.

1. Много е важно да приемате антибиотика в правилната доза, правилен брой пъти и правилен брой дни. Прочетете указанията върху етикета и, ако не разбираете нещо, помолете Вашия лекар или фармацевт да ви го обяснят.
2. Не трябва да приемате антибиотик, освен ако не е предписан специално за вас, като трябва да го използвате само за лечение на инфекцията, за която е предписан.
3. Не трябва да приемате антибиотици, предписани на други хора, дори и ако те имат инфекция, подобна на вашата.
4. Не трябва да давате предписани на вас антибиотици на други хора.
5. Ако имате изостанал антибиотик, след като се завършили курса на лечение както Вашият лекар ви е казал, трябва да занесете остатъка в аптеката, за да се изхвърли по подходящ начин.

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

**Указания за прилагане на Меропенем Каби самостоятелно или от някой друг възможен начин**



Някои пациенти, родители и болногледачи са обучени да прилагат Меропенем Каби вкъщи.

**Предупреждение – това лекарство трябва да се прилага от Вас или от някой друг вкъщи само след обучение от лекар или медицинска сестра.**

#### **Как се приготвя това лекарство**

- Лекарството трябва да се смеси с друга течност (разредител). Вашият лекар ще ви каже колко разредител да използвате.
- Прилагайте лекарството веднага след приготвянето му. Не го замразявайте.

1. Измийте си ръцете и ги изсушете много добре. Пригответе чиста работна повърхност.
2. Извадете бутилката (флакона) Меропенем Каби от опаковката. Проверете флакона и срока на годност. Проверете дали флаконът е с ненарушена цялост и дали не е повреден.
3. Махнете цветната капачка и почистете гumenата запушалка с тампон, напоен в алкохол. Оставете гumenата запушалка да изсъхне.
4. Прикрепете нова стерилна игла към нова стерилна спринцовка, без да докосвате краищата.
5. Изтеглете препоръчаното количество стерилна вода за инжекции в спринцовката. Количество на течността, което ви е необходимо, е показано в таблицата по-долу:

Доза на Меропенем Каби	Количество вода за инжекции, необходимо за разреждането
500 mg (милиграми)	10 ml (милилитри)
1 g (грамм)	20 ml
1,5 g	30 ml
2 g	40 ml

**Моля имайте предвид:** Ако предписаната доза Меропенем Каби е повече от 1g, ще трябва да използвате повече от 1 флакон Меропенем Каби. Тогава може да изтеглите течността от фланконите в една спринцовка.

6. Вкарайте иглата на спринцовката през центъра на гumenата запушалка и инжектирайте препоръчаното количество вода за инжекции във флакона или фланконите Меропенем Каби.
7. Махнете иглата от фланкона и го разклатете добре за около 5 секунди или докато цялото количество прах се разтвори. Почистете гumenата запушалка още веднъж с друг тампон със спирт и я оставете да изсъхне.
8. При натиснато до края бутало на спринцовката вкарайте отново иглата в гumenата запушалка след това, като държите и спринцовката, и фланкона, обърнете фланкона наопъки.
9. Като държите върха на иглата в течността, издърпайте буталото и изтеглете цялото количество течност от фланкона в спринцовката.
10. Махнете иглата и спринцовка от фланкона и изхвърлете фланкона на безопасно място.



11. Дръжте спринцовката изправена с иглата нагоре. Потупайте спринцовката, така че останалите мехурчета в течността да се издигнат до върха на спринцовката.
12. Отстранете останалия въздух в спринцовката, като натискате леко буталото до излизане на целия въздух.
13. Ако прилагате Меропенем Каби вкъщи, изхвърлете всички игли и инфузционни системи по подходящ начин. Ако Вашият лекар реши да спре лечението ви, изхвърлете цялото количество неизползван Меропенем Каби по подходящ начин.

#### **Поставяне на инжекцията**

Може да приложите това лекарство през къса канюла или венозен катетър или през порт или централен източник.

#### **Приложение на Меропенем Каби през къса канюла или венозен катетър**

1. Махнете иглата от спринцовката и я изхвърлете внимателно в контейнер за остри предмети.
2. Почистете края на късата канюла или венозния катетър с тампон със спирт и го оставете да изсъхне. Отворете капачката на канюлата и прикрепете спринцовката.
3. Бавно натиснете буталото на спринцовката, така че да приложите антибиотика равномерно в продължение на около 5 минути.
4. След като приключите с приложението на антибиотика и спринцовката е празна, махнете спринцовката и използвайте течността за промиване, препоръчана от Вашия лекар или медицинската сестра.
5. Затворете капачката на канюлата и внимателно изхвърлете спринцовката в контейнер за остри предмети.

#### **Прилагане на Меропенем Каби през порт или централен източник**

1. Махнете капачката на порта или централния източник, почистете края на централния източник с тампон със спирт и го оставете да изсъхне.
2. Прикрепете спринцовката и бавно натиснете буталото на спринцовката, така че да приложите антибиотика равномерно в продължение на около 5 минути.
3. След като приключите с приложението на антибиотика, махнете спринцовката и използвайте течността за промиване, препоръчана от Вашия лекар или медицинската сестра.
4. Сложете нова чиста капачка на централния източник и внимателно изхвърлете спринцовката в контейнер за остри предмети.

