

## Листовка: информация за пациента

### МупироДермал 20 mg/g маз MupiroDermal 20 mg/g ointment

Мупироцин/Mupirocin

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

#### Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява МупироДермал 20 mg/g маз и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате МупироДермал 20 mg/g маз
3. Как да използвате МупироДермал 20 mg/g маз
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате МупироДермал 20 mg/g маз
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. № .....	Л2200059
Разрешение № .....	Б6/174/176-522
Одобрене № .....	125-03-2020

#### 1. Какво представлява МупироДермал 20 mg/g маз и за какво се използва

Активното вещество в това лекарство е антибиотикът мупироцин.

МупироДермал 20 mg/g маз е локален антибиотик, който се използва за лечение на бактериални инфекции на кожата. Прилага се също така за избягване на бактериално замърсяване при малки кожни рани и охлувания.

#### 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате МупироДермал 20 mg/g маз

##### Не прилагайте МупироДермал 20 mg/g маз

- ако сте алергични към мупироцин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

##### Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате МупироДермал 20 mg/g маз.

МупироДермал 20 mg/g маз може да причини дразнене на кожата и алергични реакции (вж. точка 4).

МупироДермал 20 mg/g маз не е подходящ за:

- инфекции на очите;
- приложение вътре в носа;



- приложение върху кожата в близост до поставени канюли (тъбички, служещи за въвеждане на лекарства и течности във Вашето тяло).

Пазете МупироДермал 20 mg/g маз далеч от очите си. Ако по невнимание лекарството попадне в очите Ви, изплакнете ги щателно с вода.

#### **Други лекарства и МупироДермал 20 mg/g маз**

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, насъкоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.

#### **Бременност, кърмене и фертилитет**

Ако сте бременна или кърмите, смятайте, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Ако се налага третиране на засегнато зърно при кърмещи жени, то трябва да се измие старательно преди кърмене.

#### **Шофиране и работа с машини**

МупироДермал 20 mg/g маз не повлиява способностите за шофиране или работа с машини.

### **3. Как да прилагате МупироДермал 20 mg/g маз**

Винаги използвайте това лекарство, точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### **Дозировка**

*Възрастни, деца и пациенти в старческа възраст (над 65 години)*

2 до 3 пъти на ден в продължение на до 10 дни, в зависимост от повлияването.

#### **Начин на приложение**

- Измивайте ръцете си преди и след приложение на МупироДермал 20 mg/g маз.
- С парче чист памук или марлен тампон, нанесете малко количество от масти, така че да се покрие засегнатия участък.
- След прилагане на лекарството може да покриете лекуваната област със стерилина превръзка или марля, освен ако Вашият лекар Ви е казал да не я покривате.
- Не смесвайте МупироДермал 20 mg/g маз с други лосиони, кремове или мази, за да се избегне възможността от разреждане на лекарството и намаляване на неговата активност, както и от нарушаване на стабилността на масти.

#### **Ако сте приложили повече от необходимата доза МупироДермал 20 mg/g маз**

Ако случайно сте приложили по-голямо от необходимото количество маз, можете да го отстраниТЕ с помощта на памучен тампон. Вероятността да възникнат някакви усложнения при предозиране с това лекарство е много малка.

#### **Ако сте пропуснали да приложите МупироДермал 20 mg/g маз**

Ако сте пропуснали да приложите необходимата доза, направете това веднага щом се сетите, а следващата доза приложете по обичайното време.

#### **Ако сте спрели приема на МупироДермал 20 mg/g маз**

Не спирайте лечението преждевременно, защото е важно да завършите пълния курс на лечение с това лекарство, за да намалите вероятността за възвръщане на инфекцията и да предизвикате развитие на устойчиви бактерии.



Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### 4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

##### Състояния, за които трябва да следите

###### Тежки алергични реакции

Те са много редки при хора, прилагачи муцинист маз. Признаките включват:

- надигнат и сърбящ обрив;
- подуване на лицето, устата, езика, затруднено дишане;
- колапс или загуба на съзнание.

При появата им, спрете приложението на лекарството и незабавно се обърнете към лекар.

Ако развиете тежка кожна реакция или алергия, спрете приложението, избършете лекарството и се обърнете към Вашия лекар възможно най-скоро.

В редки случаи, лекарства като Муцинист Дермал 20 mg/g маз могат да причинят възпаление на дебелото черво, което води до диария, обикновено с кръв и слуз, болка в стомаха, висока температура (псевдомемранозен колит).

Уведомете Вашия лекар възможно най-скоро, ако получите някой от тези симптоми.

**Чести нежелани реакции** (могат да засегнат до един на всеки 10 пациенти): парене в мястото на приложение.

**Нечести нежелани реакции** (могат да засегнат до един на всеки 100 пациенти): сърбеж, зачревяване, щипане и/или сухота на кожата в мястото на приложение.

**Много редки нежелани реакции** (могат да засегнат до един на всеки 10 000 пациенти): тежки алергични реакции (анафилаксия, генерализиран обрив, уртикария и ангиоедем).

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

##### Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също така да съобщите за нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +35928903417

уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

#### 5. Как да съхранявате Муцинист Дермал 20 mg/g маз

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Да се съхранява при температура под 25°C.



Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.  
Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.  
Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

### Какво съдържа МупироДермал 20 mg/g маз

- Активното вещество в 1 g маз е мупироцин 20 mg.
- Другите съставки (помощни вещества) са: макрогол 3350, макрогол 400.

### Как изглежда МупироДермал 20 mg/g маз и какво съдържа опаковката

МупироДермал 20 mg/g представлява маз с еднородна консистенция и бял до почти бял цвят.

МупироДермал 20 mg/g маз по 15 g в алюминиеви туби с пластмасова капачка на винт.  
Една туба с листовка за пациента, опакована в картонена кутия.

### Притежател на разрешението за употреба

Антибиотик-Разград АД  
бул. "Априлско въстание" 68, офис 201  
7200 Разград

### Производител

Балканфarma-Разград АД  
бул. „Априлско въстание“ № 68  
7200 Разград, България

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Антибиотик-Разград АД  
бул. "Априлско въстание" 68, офис 201  
7200 Разград  
Тел. +359 084 613 427

Дата на последно преразглеждане на листовката 02/2020

