

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка Приложение 2	
Към Рег. №	20000467
Разрешение №	-70956 20-01-2026
ВГ/МА/МР	
Съставител №	

Листовка: информация за потребителя

Нео-ангин без захар 1,20 mg/0,60 mg/5,72 mg таблетки за смучене
2,4 - дихлоробензил алкохол/амилметакрезол/левоментол

Neo-angin sugar free 1,20 mg /0,60 mg /5,72 mg lozenges
2,4 – dichlorobenzyl alcohol/amylnetacresol/levomenthol

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство, точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3-4 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Нео-ангин без захар и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Нео-ангин без захар
3. Как да приемате Нео-ангин без захар
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Нео-ангин без захар
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Нео-ангин без захар и за какво се използва

За симптоматично лечение на леки инфекции в устната кухина, вкл. ларингити, фарингити, тонзилити, гингивити.

Показан е за възрастни, юноши и деца на и над 6-годишна възраст.

Ако след 3-4 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Нео-ангин без захар

Не приемайте Нео-ангин без захар

- Ако сте алергични към някое от активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки



Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Нео-ангин без захар.

Деца

Не давайте Нео-ангин без захар на деца под 6-годишна възраст. За лечение с Нео-ангин без захар децата трябва да могат контролирано да смучат таблетки.

Други лекарства и Нео-ангин без захар

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства. Не са известни взаимодействия с други лекарства.

Нео-ангин без захар с храни и напитки

Нео-ангин без захар може да се приема независимо от храненията.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност

Няма или има ограничени клинични данни за употребата на активните вещества при бременни жени.

Проучвания при животни не показват преки или непреки вредни ефекти по отношение на репродуктивната токсичност. Поради недостатъчна информация не е възможно напълно да се изключат рисковете за плода, поради което употребата на това лекарство не се препоръчва по време на бременност.

Кърмене

Няма достатъчно информация за отделянето на активните вещества/метаболити в кърмата. Поради това Нео-ангин без захар не трябва да се използва по време на кърмене.

Фертилитет

Не са провеждани проучвания за оценка на ефектите върху фертилитета.

Шофиране и работа с машини

Няма данни за ефект върху способността за шофиране и работа с машини. Не са провеждани подходящи проучвания.

Нео-ангин без захар таблетки за смучене съдържа кохинил червено А (E124) и изомалт (E953)

Нео-ангин без захар таблетки за смучене съдържат оцветителя кохинил червено А (E124), който може да предизвика алергични реакции.

Нео-ангин без захар таблетки за смучене съдържат 2,58 g изомалт (E953), като заместител на захарта в една таблетка за смучене, което отговаря на 6 kcal (26 kJ).

Това трябва да се има предвид при болни със захарен диабет. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него преди да вземете този лекарствен продукт.

Изомалт може да има слабо изразено слабително действие



Оцветителят в този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на таблетка за смучене, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.

3. Как да приемате Нео-ангин без захар

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

Ако не Ви е предписано друго от Вашия лекар, възрастни и деца над 6 годишна възраст оставят по 1 таблетка за смучене да се разтопи бавно в устата на всеки 2-3 часа. Максималната дневна доза е 6 таблетки за смучене.

Продължителност на лечението

Трябва да се свържете с Вашия лекар, ако симптомите Ви се влошат или не се подобрят след 3-4 дни.

Ако сте приели повече от необходимата доза Нео-ангин без захар

Досега не са докладвани случаи на предозиране.

В много малко вероятния случай на предозиране, описаните нежелани реакции могат да се засилят. В такъв случай се препоръчва симптоматично лечение.

Ако сте пропуснали да приемете Нео-ангин без захар

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка за смучене.

Ако сте спрели употребата на Нео-ангин без захар

Няма опасност от възникване на никакви проблеми при спиране на употребата на Нео-ангин без захар.

Ако имате никакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако получите някоя от следните нежелани реакции, спрете употребата на Нео-ангин без захар и незабавно се свържете с Вашия лекар:

Много редки (може да засегнат до 1 на 10 000 човека): дразнене на лигавицата на устата и стомаха, като диспепсия, повръщане.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка): алергични реакции, като подуване на устата, езика и устните, обрив.



Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата:

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Тел.: +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Нео-ангин без захар

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява при температура под 30° C.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт, как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Нео-ангин без захар

- Активните вещества са: 2,4-дихлоробензилов алкохол, амилметакрезол левоментол
Една таблетка за смучене съдържа: 2,4-дихлоробензил алкохол 1,20 mg, амилметакрезол 0,60 mg, левоментол 5,72 mg
- Другите съставки са: Масло от звездовиден анасон, масло от лютив мента, изомалт, винена киселина, кохинил червено А (E124), съдържащ натрий

Как изглежда Нео-ангин без захар и какво съдържа опаковката

Червени, кръгли полупрозрачни таблетки за смучене.

Оригинална опаковка – картонена кутия с 16 и 24 таблетки за смучене в блистери от PVC/PVdC и алуминиево фолио.

Притежател на разрешението за употреба

Divapharma GmbH

Motzener Strasse 41

12277 Berlin

Германия



Производител
Klosterfrau Berlin GmbH
Motzener Strasse 41
12277 Berlin
Германия

Дата на последно преразглеждане на листовката
Декември/2025

