

Листовка: информация за пациента
Неотри MR 35 mg таблетки с изменено освобождаване
Neotri MR 35 mg modified-release tablets
Триметазиidinов дихидрохлорид/Trimetazidine dihydrochloride

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежеланите лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Неотри MR и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Неотри MR
3. Как да приемате Неотри MR
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Неотри MR
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20120501
Разрешение №	B6/MR/MR-76616
Одобрение №	18-07-2019

1. Какво представлява Неотри MR и за какво се използва

Това лекарство се препоръчва при:

- Кардиология:

Продължително лечение на исхемична болест на сърцето; профилактика на стенокардни пристъпи като самостоятелна терапия или едновременно с други продукти.

- Оториноларингология:

Лечение на проблеми на слуха и равновесието от исхемично естество, като световъртеж, шум в ушите, намален слух.

2. Какво трябва да знаете преди да приемете Неотри MR

Следвайте внимателно всички инструкции на Вашия лекар. Те може да се различават от общата информация в тази листовка.

Не приемайте Неотри MR

- ако сте алергичен към триметазидин или към някоя от другите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Ако някое от гореизброените важи за Вас, уведомете Вашия лекар, преди да започнете да приемате Неотри MR.

Предупреждения и предпазни мерки

Това не е лекарствен продукт за овладяване на стенокардни пристъпи, както и за първоначално лечение на нестабилна стенокардия или миокарден инфаркт. Не трябва да се използва в периода преди и през първите дни на хоспитализация.



Ако някое от тези състояния се отнася за Вас, информирайте Вашия лекар. Той ще го има предвид по време на лечението Ви с Неотри MR.

Други лекарства и Неотри MR

Не се съобщават случаи на лекарствени взаимодействия.

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност

Поради съображения за сигурност е препоръчително да се избягва назначаването на продукта по време на бременност.

Кърмене

Поради липса на данни за излъчването на продукта с кърмата, не се препоръчва лечение по време на кърмене.

Шофиране и работа с машини

Триметазидин няма или има пренебрежим ефект върху способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Неотри MR

Не е приложимо.

3. Как да приемате Неотри MR

Винаги приемайте Неотри MR, точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обичайната дозировка на Неотри MR е една таблетка по време на хранене сутрин и вечер.

Таблетката трябва да се погълне цяла, с чаша вода или друга течност.

Ако сте приели повече от необходимата доза Неотри MR

Ако сте приели прекалено много таблетки Неотри MR или ако някой друг случайно е приел Вашите таблетки, обърнете се незабавно за съвет към Вашия лекар или към най-близката болница. Покажете им опаковката с таблетките. Може да се наложи провеждане на лечение.

Ако сте пропуснали да приемете Неотри MR

- приемете дозата веднага, щом се сетите и след това вземете следващата доза в обичайното време.
- не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако сте спрели приема на Неотри MR

Не спирайте приема на Неотри MR, докато Вашият лекар не Ви каже.



Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички останали лекарства, Неотри MR може да причини някои нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други нежелани реакции, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Най-често наблюдавани са незначителни стомашно-чревни смущения като коремна болка, диария, затруднено храносмилане, гадени и повръщане.

Често се наблюдават обща слабост, обрив, сърбеж, сърбящ кожен обрив (уртикария), световъртеж и главоболие.

Редки са случаите на съдове нарушения като понижаване на кръвното налягане при изправяне и зачервяване.

Много редки са случаите на екстрапирамидални симптоми (треперене, скованост, липса на движения) и те са обратими след прекратяване на лечението.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев“ № 8
1303 София
тел.: +35 928903417
уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Неотри MR

Няма специални условия за съхранение.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Неотри MR след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Неотри MR

- Активната съставка е триметазидинов дихидрохлорид (trimetazidine dihydrochloride).



- Другите съставки са: натриев хлорид, повидон, магнезиев стеарат, хипромелоза, целулозен ацетат.

Как изглежда Неотри MR и какво съдържа опаковката

Картонена кутия с 60 таблетки в запечатани блистерни опаковки (PVC/PVDC/Aluminium).

Притежател на разрешението за употреба

НЕО БАЛКАНИКА ЕООД

Ул. „Земляне” 35

София 1618

България

Производител, отговорен за освобождаване на партидите

МС ФАРМА АД

Ул. „Земляне” 35

София 1618

България

Дата на последно преразглеждане на листовката

Април 2019 г.

