

Листовка: информация за пациента

Листовка - Приложение 2

Към Ред. №

20090198

Нолипрел Би-Форте 10 mg/2,5 mg филмирали таблетки

периндоприл аргинин/индапамид

Noliprel Bi-Forte 10 mg/2.5 mg film-coated tablets

(perindopril arginine/indapamide)

№

№

№

08-10-2019

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате никакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че признаците на тяхното заболяване са същите, като Вашите.
- Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Нолипрел Би-Форте и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Нолипрел Би-Форте
3. Как да приемате Нолипрел Би-Форте
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Нолипрел Би-Форте
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Нолипрел Би-Форте и за какво се използва

Нолипрел Би-Форте представлява комбинация от две активни съставки периндоприл и индапамид. Той е антихипертензивно средство и се използва за лечение на високо кръвно налягане (хипертония). Нолипрел Би-Форте се предписва на пациенти, които вече приемат 10mg периндоприл и 2,5mg индапамид в отделни таблетки, тези пациенти могат вместо това да приемат една таблетка Нолипрел Би-Форте, която съдържа и двете съставки.

Периндоприл принадлежи към клас от лекарства, наречени ACE инхибитори. Те действат чрез разширяване на кръвоносните съдове, което облекчава сърцето при изпомпването на кръв през тях. Индапамид е диуретик. Диуретиците увеличават количеството на урината произвеждана от бъбреците. Индапамид, обаче, е различен от другите диуретици, тъй като води до много леко повишаване на количеството образувана урина. Всяка от активните съставки понижава кръвното налягане, а приети заедно те водят до по-добро контролиране на кръвното Ви налягане.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Нолипрел Би-Форте**Не приемайте Нолипрел Би-Форте**

- ако сте алергични към периндоприл или някой друг ACE инхибитор, или към индапамид или други сулфонамиди или към някоя от останалите съставки на това лекарство, (изброени в точка 6),
- ако получавали симптоми, като например свирещо дишане, оток на лицето или езика, силен сърбеж или тежки кожни обриви, при предишно лечение с ACE инхибитор или ако Ваши кръвни роднини са имали при други обстоятелства такива симптоми (състояние наречено ангионевротичен оток),
- ако имате диабет или нарушена бъбречна функция и се лекувате с лекарство за понижаване на кръвното налягане, съдържащо алискрирен.
- ако сте с тежко чернодробно заболяване или страдате от състояние, наречено чернодробна енцефалопатия (дегенеративно заболяване на мозъка),



- ако сте с бъбречно заболяване, при които снабдяването на Вашите бъбреци с кръв е намалено (стеноза на бъбречната артерия),
- ако сте на диализно лечение, или някакъв друг вид филтрация на кръвта. В зависимост от апаратата, който се използва, Нолипрел Би-Форте може да е неподходящ за Вас,
- ако сте с нисък калий в кръвта,
- ако има съмнение, че сте с нелекувана сърдечна декомпенсация (тежка задръжка на вода, затруднено дишане),
- ако сте бременно след третия месец (по-добре е също така да избягвате Нолипрел Би-Форте през ранната бременност - вижте точка "Бременност и кърмене"),
- ако кърмите,
- ако провеждате лечение със сакубитрил/валсартан, лекарство, използвано за лечение на сърдечна недостатъчност (вж. "Предупреждения и предпазни мерки" и „Други лекарства и Нолипрел Би-Форте“).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Нолипрел Би-Форте:

- ако сте с аортна стеноза (стесняване на главния кръвоносен съд излизащ от сърцето) или хипертрофична кардиомиопатия (заболяване на сърдечния мускул) или стеноза на реналните артерии (стесняване на артерията снабдяваща бъбреца с кръв),
- ако имате сърдечна недостатъчност или други проблеми със сърцето,
- ако имате проблеми с бъбреците или сте на диализа,
- имате необичайно повишени нива на хормон в кръвта, наречен алдостерон (първичен алдостеронизъм),
- ако сте с чернодробни проблеми,
- ако страдате от колагеноза (кожна болест), като например системен лупус еритематозус или склеродермия,
- ако имате атеросклероза (втвърдяване на артериите),
- ако страдате от хиперпаратиреоидизъм (повишенена активност на парашитовидната жлеза),
- ако страдате от подагра,
- ако сте с диабет,
- ако сте на диета с ограничение на солта или използвате заместители на готварската сол съдържащи калий,
- ако приемате литиеви препарати или калий-съхраняващи лекарства (спиронолактон, триамтерен), или калиеви добавки, тъй като тяхната употреба с Нолипрел Би-Форте трябва да се избяга (вижте точка "Прием на други лекарства").
- ако сте в старческа възраст,
- ако сте имали реакции на фотосенсибилизация,
- ако имате тежка алергична реакция с подуване на лицето, устните, устата, езика или гърлото, която може да затрудни прегълъщането или дишането (ангиоедем). Това може да се случи по всяко време на лечението. Ако развиете такива симптоми, трябва да спрете лечението и незабавно да посетите лекар.
- Ако приемате някое от следните лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане:
 - „ангистензин II рецепторен блокер“ (ARB) (известни още като сартани – например валсартан, телмисартан, ирбесартан) особено, ако имате бъбречни проблеми, свързани с диабет.
 - алискрирен.

Вашият лекар може периодично да проверява бъбречната Ви функция, кръвното налягане и количеството на електролитите (напр. калий) в кръвта Ви.

Вижте също информацията озаглавена „Не приемайте с Нолипрел Би-Форте“.

- ако сте с чернокож произход, тъй като рисъкът за ангиоедем при Вас може да е по-голям и това лекарство може да е по-малко ефективно за понижаване на кръвното Ви налягане, отколкото при пациенти, които не са чернокожи,
- ако сте пациент на хемодиализа с мембрани с висока скорост на потока (high flux),
- рисъкът от ангиоедем е повышен, ако приемате някое от следните лекарства:
 - рацеадотрил (използван за лечение на диария)
 - сиролимус, еверолимус, темсиролимус и други лекарства, принадлежащи към клас лекарствени продукти, наречени mTOR инхибитори (използвани, за да се предотврати отхвърлянето на трансплантирани органи),



- сакубитрил (наличен като фиксирана дозова комбинация с валсартан), използвани за продължително лечение на сърдечна недостатъчност.

Ангиоедем

Ангиоедем (тежка алергична реакция с подуване на лицето, устните, устата, езика или гърлото, която може да затрудни прегълъщането или дишането) е съобщен при пациенти, лекувани с ACE инхибитори, включително с Нолипрел Би-Форте. Това може да се случи по всяко време на лечението. Ако развиете такива симптоми, трябва да спрете лечението с Нолипрел Би-Форте и незабавно да посетите лекар. Вижте също т.4.

Кажете на Вашия лекар ако мислите, че сте бременна, или че може да забременеете. Нолипрел Би-Форте не се препоръчва през ранната бременност и не трябва да се взема, ако сте бременна след третия месец, тъй като може да навреди сериозно на Вашето бебе ако се използва през този период (вж. «Бременност и кърмене»).

Ако приемате Нолипрел Би-Форте, Вие трябва да уведомите Вашия лекар или медицинския персонал:

- ако трябва да бъдете подложен(а) на анестезия и/или операция,
- ако насконо сте имали диария или повръщане, или сте обезводнен(а),
- ако трябва да бъдете подложен(а) на диализа или LDL афереза (което представлява отстраняване на холестерол от Вашата кръв с помощта на машина),
- ако трябва да бъдете подложен(а) на десенсибилизация за намаляване на ефектите от алергията към ужилване от пчела или оса,
- ако трябва да бъдете подложен(а) на медицинско изследване, което изисква инжектиране на йод-съдържащо контрастно вещество (вещество, което прави видими на рентген органи като бъбрец или стомах).
- ако имате промяна в зрението или болка в едното или в двете очи докато вземате Нолипрел Би-Форте. Това би могло да е признак, че развивате глаукома, което е повишаване на налягането в окото (очите). Трябва да прекратите лечението с Нолипрел Би-Форте и да потърсите лекарска помощ.

Спортистите трябва да знаят, че Нолипрел Би-Форте съдържа активно вещество (индапамид), което може да предизвика позитивиране на резултатите при допингов контрол.

Деца и юноши

Нолипрел Би-Форте не трябва да се дава на деца и юноши.


Други лекарства и Нолипрел Би-Форте

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, или насконо сте приемали или има вероятност да приемате каквито и да било други лекарства

Трябва да се избягва употребата на Нолипрел Би-Форте с:

- литиеви препарати (използват се за лечение на мания или депресия),
- алискирен (лекарство за лечение на хипертония), ако нямате захарен диабет или проблеми с бъбреците,
- калий-съхраняващи диуретици (триамтерен, амилорид), калиеви соли, други лекарства, които могат да повишат калия в тялото (такива като хепарин и ко-тримоксазол, познат още като триметоприм/сулфаметоксазол),
- естромугин (използван при лечение на рак),
- други лекарства за лечение на високо кръвно налягане: инхибитори на ангиотензин-конвертиращ ензим и ангиотензин-рецепторни блокери.

Лечението с Нолипрел Би-Форте може да бъде повлияно от други лекарства. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозата Ви и/или да вземе други предпазни мерки. Непременно съобщете на Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства, тъй като може да е необходимо специално внимание:



- други лекарства за лечение на високо кръвно налягане, включително ангиотензин II рецепторни блокери (ARB) или алискирен (вижте също информацията озаглавена „Не приемайте Нолипрел Би-Форте“ и „Предупреждения и предпазни мерки при употреба“) или диуретици (лекарства, които увеличават количеството урина, произведено от бъбреците),
- калий-съхраняващи лекарства за лечение на сърдечна недостатъчност: еplerенон и спиронолактон в дози от 12,5 mg до 50 mg на ден,
- лекарства, които най-често се използват за лечение на диария (рацекадотрил) или за да се избегне отхвърлянето на трансплантирани органи (сиролимус, еверолимус, темсиролимус и други лекарства, принадлежащи към клас лекарствени продукти, наречени mTOR инхибитори).
Вж.точка „Предупреждения и предпазни мерки при употреба“,
- сакубитрил/валсартан (използвани за продължително лечение на сърдечна недостатъчност).
Вж.точки „Не приемайте Нолипрел Би-Форте“ и „Предупреждения и предпазни мерки при употреба“.
- анестетични средства,
- йодно контрастно вещество,
- моксифлоксацин, спарфлоксацин (антибиотици: лекарства за лечение на инфекции),
- метадон (използван за лечение на зависимост),
- прокайнамид (за лечение на неритмична сърдечна дейност),
- алопуринол (за лечение на подагра),
- мизоластин, терфенадин или астемизол (антихистаминови препарати за сенна хрема или алергии),
- кортикоステроиди използвани за лечение на различни състояния, включително тежка астма и ревматоиден артрит,
- имуносупресори използвани за лечение на автоимунни нарушения или след транспланционна хирургия за предотвратяване на отхвърлянето на присадения орган (напр. циклоспорин, таクロнимус),
- инжекционен еритромицин (антибиотик),
- халофантрин (използва се за лечение на някои видове малария),
- пентамидин (използва се за лечение на пневмония),
- инжекционни златни препарати (използвани за лечение на ревматоидни полиартрити),
- винкамин (използва се за лечение на симптоматични нарушения на познавателната функция при напреднала възраст, включително при загуба на паметта),
- бепридил (използва се за лечение на ангине пекторис),
- лекарства, които се използват при проблеми със сърдечния ритъм (напр. хинидин, хидрохинидин, дизопирамид, амиодарон, сotalол),
- цизаприд, дифеманил (използвани за лечение на стомашни и храносмилателни проблеми),
- дигоксин или други сърдечни гликозиди (за лечение на кардиологични проблеми),
- баклофен (за лечение на мускулна скованост настъпваща при заболявания като множествена склероза),
- лекарства за лечение на диабет, като например инсулин, метформин или глиптини,
- калциеви препарати включително калциеви добавки,
- слабителни средства стимулиращи перисталтиката (напр. сена),
- нестероидни противовъзпалителни средства (напр. ибупрофен) или високи дози салицилати (напр. аспирин),
- амфотерицин B в инжекции (за лечение на остри гъбични заболявания),
- лекарства за лечение на психични разстройства, като например депресия, тревожност, шизофрения... (напр. трициклични антидепресанти, невролептици) като амисулприд, сулпирид, султоприд, тиаприд, халоперидол, дроперидол,
- тетракозактид (за лечение на болестта на Крон),
- триметоприм (за лечение на инфекции),
- вазодилататори включително нитрати (лекарства, които разширяват кръвоносните съдове)
- лекарства, използвани за лечение на ниско кръвно налягане, шок или астма (напр. ефедрин, норадреналин или адреналин).

Нолипрел Би-Форте с храни и напитки

За предпочтане е Нолипрел Би-Форте да се приема преди хранене.

Бременност и кърмене



Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна, или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди употребата на това лекарство.

Бременност

Обикновено Вашият лекар ще Ви посъветва да спрете приема на Нолипрел Би-Форте преди да забременеете или веднага щом разберете, че сте бременна и ще ви посъветва да вземете друго лекарство вместо Нолипрел Би-Форте. Нолипрел Би-Форте не се препоръчва при ранна бременност и не трябва да се взема след третия месец от бременността, тъй като може сериозно да навреди на Вашето бебе ако се използа след третия месец от бременността.

Кърмене

Нолипрел Би-Форте е противопоказан при майки, които кърмят, и Вашият лекар може да избере друго лечение за Вас ако искате да кърмите особено ако бебето Ви е новородено или преждевременно родено.

Говорете с Вашия лекар незабавно.

Шофиране и работа с машини

Нолипрел Би-Форте обикновено не повлиява състоянието на бдителност, но при някои пациенти могат да настъпят индивидуални реакции като виене на свят и слабост, свързани с понижаване на кръвното налягане. В резултат на това може да се наруши способността за шофиране или работа с машини.

Нолипрел Би-Форте съдържа лактоза (вид захар).

Ако Вашият лекар Ви е съобщил, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да започнете да приемате този лекарствен продукт.

Нолипрел Би-Форте съдържа натрий

Нолипрел Би-Форте съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) за една таблетка, което по същество означава, че не съдържа натрий.

3. Как да приемате Нолипрел Би-Форте

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е една таблетка дневно. За предпочтение е да приемате таблетката си сутрин и преди хранене. Приемайте таблетката с чаша вода.

Ако сте приели повече от необходимата доза Нолипрел Би-Форте

Ако сте приели повече таблетки, незабавно се свържете с Вашия лекар или най-близкото медицинско заведение за спешна помощ. Ако кръвното Ви налягане спадне значително (свързано с гадене, повръщане, спазми, замаяност, съниливост, психическа обърканост, промяна на количеството урина, произведена от бъбреците), заемането на хоризонтално положение на тялото с повдигнати долни крайници може да Ви бъде от полза.

Ако сте пропуснали да приемете Нолипрел Би-Форте

Важно е да приемате Вашето лекарство всеки ден, тъй като редовното лечение е по-ефективно. Ако, обаче, пропуснете да вземете една доза Нолипрел Би-Форте, вземете следващата доза по обичайното време. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Ако сте спрели приема на Нолипрел Би-Форте

Тъй като лечението на кръвното налягане е обично за цял живот, Вие трябва да се посъветвате с Вашия лекар преди да спрете приемането на този лекарствен продукт.

Ако имате никакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.



4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, и това може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Спрете да приемате този лекарствен продукт и незабавно посетете лекар, ако почувстввате някоя от следните нежелани реакции които могат да са сериозни :

- Тежък световъртеж или припадане поради ниско кръвно налягане (Чести – могат да засегнат до 1 на 10 человека)
- Бронхоспазъм (стягане в гърдите, хриптене и недостик на въздух (нечести) (могат да засегнат до 1 на 100 человека),
- Подуване на лицето, устните, устата, езика или гърлото, затруднение в дишането (ангиеодем) (вж.точка 2 „Предупреждения и предпазни мерки“) (нечести) (могат да засегнат до 1 на 100 человека),
- Тежки кожни реакции, включително еритема мултиформе (кожен обрив, който често започва с червени сърбящи участъци по лицето, ръцете и краката Ви) или интензивен кожен обрив, копривна треска, зачервяване на кожата по цялото Ви тяло, силен сърбеж, изприщване, белене и подуване на кожата, възпаление на лигавиците (синдром на Стивънс-Джонсън) или други алергични реакции (много редки) (могат да засегнат до 1 на 10 000 человека),
- Сърдечносъдови нарушения (неравномерен сърдечен ритъм, ангина пекторис (болки в гърдите, челюстта и гърба при физическо усилие), инфаркт) (много редки) (могат да засегнат до 1 на 10 000 человека),
- Слабост в ръцете или краката или проблеми с говора, което може да е признак за възможен инсулт (много редки) (могат да засегнат до 1 на 10 000 человека),
- Възпаление на панкреаса, което може да причини силни болки в корема и гърба, придружени с чувство на силно неразположение (много редки) (могат да засегнат до 1 на 10 000 человека),
- Пожълтяване на кожата или очите (жълтеница), което може да е сигнал за хепатит (много редки) (могат да засегнат до 1 на 10 000 человека),
- Животозастрашаващ неравномерен сърдечен ритъм (с неизвестна честота),
- Заболяване на мозъка, причинено от чернодробна болест (чернодробна енцефалопатия) (с неизвестна честота),

В низходящ ред на честотата им нежеланите реакции могат да бъдат следните:

- Чести (могат да засегнат до 1 на 10 человека):
Кожни реакции при хора, предразположени към алергични и астматични реакции, главоболие, виене на свят, световъртеж, изтръпване на крайниците, нарушения на зрението, шум в ушите (усещане за шум в ушите), кашлица, недостиг на въздух, диспнея) стомашно-чревни нарушения (гадене, повръщане, болки в корема, променен вкус, диспепсия или затруднено храносмилане, диария, запек), алергични реакции (като напр. кожни обриви, сърбеж), мускулни крампи, чувство за умора,
- Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 человека):
Промени в настроението, нарушения на съня, уртикария (копривна треска), пурпурна (червен точковиден обрив), области от изприщване, бъбречни проблеми, импотентност, изпотяване, излишък на еозинофили (тип бели кръвни клетки), промени в параметрите от лабораторни изследвания: високо ниво на калий в кръвта, обратимо при спиране, ниско ниво на натрий в кръвта, сънливост, припадане, сърцевиене (усещане на сърдечния Ви ритъм), тахикардия (участен сърдечен ритъм), хипогликемия (много ниско ниво на кръвната захар) при пациенти с диабет, васкулит (възпаление на кръвоносните съдове), сухота в устата, реакции на фотосенсибилизация (повищена чувствителност на кожата към слънце), артрапения (болки в ставите), миалгия (болки в мускулите), болки в гърдите, неразположение, перифорен оток, висока температура, увеличена кръвна урея, увеличен креатинин в кръвта припадане.
- Редки (могат да засегнат до 1 на 1000 человека):
Влошаване на псориазис, промени в параметрите от лабораторни изследвания: ниво на чернодробните ензими, високи нива на серумния билирубин, умора.
- Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 человека):



Обърканост, еозинофилна пневмония (рядък вид пневмония), ринит (запущен нос или течащ нос), тежки проблеми с бъбреците, промени в кръвните параметри, като намален брой на белите и червените кръвни клетки, понижен хемоглобин, намален брой на тромбоцитите, високи нива на калция в кръвта, аномална чернодробна функция.

- С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка за честотата): Промяна в електрокардиограмата, промени в параметрите от лабораторни изследвания: ниски нива на калий, високи нива на пикочна киселина и на кръвна захар, късогледство (миопия), замъглено зрение, зрителни нарушения, промяна в цвета, изтръпване и болка в пръстите на ръцете или краката (феномен на Рейно). Ако страдате от системен лупус еритематозус (тип заболяване на колагена), той може да се влоши.

Възможни са нарушения на кръвта, бъбреците, черния дроб или панкреаса (задстомашната жлеза) и промени в лабораторните параметри (кръвните изследвания). Може да се наложи Вашия лекар да Ви назначи изследване на кръвта за контролиране на Вашето състояние.

Концентрирана урина (тъмна на цвят), чувство за неразположение, мускулни крампи, състояние на обърканост и припадане, което може да се дължи на неправилна секреция на антидиуретичен хормон (ADH) могат да се появят при прием на ACE инхибитори. Ако получите някой от тези симптоми, се свържете с Вашия лекар възможно най-скоро.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка, нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно (на посочения по-долу адрес):

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев“ №8
1303 София
тел: +359 28903417
уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Съхранение на Нолипрел Би-Форте

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелзан върху картонената опаковка и контейнера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Съхранявайте контейнера пълно затворен, за да предпазите от влага. Лекарственият продукт не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлите лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и друга информация

Какво съдържа Нолипрел Би-Форте

- Активните вещества са периндоприл аргинин и индапамид. Една филмирана таблетка съдържа 10mg периндоприл аргинин (съответстващи на 6,79 mg периндоприл) и 2,9 mg индапамид.



Другите съставки в сърцевината на таблетката са: лактозаmonoхидрат, магнезиев стеарат (E470B), малтодекстрин, силициев диоксид, колоиден безводен (E551), натриев нишестен гликолат (тип A), а във филмовото покритие на таблетката: глицерол (E422), хипромелоза (E464), макрогол 6000, магнезиев стеарат (E470B), титанов диоксид (E171).

Как изглежда Нолипрел Би-Форте и какво съдържа опаковката

Нолипрел Би-Форте, филмирани таблетки, са бели кръгли филмирани таблетки с диаметър 8 mm и радиус при извивката 11 mm . Една филмирана таблетка съдържа 10 mg периндоприл аргинин и 2,5 mg индаламид.

Таблетките се продават в опаковки от 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 или 500 таблетки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба :

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Франция

Производител:

Les Laboratoires Servier Industrie

905 route de Saran

45520 Gidy - Франция

и

Servier (Ireland) Industries Ltd

Gorey Road

Arklow - Co. Wicklow – Ирландия

и

Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.

Ul. Annopol 6B

03-236 Warsaw,

Полша

Местен представител:

Сервие Медикал ЕООД

Тел: 02/921 57 00

София

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в страните членки на ЕИП под следните имена:

Белгия	PRETERAX 10 mg/2,5 mg
България	Нолипрел Би-Форте 10 mg/2,5 mg филмирани таблетки
Кипър	Preterax 10 mg/ 2,5 mg
Чешка република	Prestarium Neo Combi 10 mg/2,5 mg
Дания	NOLITERAX 10 mg/2,5 mg
Естония	NOLITERAX 10 mg/2.5 mg
Финландия	COVERSYL COMP NOVUM 10 mg/2,5 mg
Франция	BIPRETERAX 10 mg/2,5 mg
Гърция	Preterax 10/2,5



Исландия	NOLITERAX 10 mg/2,5 mg
Ирландия	COVERSYL ARGININE PLUS 10 /2.5 mg
Италия	NOLITERAX 10 mg/2,5 mg
Латвия	NOLITERAX 10 mg/2.5mg
Литва	NOLITERAX 10mg/2,5mg plēvele dengtos tabletēs
Люксембург	PRETERAX 10mg/2,5mg
Малта	COVERSYL PLUS 10mg/2.5mg
Холандия	COVERSYL PLUS arg 10mg/2,5mg
Полша	NOLIPREL Bi-FORTE
Португалия	PRETERAX
Румъния	NOLITERAX 10 mg /2,5 mg
Словакия	NOLIPREL Bi-FORTE A
Словения	BIONOLIPREL 10mg/2,5mg filmsko obložene tablete

Дата на последно преразглеждане на листовката:

