

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Нурофен Ликвид Капсули 200mg капсули, меки
Ибупрофен

Nurofen Liquid Capsules 200mg capsules, soft
Ibuprofen

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20050281
Разрешение №	10658/07.09.2010
Одобрение №	/

Прочетете внимателно цялата листовка тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.

Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 3 дни.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Нурофен Ликвид Капсули и за какво се използва
2. Преди да използвате Нурофен Ликвид Капсули
3. Как да използвате Нурофен Ликвид Капсули
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Нурофен Ликвид Капсули
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НУРОФЕН ЛИКВИД КАПСУЛИ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Нурофен Ликвид Капсули съдържа ибупрофен, който принадлежи към групата на нестероидните противовъзпалителни лекарствени продукти (НСПВЛП). Те водят до облекчение на симптомите, като променят отговора на организма към болка, при оток и високата температура.

Нурофен Ликвид Капсули е предназначен за осигуряване на ефикасно облекчаване на болка. Нурофен Ликвид Капсули лесно се разпадат в тялото и течността, която се освобождава от капсулата лесно се абсорбира.

Нурофен Ликвид Капсули е предназначен за бързо облекчаване на главоболие, мигрена, болки в гърба, менструални болки, зъбобол, невралгия, мускулни болки, ревматични болки, симптомите при простуда и грип и температурни състояния.

Нурофен Ликвид капсули се отпуска без лекарско предписание.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НУРОФЕН ЛИКВИД КАПСУЛИ

Не приемайте Нурофен Ликвид Капсули:

- Ако имате тежка сърдечна недостатъчност.
- Ако сте имали алергични реакции към ибупрофен, Понсо 4R (E124), някои от съставките на лекарствения продукт, ацетилсалицилова киселина или други нестероидни противовъзпалителни лекарствени продукти.
- Едновременен прием с други НСПВЛП поради увеличен риск от нежелани лекарствени реакции.

- Ако сте алергични към ацетилсалицилова киселина или сте имали алергични обриви, ринити (алергична хрема) или влошаване на асмата, свързани с приема на ацетилсалицилова киселина или други противовъзпалителни лекарства.
- Ако имате или сте имали случаи на за стомашно-чревни кръвоизливи свързано с употребата на НСПВЛП, язва или перфорация.
- Ако имате тежка бъбречна, сърдечна или чернодробна недостатъчност.
- Ако имате цереброваскуларни или други активни кръвоизливи.
- При случаи на тежка дехидратация (причинена от повръщане, диария или недостатъчен прием на течности).

Противопоказан е през последния триместър на бременността (виж т.4.6).

Обърнете специално внимание при употребата на Нурофен Ликвид Капсули ако:

- Имате астма, бъбречни, сърдечни или чернодробни проблеми
- Редовно приемате редовно други лекарствени продукти, особено ако това са лекарствени продукти за високо кръвно налягане, например диуретици и антихипертензивни лекарства или антикоагуланти (лекарствени продукти за разреждане на кръвта), напр. Варфарин, лекарствени продукти, съдържащи литий и метотрексат
- Бременни сте или кърмите или сте в старческа възраст
- Алергични сте при прием на други лекарства
- Ако сте на диета с ограничен прием на калий
- Имали сте анамнеза за улцерозен колит или заболчване на Крон
- Приемате редовно лекарства като анти-депресанти или стероиди

Предупреждения:

Лекарства като Нурофен Ликвид Капсули могат да бъдат свързани с леко увеличен риск от сърдечен инцидент („миокарден инфаркт“) или инсулт. Всеки риск е по-вероятен при високи дози и при продължително лечение. Не превишавайте препоръчаните дози и продължителността на лечението 3 дни.

Ако имате проблеми със сърцето, прекаран инсулт или мислите, че за Вас може да има риск от появата им (например ако имате високо кръвно налягане, диабет, повишени стойности на холестерол или сте пушач) трябва да обсъдите лечението с Вашия лекар или фармацевт.

Прием и употреба на други лекарства


Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Някои лекарства като антикоагуланти (т.нар. лекарствени продукти за разреждане на кръвта като напр. аспирин/ацетилсалицилова киселина, варфарин, тиклопидин), някои лекарства за високо кръвно налягане (АСЕ-инхибитори като каптоприл, бета-блокери като атенолол или ангиотензин-II рецепторен антагонист като лосартан) или други лекарства могат да влияят или да бъдат повлиявани при лечението с ибупрофен. Затова Вие трябва винаги да търсите съвет на лекар преди да приемете ибупрофен с други лекарства.

Бременност и кърмене

Има оскъдни данни за безопасността при употреба на ибупрофен при хора. Тъй като влиянието върху инхибирането на простагландиновата синтеза не е ясно, не се препоръчва употребата на ибупрофен през първите шест месеца на бременността.

Лекарственият продукт е противопоказан за употреба през последния триместър на бременността. Може да доведе до подтискане на маточните контракции, преждевременно затваряне на ductus



arteriosus и увеличаване налягането в белия дроб на новороденото. Може да е причина за засилено кървене при майката и детето и образуване на отоци при майката.

Установени са много ниски концентрации на ибупрофен и метаболитите му в кърмата (0,0008%), за които няма данни да действат неблагоприятно, така че не е необходимо да се прекъсва кърменето при краткотрайно лечение на лека до умерена болка и температура, ако се спазват препоръчаните дози.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ НУРОФЕН ЛИКВИД КАПСУЛИ

За възрастни и деца над 12 години:

Първоначален прием: Вземете 1-2 капсули с вода, след това ако е необходимо се вземат 1 или 2 капсули (200 - 400mg) на всеки 4-6 часа, но не повече от 6 капсули за 24 часа.

Капсулата се поглъща цяла, без да се дъвче.

Да не се прилага при деца под 12 години.

Да не се приемат повече от 6 капсули за 24 часа.

Ако сте приели повече от необходимата доза Нурофен Ликвид Капсули

Проблеми с предозирането са редки, но ако случайно приемете повече от препоръчаната доза, незабавно се свържете с лекар.

Ако симптомите продължат повече от 3 дни и болката и температурата не се повлияват или се появят нови симптоми, консултирайте се с лекар или фармацевт.

Кажете на Вашия лекар ако забележите някакви необичайни коремни симптоми – по-специално стомашно-чревно кървене, по специално скоро след началото на приема на това лекарство. Спрете лекарството ако забележите зачервяване на кожата и нарушение на лигавицата.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства Нурофен Ликвид Капсули може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нурофен Ликвид Капсули има добра поносимост и се приема много добре от повечето хора. В отделни случаи могат да се появят следните нежелани лекарствени реакции: стомашен дискомфорт и болка, гадене, стомашна язва, оцветени в черно изпражнения, сърбеж на кожата или обриви, влошаване на астма, бъбречни или чернодробни проблеми, главоболие, замаяване и смущения в слуха и много рядко лющене на кожата и склонност към лесно получаване на синини.

Лекарства като Нурофен Ликвид Капсули могат да бъдат свързани с леко повишен риск от сърдечен инцидент („миокарден инфаркт“) или инсулт.


Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ НУРОФЕН ЛИКВИД КАПСУЛИ

Да се съхранява под 25°C, в оригиналната опаковка.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Нурофен Ликвид Капсули след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.



Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Нурофен Ликвид Капсули

- Активното вещество е: ибупрофен 200mg
- Другите съставки са: полиетилен гликол, витамин Е, повидон, желатин, течен малтитол, сорбитол, пречистена вода, опакод, оцветител Понсо 4R (Е 124).

Как изглежда Нурофен Ликвид Капсули и какво съдържа опаковката

Опаковка Нурофен Ликвид капсули съдържа 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 40, 48 капсули, меки в картонена кутия.

Не всички опаковки ще се продават на пазара.

Притежател на разрешението за употреба:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH

Великобритания

Производител:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Nottingham Site, Thane Road, Nottingham, NG90 2DB

Великобритания

Дата на ревизия на текста: Май, 2009