

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Олфлекс 10 mg филмирани таблетки Olfrex 10 mg film-coated tablets оланзапин (olanzapine)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Олфлекс и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Олфлекс
3. Как да приемате Олфлекс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Олфлекс
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20120 3 34
Разрешение №	И-38687, 26-07-2017
Одобрение №	/

1. Какво представлява Олфлекс и за какво се използва

Олфлекс принадлежи към групата лекарства, наречени антипризотици.

Олфлекс се използва за лечение на заболявания, при които са налице симптоми като чуване, виждане или усещане на несъществуващи обекти, налудни мисли, необичайна подозрителност, затваряне в себе си. Хората с това заболяване може също да се чувстват потиснати, тревожни или напрегнати.

Олфлекс може да се използва за лечение на състояния, които протичат със симптоми, като приповдигнато настроение, необичайно количество енергия, по-малка необходимост от сън, много бърз говор с идващи една след друга идеи и понякога силна раздразнителност. Също така стабилизира настроението, като предпазва от появата на водещо до недееспособност повишаване или понижаване (потиснатост) на настроението, свързани с това състояние.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Олфлекс

Не приемайте Олфлекс

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към оланзапин или към някоя от останалите съставки на Олфлекс. Алергичната реакция може да се разпознае по наличието на обрив, сърбеж, оток на лицето, подуване на устните или недостиг на въздух. Ако това се случи с Вас, обрънете се към Вашия лекар;
- ако някога Ви е поставена диагноза свързана с проблеми с очите, например някои видове глаукома (повищено налягане в окото).



Обърнете специално внимание при употребата на Олфлекс

- лекарства от този тип могат да предизвикат необичайни движения предимно в областта на лицето и езика. Ако това се случи след като сте приели Олфлекс, информирайте Вашия лекар;
- много рядко, лекарства от този тип могат да предизвикат комбинация от температура, учестено дишане, изпотяване, скованост на мускулите, сънливост или безсъние. Ако това се случи, незабавно потърсете Вашия лекар;
- не се препоръчва употребата на Олфлекс при пациенти в старческа възраст с деменция, тъй като може да доведе до появата на сериозни нежелани ефекти;
- ако Вие страдате от някое от изброените по-долу заболявания, уведомете Вашия лекар възможно най-бързо:
 - диабет,
 - сърдечно заболяване,
 - чернодробно или бъбречно заболяване,
 - болест на Паркинсон,
 - епилепсия,
 - проблеми с простатата,
 - чревна непроходимост (паралитичен илеус),
 - заболявания на кръвта,
 - инсулт или "мини" инсулт (временни признания на инсулт),
- ако страдате от деменция, Вие или човекът, който се грижи за Вас трябва да информира Вашия лекар.

Като рутинна предпазна мярка, ако сте на възраст над 65 години Вашето кръвно налягане трябва да се наблюдава от Вашия лекар.

Олфлекс не е предназначен за пациенти под 18-годишна възраст.

Други лекарства и Олфлекс

Иформирайте Вашия лекар, ако приемате или насъкоро сте приемали други лекарства. Приемът на други лекарства по време на лечението с Олфлекс е възможен само по предписание на Вашият лекар.

Възможно е да почувствате сънливост, ако приемате Олфлекс в комбинация с антидепресанти или лекарства за лечение на тревожност или такива подпомагащи съня (транквилизатори). Необходимо е да уведомите Вашия лекар, в случай че приемате флуоксамин (антидепресант) или ципрофлоксацин (антибиотик), тъй като това може да наложи промяна на Вашата доза Олфлекс. Непременно предупредете Вашия лекар, ако приемате лекарства за лечение на болестта на Паркинсон.

Олфлекс с храни, напитки и алкохол

Не пийте алкохол, по време на лечението Олфлекс, тъй като едновременната употреба на Олфлекс и алкохол може да доведе до появата на сънливост.

Бременност, кърмене и фертелитет

Ако сте бременна или кърмите, смятайте, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Вие не трябва да приемате това лекарство, в случай на кърмене, тъй като малко количество от Олфлекс може да премине в кърмата.

Шофиране и работа с машини

Не шофирайте, не използвайте никакви инструменти или машини тъй като съществува опасност от появата на сънливост по време на приема на Олфлекс.



Важна информация за някои от съставките на Олфлекс

Олфлекс съдържа лактоза моногидрат. Ако Вашият лекар ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

3. Как да приемате Олфлекс

Винаги приемайте Олфлекс точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обичайната дневната доза Олфлекс е между 5 и 20 mg.

Опитвайте се да приемате Олфлекс по едно и също време, всеки ден.

Приемът на таблетките не зависи от приема на храна.

Ако симптомите Ви се възобновяват, не спирайте приема на Олфлекс преди да сте се консултирали с Вашия лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Олфлекс

Веднага потърсете Вашия лекар или направо отидете в най-близкото болнично заведение.

При пациентите приели повече от необходимата доза Олфлекс се наблюдават участена сърдечна дейност, възбуда/агресивност, проблеми с говора, необичайни движения (особено на лицето или езика) и различна степен на нарушение на съзнанието. Други симптоми може да бъдат: внезапна обърканост, припадък (епилепсия), кома, комбинация от треска, участено дишане, изпотяване, мускулна скованост и замаяност или сънливост, забавяне на сърдечната честота, аспирация, повищено или понижено кръвно налягане.

Ако сте пропуснали да приемете Олфлекс

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели да приема на Олфлекс

Не спирайте лечението, защото сте се почувствали по-добре. Важно е да продължите да приемате Олфлекс толкова дълго, колкото Ви е препоръчал Вашият лекар.

Ако внезапно спрете да приемате Олфлекс, може да се наблюдават признаци като изпотяване, нарушение в съня, трепор (треперене), тревожност или гадене и повръщане. Вашият лекар може да Ви предложи да намалите дозата постепенно, преди да спрете лечението.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Олфлекс може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Много чести нежелани лекарствени реакции - засягат 1(един) на 10 пациента:

- наддаване на тегло,
- сънливост,
- повищения в нивата на пролактин в кръвта.

Чести нежелани лекарствени реакции - засягат от 1 до 10 на 100 пациента:



- промени в нивата на някои кръвни клетки и масти в кръвообращението,
- повишения в нивата на захар в кръвта и урината,
- засилено чувство на глад,
- замаяност,
- беспокойство,
- тремор (треперене),
- мускулна скованост или спазъм (включително движения на очите),
- проблеми с говора,
- необичайни движения (особено на лицето или езика),
- запек,
- сухота в устата,
- обрив,
- загуба на сила,
- прекомерна уморяемост,
- задържане на вода водещо до отичане на ръцете, глезните или на стъпалата,
- в началото на лечението някои хора могат да почувстват замаяност или слабост (със забавяне на сърдечната честота) особено при изправяне от легнато или седнато положение. Това обикновено преминава самостоятелно, но ако това не стане уведомете Вашия лекар.
- сексуални дисфункции, като намалено либido при мъже и жени или еректилна дисфункция при мъже.

Редки нежелани лекарствени реакции - засягат от 1 до 10 на 1 000 пациента:

- бавен сърдечен пулс,
- чувствителност към слънчева светлина,
- нездържане на урината,
- косопад,
- липса или намаление на менструалните цикли,
- промени в гърдите при мъже и жени, като патологична продукция на кърма или патологично нарастване.

Други възможни нежелани лекарствени реакции- честотата не може да бъде оценена от наличните данни:

- алергична реакция (например оток на устата и гърлото, сърбеж, обрив),
- диабет или влошаване на диабета, понякога свързано с кетоацидоза (кетони в кръвта и урината) или кома,
- понижаване на нормалната телесна температура,
- гърчове, обикновено свързани с анамнеза за гърчове (епилепсия),
- комбинация от температура, учестено дишане, изпотяване, мускулна скованост и сомнолентност/ сънливост,
- спазми на очните мускули, причиняващо люлеещо движение на очите,
- нарушения на сърдечния ритъм,
- внезапна необяснима смърт,
- наличие на кръвни съсиреци, като например дълбока венозна тромбоза в областта на краката или кръвни съсиреци в белия дроб,
- възпаление на задстомашната жлеза, причиняващо силна коремна болка, температура и неразположение,
- чернодробно заболяване, проявяващо се като пожълтяване на кожата и на бялата част на очите,
- мускулно заболяване, проявяващо се като необясними болки и страдания,
- затруднение при уриниране,



- продължителна и/или болезнена ерекция.

Докато приемат оланзапин, пациентите в старческа възраст с деменция, могат да получат инсулт, пневмония, нездържане на урината, падания, силна уморяемост, зрителни халюцинации, покачване на температурата, зачервяване на кожата и да имат проблеми в походката. В тази специфична група пациенти има съобщения и за няколко случая с фатален изход.

При пациенти с болестта на Паркинсон, Олфлекс може да доведе до влошаване на симптомите. Рядко, при жени приемащи лекарствени продукти от този тип за продължителен период от време, е наблюдавано отделянето на мляко от гърдите и периоди без менструация или нередовен менструален цикъл.

Много рядко при кърмачета, родени от майки, които са приемали Олфлекс в края на бременността (3-ти триместър) може да се наблюдава трепор (треперене) или сънливост.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ):

БЪЛГАРИЯ, София 1303, ул. Дамян Груев 8

Тел. +359 2 8903555

ел. поща: bda@bda.bg

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Олфлекс

Да се съхранява под 25°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Олфлекс след срока на годност, отбелаян върху опаковката.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Олфлекс

- Активното вещество е: оланзапин.
- Другите съставки са: лактозаmonoхидрат, кросповидон, микрокристална целулоза, магнезиев стеарат, хидроксипропилцелулоза, поли (винилов алкохол), титанов диоксид (Е171), талк, ксантанова гума (Е415), лецитин.

Как изглежда Олфлекс и какво съдържа опаковката

Олфлекс се предлага в картонена опаковка.

Всяка картонена опаковка съдържа 28 филмирани таблетки, опаковани в 2 (два) блистера.



Всеки блистер съдържа 14 филмирани таблетки.

Притежател на разрешението за употреба и производител

НОБЕЛ ФАРМА ЕООД
Околовръстен път № 36
София 1415, България

Дата на последно преразглеждане на листовката: 06/2017

