

Листовка: информация за потребители

20011273

**ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти**  
 Бензоксониев хлорид/Лидокаинов хидрохлорид

Разрешение №

72152 / 08-06-2026

BG/МА/МР

Одобрение №

**OROFAR 1 mg/1 mg Lozenges**  
 Benzoxonium chloride/Lidocaine hydrochloride

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.
- Ако след 5 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

**Какво съдържа тази листовка:**

1. Какво представлява **ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти** и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате **ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти**
3. Как да използвате **ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти**
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате **ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти**
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

**1. Какво представлява ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти и за какво се използва**

**ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти** съдържа антисептичното вещество бензоксониев хлорид и анестетика (местно обезболяващо вещество) лидокаинов хидрохлорид.

**ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти** се бори с бактериите, вирусите и гъбичките, които причиняват инфекции в устата и гърлото. **ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти** намалява болките в устата и възпалението в гърлото.

**ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти** се използва за намаляване на симптомите, свързани с инфекции на устата и гърлото: болки в гърлото при простуда, фарингити или ларингити, стоматити, малки язви в устата (афти) или възпалени венци.

**ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти** може да се използва като поддържащо лечение при ангини.

**ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти** е показан за лечение на възрастни, деца и юноши на възраст от 5 до 18 години.

**2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти**

**ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти** не трябва да се прилагат при деца под 5 годишна възраст.

**Не използвайте ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти, ако сте алергични към:**

- бензоксониев хлорид;
- лидокаинов хидрохлорид или други анестетици за локално приложение;
- някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).



### **Предупреждения и предпазни мерки**

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате **ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти**, ако:

- възпалението на гърлото е придружено с висока температура или ако имате сериозни затруднения при преглъщане;
- симптомите не се подобряват или продължава повече от 5 дни.

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате **ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти**, ако имате постоянно кървящи язви, порязвания или рани в устата или гърлото.

### **Други лекарства и ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти**

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.

Някои вещества в пастите за зъби могат да отслабят действието на бензоксониев хлорид. Поради това, продуктът не трябва да се прилага непосредствено преди или след миене на зъбите.

### **ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти с храна, напитки и алкохол**

**ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти** не трябва да се използва по време или непосредствено след консумация на храна и напитки. Употребата на продукта може да причини временно изтръпване на устата и гърлото и да повлияе преглъщането. Избягвайте приемането на храна и напитки, докато продължава изтръпването.

### **Бременност, кърмене и фертилитет**

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на **ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти**.

### **Шофиране и работа с машини**

**ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти** не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

### **Важна информация за някои от помощните вещества**

**ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти** съдържа:

- **Сорбитол (E420)** – Това лекарство съдържа 1000 mg сорбитол във всяка таблетка, които са еквивалентни на 28 mg/kg. Сорбитолът е източник на фруктоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че Ви е или Вашето дете имате непоносимост към някои захари или Ви е поставена диагноза - наследствена непоносимост към фруктоза, рядко генетично заболяване, при което хората не могат да разграждат фруктозата, говорете с Вашия лекар преди Ви е или Вашето дете да приемете или да Ви бъде приложено това лекарство. Сорбитолът може да причини стомашно-чревно неразположение и слабо изразено слабително действие.

### **3. Как да използвате ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти**

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в листовката или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Не превишавайте препоръчаната доза или честотата на прилагане.

Не използвайте с други антисептични лекарства.

Прилагайте най-ниската доза, необходима за третиране на симптомите, за най-кратък период време.

Продуктът не трябва да се приема по време на или непосредствено след консумация на храна и напитки.

Не приемайте **ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти** повече от 7 дни без консултация с лекар.



Оставете една таблетка **ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти** да се стопи бавно в устата. Периодично премествайте таблетката от едната страна на устата в другата, докато се стопи напълно.

Не вземайте повече от 1 таблетка наведнъж.

Не превишавайте посочените дози.

**Не дъвчете и не гълтайте таблетките.**

Не приемайте храна или напитки, докато таблетката е в устата Ви.

Афтозни язви – оставете таблетката да се разтвори бавно в контакт с лезията.

#### Деца от 5 до 11 години

Не приемайте повече от 1 таблетка на всеки 2 до 3 часа.

Не приемайте повече от 6 таблетки за 24 часа.

**ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти** не трябва да се прилагат при деца под 5 годишна възраст.

#### Възрастни (включително в старческа възраст) и юноши на и над 12 години

Не приемайте повече от 1 таблетка на всеки 2 до 3 часа. Когато е необходимо, в случаите на остро възпаление на гърлото, може да приемате по 1 таблетка на всеки 1 до 2 часа.

Не приемайте повече от 10 таблетки за 24 часа.

**Ако сте използвали повече от необходимата доза ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти**

В случай на предозиране или инцидентно поглъщане на големи количества от **ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти**, незабавно информирайте Вашия лекар или фармацевт.

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако имате други въпроси, свързани с употребата на **ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти**.

#### **4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, **ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти** може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Спрете употребата на **ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти** и потърсете незабавно лекарска помощ, ако Вие или Вашето дете имате някои от следните симптоми, които могат да бъдат признаци на алергична реакция:

- Затруднение при дишане и преглъщане;
- Подуване на лицето, устните, езика и гърлото;
- Сърбеж на кожата с червени обриви и изразени мехури.

**Тези нежелани реакции са много редки (могат да засегнат по-малко от 1 на всеки 10000 човека).**

**Някои нежелани реакции са чести (могат да засегнат по-малко от 1 на всеки 10 човека):**

- Дразнене или изтръпване в устата и гърлото (орален дискомфорт).

#### **Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

#### **България**

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +359 2 8903417

Уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)



Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

#### 5. Как да съхранявате ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти

- Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
- Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
- Да се съхранява под 30°C. Да се пази от влага!
- Да се съхранява в оригиналната опаковка.
- Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

#### 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

##### Какво съдържа ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти

Активните вещества са: бензоксониев хлорид и лидокаинов хидрохлорид.

Другите съставки (помощни вещества) са: сорбитол (E420), царевично нишесте, портокалова есенция, макрогол 6000, целулоза, микрокристална, натриев хлорид, лимонена киселина монохидрат, захарин натрий, магнезиев стеарат.

##### Как изглежда ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти и какво съдържа опаковката

ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти са в блистери от поливинил хлорид (PVC)/полиетилен (PE)/поливинилден хлорид (PVDC) с алуминиево фолио.

ОРОФАР 1 mg/1 mg Таблетки за смучене, отляти са бели до леко жълти, кръгли биконвексни таблетки за смучене с надпис "Zuma" от едната страна и код „OR" от другата страна.

##### Притежател на разрешението за употреба:

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Германия

##### Производители:

Recipharm Uppsala AB, Björkgatan 30, Uppsala Domkyrkpfors, 753 23, Швеция

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Германия

##### Дата на последно преразглеждане на листовката

Април 2026

