

## ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

**PANADOL\* Baby** 120mg/5ml oral suspension  
**ПАНАДОЛ\* Бебе** 120mg/5ml перорална суспензия

### Прочетете внимателно цялата тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

### 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПАНАДОЛ Бебе И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

ПАНАДОЛ Бебе суспензия е предназначен за деца на възраст от 3 месеца до 12 години. Облекчава болката при никнене на зъбки, зъбобол и възпалено гърло и понижава температурата при настинки, грип и детски инфекции. Също така се препоръчва за понижаване на високата температура като пост-ваксинална реакция.

#### Как действа ПАНАДОЛ Бебе суспензия?

ПАНАДОЛ Бебе суспензия е с приятен ягодов вкус, не съдържа захар и алкохол. Активното вещество е парацетамол – аналгетик (болкоуспокояващо) и антипиретик (понижава температурата). ПАНАДОЛ Бебе суспензия не дразни стомаха и лесно се дозира.

### 2. ПРЕДИ ДА СЕ ПРИЕМА ПАНАДОЛ Бебе

Проверете преди да приемете това лекарство, **ВАЖНО!**

**Запомнете: ПАНАДОЛ Бебе съдържа парацетамол.**

**Да не се приема с други лекарства, съдържащи парацетамол.**

Не давайте ПАНАДОЛ Бебе суспензия на деца, алергични към парацетамол.

#### Важна информация относно някои от съставките на ПАНАДОЛ Бебе:

Суспензията съдържа като помощни вещества азо оцветител (E122) и парабени (E219, E215, E217), които може да причинят алергичен тип реакции, включително астма. Всяка доза от 5ml съдържа 666,5mg сорбитол.

**Консултирайте се с Вашия лекар преди да дадете ПАНАДОЛ Бебе суспензия, ако**

- детето има бъбречно или чернодробно заболяване;
- приема warfarin и подобни лекарства, използвани за разреждане на кръвта, или
- е имало проблем с дишането при употреба на това или подобно лекарство в миналото.

#### Бременност и кърмене

Не е приложимо – лекарството е предназначено за употреба в педиатрията, за лечение на деца от 3 месеца до 12 години.

### 3. КАК ДА СЕ ПРИЕМА ПАНАДОЛ Бебе?

Суспензията е за перорално приложение.

Да се разклати преди употреба.

В опаковката е приложена градуирана мерителна лъжичка (2.5 – 5ml) или пипета (0.5 – 8ml), които улесняват измерването на точната доза.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. № .....	20010894
Разрешение № .....	16503 21. 01. 2012
Събремение № .....	/



**Да не се дават повече от 60 mg/kg за период от 24 часа.**

**Препоръчвана дозировка за ПАНАДОЛ Бебе суспензия 120mg/5ml:**

Типично тегло	Възраст	Дозировка (ml)
4 – 6 кг	2 месеца	2.5
6 – 8 кг	3 – 6 месеца	4.0
8 - 10 кг	6 – 12 месеца	5.0
10 – 13 кг	1 – 2 години	7.0
13 – 15 кг	2 – 3 години	9.0
15 – 21 кг	3 – 6 години	10.0
21 – 29 кг	6 – 9 години	14.0
29 – 42 кг	9 – 12 години	20.0

*За деца на възраст от 2 до 3 месеца:*

Единична доза от 2.5 ml (120mg/5ml) за симптоматично облекчаване на нежеланите реакции след ваксинация. Ако високата температура продължи и след приемане на втора доза ПАНАДОЛ Бебе суспензия трябва да се потърси консултация с лекар.

За други индикации да се прилага само по лекарско предписание.

Измерете препоръчаната дозировка, посочена в горната таблица въз основа на теглото на детето. Ако не сте сигурни за теглото на детето, използвайте неговата възраст за определяне на дозата. Използвайте приложената в опаковката пипета. Изтеглете суспензия от шишето до съответната линия на скалата. Повторете, ако е необходима доза, по-голяма от 8 мл. След употреба, пипетата трябва да се измие с топла вода и да се подсуши, като не е необходимо да я стерилизирате.

Тази доза може да бъде повтаряна на всеки 4 часа при необходимост. Не давайте повече от 4 дози за период от 24 часа. Да не се дава на интервали, по-кратки от 4 часа. ПАНАДОЛ Бебе суспензия не трябва да се дава на деца повече от 3 дни без консултация с лекар. Ако състоянието на детето не се подобрява потърсете съвет от Вашия лекар.

**ПАНАДОЛ Бебе суспензия не трябва да се дава на деца по-малки от 2 месеца.**

Консултирайте се с Вашия лекар преди да използвате ПАНАДОЛ Бебе суспензия, ако бебето Ви е родено преждевременно.

**Не надвишавайте посочената доза.** Приемането на прекалено голямо количество може да увреди черния дроб. Ако мислите, че детето е приело повече от препоръчаната доза, незабавно потърсете лекарска помощ, дори и, ако то се чувства добре.

**Какво трябва да направите ако забравите или сте пропуснали да дадете необходимата доза на Вашето дете?**

Дайте необходимата доза когато си спомните. Не давайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата.

**4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Нежеланите реакции при парацетамол са редки. Може да се наблюдават алергични реакции, напр. кожен обрив. Макар и рядко е възможна появата на промени в кръвната картина. Спрете приема на лекарството и се консултирайте с Вашия лекар, ако наблюдавате алергична реакция като сърбеж, обрив, проблеми с дишането, поява на оток по устните, езика, гърлото или лицето, язви в устата, неочаквано кървене или склонност към насиняване.

**5. СЪХРАНЕНИЕ НА ПАНАДОЛ Бебе**

**Да се пази на място, недостъпно за деца.**

Да се съхранява при температура под 25°C.  
Да не се замръзва.





Да се пази от директна светлина.

Не използвайте след датата, посочена на опаковката.

Първоначално отворената опаковка може да се използва в рамките на указания срок на годност.

## **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

### **Какво съдържа ПАНАДОЛ Бебе суспензия?**

Всяка доза от 5 ml съдържа 120mg парацетамол (1ml съдържа 24mg).

Също така съдържа като помощни вещества ябълчна киселина, азорубин (E122), ксантанова гума, малтитол, сорбитол, натриев нипасепт, лимонена киселина, есенция с ягодов аромат (L10055) и вода.

### **Как изглежда ПАНАДОЛ Бебе и какво съдържа опаковката?**

ПАНАДОЛ Бебе е гъста прозрачна суспензия с розов цвят.

Опаковката съдържа тъмно стъклено шише от 100ml, 200ml или 300 ml с бяла капачка, със защита срещу отваряне на шишето от деца.

В опаковката има и пластмасова мерителна лъжичка от 5 ml, градуирана на 2.5 ml или прозрачна, пластмасова пипета със синьо, полиестерно бутало с външно градуирана скала от по 0,5 ml до 8 ml.

### **Притежател на разрешението за употреба и производител**

Притежател на разрешението за употреба е:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

GlaxoSmithKline Export Ltd.

Brentford, TW8 9GS, Обединено кралство

Производител е:

Farmaclair

440, Avenue de General de Gaulle

14200 Herouville Saint-Clair, Франция

Срок на годност – 3 години.

Без лекарско предписание.

Последна актуализация – декември 2011

GSK logo

Panadol\* е регистрирана търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies

