

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Код РУ №:	200 60385-14-08-06
Одобрено:	41/ 14.09.09
6476/ 16.12.2009	

## ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕВИТЕЛЯ

**PANADOL Baby 125mg suppositories**  
**ПАНАДОЛ Бебе 125mg супозитории**

Прочетете внимателно цялата тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

### 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПАНАДОЛ Бебе И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

ПАНАДОЛ Бебе 125mg супозитории е предназначен за деца на възраст над 3 месеца до 3 години. Облекчава лека до умерена болка при никнене на зъбки, зъббол, главоболие и възпалено гърло и понижава температурата при настинки, грип и детски инфекции.

Също така се препоръчва за понижаване на високата температура като пост-ваксинална реакция.

#### Как действа ПАНАДОЛ Бебе супозитории?

ПАНАДОЛ Бебе 125mg супозитории съдържа парacetamol, който облекчава лека до умерена болка от различен произход и понижава повишената температура.

ПАНАДОЛ Бебе 125mg супозитории са лесни за прилагане, особено когато детето има затруднения при прегълъщане или повръща.

### 2. ПРЕДИ ДА СЕ ПРИЕМА ПАНАДОЛ Бебе

**Проверете преди да приемете това лекарство, ВАЖНО!**

**Запомнете: ПАНАДОЛ Бебе съдържа парacetamol.**

**Да не се приема с други лекарства, съдържащи парacetamol.**

Не давайте ПАНАДОЛ Бебе 125mg супозитории на деца, алергични към парacetamol или помощното вещество.

**Консултирайте се с Вашия лекар преди да дадете ПАНАДОЛ Бебе супозитории, ако:**

- детето има бъбречно или чернодробно заболяване;
- приема warfarin и подобни лекарства, използвани за разреждане на кръвта, или
- е имало проблем с дишането при употреба на това или подобно лекарство в миналото.

Да не се прилага при пациенти с диария, насконо прекарано възпаление или кървене в областта на дебелото черво.

#### Бременност и кърмене

Не е приложимо – лекарството е предназначено за употреба в педиатрията, за лечение на деца от 3 месеца до 3 години.

### 3. КАК ДА СЕ ПРИЕМА ПАНАДОЛ Бебе?


#### Дозировка: Деца над 3 месеца до 3 години:

Дневната доза се определя въз основа на теглото на детето.

Обичайната дневна доза е 60 mg/kg, разпределена обикновено на 4 приема – 15 mg/kg еднократна доза.

Да не се прилагат повече от 4 дози дневно и на интервал по-кратък от 4 часа.

Да не се дават повече от 60 mg/kg за период от 24 часа.



Една супозитория се поставя в ректума на всеки 4 до 6 часа.

Да не се дава повече от 3 дни без консултация с лекар.

Ако състоянието на детето не се подобрява потърсете съвет от Вашия лекар.

**Да не се дава на деца под 3 месеца.**

Да не се приема през устата.

#### **Начин на приложение:**

Измийте ръцете си. Отстранете индивидуалната пластмасова опаковка на супозиторията.

Внимателно поставете супозиторията в ректума с помощта на показалеца. Поставянето на супозиторията може да се улесни, ако детето легне на една страна и си сгъне краката възможно най-близо под брадичката.

**Не надвишавайте посочената доза.** Ако мислите, че детето е приело повече от препоръчаната доза, незабавно потърсете лекарска помощ, дори и, ако то се чувства добре, поради опасност от чернодробно увреждане.

Най-честите симптоми на предозиране са гадене, повръщане, болки в корема, липса на апетит, проявяващи се обикновено в първите 24 часа след предозирането.

#### **Какво трябва да направите ако забравите или сте пропуснали да дадете необходимата доза на Вашето дете?**

Дайте необходимата доза когато си спомните. Не давайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата.

### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛЯНИ РЕАКЦИИ**

Нежеланите реакции при парацетамол са редки. Може да се наблюдават алергични реакции, напр. кожен обрив. Макар и рядко е възможна появата на промени в кръвната картина и възпаление в областта на ректума.

Спрете приема на лекарството и се консултирайте с Вашия лекар, ако наблюдавате алергична реакция като сърбеж, обрив, проблеми с дишането, поява на оток по устните, езика, гърлото или лицето, язви в устата, неочеквано кървене или склонност към насиняване.

### **5. СЪХРАНЕНИЕ НА ПАНАДОЛ Бебе**

**Да се пази на място, недостъпно за деца.**

Да се съхранява при температура под 25°C.

Не използвайте след датата, посочена на опаковката.

### **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

#### **Какво съдържа ПАНАДОЛ Бебе супозитории?**

Всяка супозитория съдържа 125mg парацетамол.

Също така съдържа като помощно вещество твърда мас.

#### **Как изглежда ПАНАДОЛ Бебе и какво съдържа опаковката?**

Панадол Бебе са супозитории с продълговата овална форма.

Опаковката съдържа PVC или PE блистери с по 5 супозитории.

Предлага се в опаковки съдържащи 10 супозитории.

#### **Притежател на разрешението за употреба и производител**

Притежател на разрешението за употреба е:


GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

GlaxoSmithKline Export Ltd.

Brentford, TW8 9GS, Великобритания

Производител е:

Farmaclair



440, Avenue de General de Gaulle  
14200 Herouville Saint-Clair, Франция

Срок на годност – 5 години.  
Без лекарско предписание.  
Последна актуализация – декември 2009

GSK logo

Panadol\* е регистрирана търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies

