

ИЗПЪЛНИТЕЛНА	СЪДЪРЖАЩА
Листовка · Приложение	
Към РУ №:	26010896, 17.08.06
Одобрено:	71 / 14.09.09

## ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

**PANADOL\* Extra 500mg/65mg film-coated tablets**  
**ПАНАДОЛ\* Екстра 500mg/65mg филмирани таблетки**

6477 / 16.12.2009

**Прочетете внимателно цялата тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

### 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПАНАДОЛ Екстра И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

ПАНАДОЛ Екстра съдържа комбинация от две активни съставки: парациетамол – аналгетик (болкоуспокояващо) и антипиретик (понижава температурата) и кофеин, който засилва обезболяващото действие. ПАНАДОЛ Екстра не дразни стомаха.

ПАНАДОЛ Екстра бързо и ефикасно облекчава слабата до умерена болка от различен произход (например главоболие, мигрена, болки в гърба, зъббол, ревматични и мускулни болки и менструални болки) и понижава високата температура.

### 2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМАТЕ ПАНАДОЛ Екстра

**Запомнете: ПАНАДОЛ Екстра съдържа парациетамол.**

**Не приемайте с други лекарства, съдържащи парациетамол.**

Не взимайте ПАНАДОЛ Екстра, ако сте алергични към парациетамол, кофеин или някоя от другите съставки.

ПАНАДОЛ Екстра не се препоръчва по време на бременност.

**Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да вземете ПАНАДОЛ Екстра, ако:**

- имате бъбречно или чернодробно заболяване;
- взимате метоклопрамид, домперидон (използван за повлияване на гадене и повръщане) или холестирамин, прилаган за понижаване нивото на холестерин;
- взимате антикоагуланти – лекарства, използвани за разреждане на кръвта;
- трябва да взимате обезболяващи средства всеки ден за продължителен период;
- не можете да приемате обичайните дози парациетамол;
- кърмите.

Това лекарство съдържа кофеин. Избягвайте приемането на големи количества чай, кафе или кофеин съдържащи напитки докато взимате ПАНАДОЛ Екстра. Повишеният прием на кофеин може да Ви направи раздразнителни и напрегнати, да имате проблеми със съня или да изпитвате неприятно чувство на стягане и тежест в гърдите.

#### Бременност и кърмене

Комбинацията парациетамол/кофеин не се препоръчва по време на бременност поради

възможно повишаване на риска от спонтанен аборт, свързан с употребата на кофеин.

Парациетамол се ескретира в майчиното мляко, но не в клинично значими количества.

Наличните данни не показват, че парациетамол е противопоказан по време на кърмене.

Кофеин се изльзва в майчиното мляко и може да има стимулиращ ефект върху кърмачето, но токсични концентрации не са наблюдавани.

### **3. КАК ДА СЕ ПРИЕМА ПАНАДОЛ Екстра?**

#### **За перорално приложение.**

**Възрастни, включително и тези над 60 години, и деца на и над 12 години:**

1 (една) – 2 (две) таблетки до четири пъти дневно при необходимост. Не взимайте на интервали по-кратки от 4 часа и не надвишавайте 8 таблетки (4 дози) за период от 24 часа.

Да не се дава на деца под 12 години.

Ако симптомите се запазят, консултирайте се с Вашия лекар.

**Да не се превишава препоръчаната доза.**

#### **Какво трябва да направите, ако приемете прекалено много?**

Приемането на прекалено голямо количество може да увреди черния дроб. Ако вземете повече от препоръчаната доза, незабавно потърсете лекарска помощ, дори и да се чувствате добре.

#### **Какво трябва да направите ако забравите или сте пропуснали да приемете необходимата доза?**

Приемете дозата когато си спомните. Не приемайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата.

### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

При парацетамол, нежеланите реакции са редки. Може да се наблюдават алергични реакции, напр. кожен обрив. Спрете приема на лекарството и се консултирайте с Вашия лекар, ако:

- наблюдавате алергична реакция като сърбеж, обрив, проблеми с дишането, появя на оток по устните, езика, гърлото или лицето;
- се появят язви в устата;
- сте имали проблеми с дишането при употреба на ацетилсалицилова киселина или нестероидни противовъзпалителни лекарства;
- имате неочеквано кървене или склонност към насиняване.

### **5. СЪХРАНЕНИЕ НА ПАНАДОЛ Екстра**

#### **Да се пази на места, недостъпни за деца.**

Да се съхранява при температура под 25°C.

Не използвайте след датата, посочена на опаковката.

### **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

#### **Какво съдържа ПАНАДОЛ Екстра?**

Всяка таблетка съдържа като активни вещества:

парацетамол	500mg
кофеин	65mg

Също така съдържа помощни вещества: царевично нишесте, нишесте, поливидон, натриев сорбат, талк, стеаринова киселина, кроскармелоза, хидроксипропилметилцелулоза, триацетин и пречистена вода.

#### **Как изглежда ПАНАДОЛ Екстра и какво съдържа опаковката?**

Панадол Екстра са бели таблетки с формата на капсула със заоблени краища.

"Panadol Extra" е релефно щампован от едната страна на таблетката.

Опаковката може да съдържа 12, 24 или 48 таблетки.

#### **Притежател на разрешението за употреба и производител**

Притежател на разрешението за употреба е:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare



GlaxoSmithKline Export Ltd.  
Brentford, TW8 9GS, Великобритания

Производител е:  
GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.,  
Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford, Ирландия

Срок на годност – 4 години.

Без лекарско предписание.  
Последна актуализация – юли 2009

GSK logo  
Panadol\* е регистрирана търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies

