

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

PANADOL Junior 250mg suppositories
ПАНАДОЛ Джуниър 250mg супозитории

Прочетете внимателно цялата тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПАНАДОЛ Джуниър И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

ПАНАДОЛ Джуниър 250mg супозитории е предназначен за деца на възраст от 4 години до 12 години. Облекчава лека до умерена болка при зъбобол, главоболие и възпалено гърло и понижава високата температура при настинки, грип и детски инфекции като например варицела, заушка, коклюш, морбили.

Как действа ПАНАДОЛ Джуниър супозитории?

ПАНАДОЛ Джуниър супозитории съдържа парацетамол, който облекчава лека до умерена болка от различен произход и повишена температура.

ПАНАДОЛ Джуниър супозитории са лесни за прилагане, особено когато детето има затруднения при преглъщане или повръща.

2. ПРЕДИ ДА СЕ ПРИЕМА ПАНАДОЛ Джуниър

Проверете преди да приемете това лекарство, **ВАЖНО!**

Запомнете: ПАНАДОЛ Джуниър съдържа парацетамол.
Да не се приема с други лекарства, съдържащи парацетамол.

Не давайте ПАНАДОЛ Джуниър супозитории на деца, алергични към парацетамол или помощното вещество.

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА | |
| Листовка - Приложение 2 | |
| Към Рег. № | 20060386 |
| Разрешение № | 1-15775-10.11.2011 |
| Сдържано | |

Консултирайте се с Вашия лекар преди да дадете ПАНАДОЛ Джуниър супозитории, ако:

- детето има бъбречно или чернодробно заболяване;
- приема warfarin и подобни лекарства, използвани за разреждане на кръвта, или
- е имало проблем с дишането при употреба на това или подобно лекарство в миналото.

Да не се прилага при пациенти с диария, наскоро прекарано възпаление или кървене в областта на дебелото черво.

Бременност и кърмене

Не е приложимо – лекарството е предназначено за употреба в педиатрията, за лечение на деца от 4 до 12 години.

3. КАК ДА СЕ ПРИЕМА ПАНАДОЛ Джуниър?

Дозировка: Деца от 4 до 12 години:

Дневната доза се определя въз основа на теглото на детето. Обичайната дневна доза е 60 mg/kg, разпределена обикновено на 4 приема – 15 mg/kg еднократна доза.

Да не се прилагат повече от 4 дози дневно и на интервал по-кратък от 4 часа.

Да не се дават повече от 60 mg/kg за период от 24 часа.



Една супозитория се поставя в ректума на всеки 4 до 6 часа.
Да не се дава повече от 3 дни без консултация с лекар.
Да не се дава на деца под 4 години освен по лекарско предписание.
Ако състоянието на детето не се подобрява потърсете съвет от Вашия лекар.
Да не се приема през устата.

Начин на приложение:

Измийте ръцете си. Отстранете индивидуалната пластмасова опаковка на супозиторията. Внимателно поставете супозиторията в ректума с помощта на показалеца. Поставянето на супозиторията може да се улесни, ако детето легне на една страна и си сгъне краката възможно най-близо под брадичката.

Не надвишавайте посочената доза. Ако мислите, че детето е приело повече от препоръчаната доза, незабавно потърсете лекарска помощ, дори и, ако то се чувства добре, поради опасност от чернодробно увреждане.
Най-честите симптоми на предозиране са гадене, повръщане, болки в корема, липса на апетит, проявяващи се обикновено в първите 24 часа след предозирането.

Какво трябва да направите ако забравите или сте пропуснали да дадете необходимата доза на Вашето дете?

Дайте необходимата доза когато си спомните. Не давайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Нежеланите реакции при парацетамол са редки. Може да се наблюдават алергични реакции, напр. кожен обрив. Макар и рядко е възможна появата на промени в кръвната картина и възпаление в областта на ректума.

Спрете приема на лекарството и се консултирайте се с Вашия лекар, ако наблюдавате алергична реакция като сърбеж, обрив, проблеми с дишането, поява на оток по устните, езика, гърлото или лицето, язви в устата, неочаквано кървене или склонност към насиняване.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ПАНАДОЛ Джунийър

Да се пази на място, недостъпно за деца.
Да се съхранява при температура под 25°C.
Не използвайте след датата, посочена на опаковката.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа ПАНАДОЛ Джунийър супозитории?
Всяка супозитория съдържа 250mg парацетамол.

Също така съдържа като помощно вещество твърда мас.

Как изглежда ПАНАДОЛ Джунийър и какво съдържа опаковката?

Панадол Джунийър са супозитории с продълговата овална форма.
Опаковката съдържа PVC или PE блистери с по 5 супозитории.
Предлага се в опаковки съдържащи 10 супозитории.


Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба е:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
GlaxoSmithKline Export Ltd.
Brentford, TW8 9GS, Обединено кралство

Производител е:

Farmaclair
440, Avenue de General de Gaulle



14200 Herouville Saint-Clair, Франция

Срок на годност – 5 години.

Без лекарско предписание.

Последна актуализация – февруари 2011

GSK logo

Panadol* е регистрирана търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies

