

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА
Листовка - Приложение 2
КМД PV № 26010958, 17.08.06
Обратно: 41 / 14.09.09
6498 / 16.12.2009

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

PANADOL* Soluble 500mg soluble tablets
ПАНАДОЛ* Разтворим 500mg разтворими таблетки

Прочетете внимателно цялата тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПАНАДОЛ Разтворим И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

Панадол Разтворим е обезболяващо и температуропонижаващо средство и се използва за симптоматично лечение на повечето състояния, свързани с лека до умерена болка и висока температура, напр. главоболие, включително мигрена, зъбобол, болки в гърба, ревматични и мускулни болки, дисменорея, болки при възпалено гърло.

Как действа ПАНАДОЛ Разтворим?

Панадол Разтворим съдържа парацетамол – аналгетик (болкоуспокояващо) и антипиретик (понижава температурата). Панадол Разтворим не дразни стомаха.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМАТЕ ПАНАДОЛ Разтворим

Запомнете: ПАНАДОЛ Разтворим съдържа парацетамол.

Не приемайте с други лекарства, съдържащи парацетамол.

Не взимайте Панадол Разтворим, ако сте алергични към парацетамол или някоя от другите съставки.

Важна информация относно някои от съставките на ПАНАДОЛ Разтворим:

Всяка таблетка съдържа 427mg натрий (854mg натрий за доза от две таблетки). По тази причина лекарството не е подходящо за лица на нискосолева диета.

Всяка таблетка съдържа 62,5mg сорбитол. Пациенти страдащи от наследствена непоносимост към фруктоза не трябва да приемат това лекарство.


Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да вземете ПАНАДОЛ Разтворим, ако:

- имате бъбречно или чернодробно заболяване;
- взимате метоклопрамид, домперидон (използван за повлияване на гадене и повръщане) или холестирамин, прилаган за понижаване нивото на холестерин;
- взимате антикоагуланти – лекарства, използвани за разреждане на кръвта;
- трябва да взимате обезболяващо средство всеки ден за продължителен период;
- не може да приемате обичайните дози парацетамол;
- сте имали проблем с дишането при употреба на това или подобно лекарство в миналото;
- сте бременна или кърмите.

Бременност и кърмене

Епидемиологичните проучвания при бременност при човека не показват риск при употребата на парацетамол в препоръчаните дози.

Парацетамол се екскретира в майчиното мляко, но не в клинично значими количества.



Наличните данни не показват, че парацетамол е противопоказан по време на кърмене.

3. КАК ДА СЕ ПРИЕМА ПАНАДОЛ Разтворим?

Възрастни, включително и тези над 60 години, и деца на и над 12 години:

1 (една) – 2 (две) таблетки, разтворени в чаша с вода, на всеки 4 часа при необходимост. Не взимайте на интервали по-кратки от 4 часа и не надвишавайте 8 таблетки (4000mg парацетамол) за период от 24 часа.

Деца (6 до 12 години) – ½ (половин) до 1 (една) таблетка да се разтвори в чаша с вода и да се дава на всеки 4 часа при необходимост.

Не трябва да се дават повече от 4 таблетки за 24 часа.

Не давайте на деца повече от 3 дни без консултация с лекар.

Да не се дава на деца под 6 годишна възраст.

Ако симптомите се запазят, консултирайте се с Вашия лекар.

Да не се превишава препоръчаната доза.

Какво трябва да направите, ако приемете прекалено много?

Приемането на прекалено голямо количество може да увреди черния дроб. Ако вземете повече от препоръчаната доза, незабавно потърсете лекарска помощ, дори и да се чувствате добре.

Какво трябва да направите ако забравите или сте пропуснали да приемете необходимата доза?

Приемете дозата когато си спомните. Не приемайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

При парацетамол нежеланите реакции са редки. Може да се наблюдават алергични реакции, напр. кожен обрив. Макар и рядко е възможна появата на промени в кръвната картина. Спрете приема на лекарството и се консултирайте с Вашия лекар, ако:

- наблюдавате алергична реакция като сърбеж, обрив, проблеми с дишането, поява на оток по устните, езика, гърлото или лицето;
- се появат язви в устата;
- сте имали проблеми с дишането при употреба на ацетилсалицилова киселина или нестероидни противовъзпалителни лекарства;
- имате неочаквано кървене или склонност към насиняване.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ПАНАДОЛ Разтворим

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява при температура под 25°C.

Не използвайте след датата, посочена на опаковката.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа ПАНАДОЛ Разтворим?

Всяка таблетка съдържа парацетамол 500mg

Също така съдържа сорбитол, натриев захарин, натриев бикарбонат, повидон, натриев лаурил сулфат, диметикон, лимонена киселина и натриев карбонат.

Как изглежда ПАНАДОЛ Разтворим и какво съдържа опаковката?


Панадол Разтворим са бели кръгли разтворими таблетки с делителна черта.

Опаковката съдържа 12, 24 или 48 бели кръгли таблетки, опаковани по две в ламинирана лента.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба е:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare



GlaxoSmithKline Export Ltd.
Brentford, TW8 9GS, Великобритания

Производител е:

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd,
Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford, Ирландия

и/или

Famar S.A., Гърция

Срок на годност – 4 години.

Без лекарско предписание.

Последна актуализация – декември 2009

GSK logo

Panadol* е регистрирана търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies

