

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. № 9455	20010895
Разрешение № 9455	, 27. 04. 2010
Одобрение №	

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

PANADOL* 500mg film-coated tablets
ПАНАДОЛ* 500mg филмирани таблетки

Прочетете внимателно цялата тази листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПАНАДОЛ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

Панадол 500mg филмирани таблетки е обезболяващо и температуропонижаващо средство и се използва за симптоматично лечение на повечето състояния, свързани с лека до умерена болка и висока температура, напр. главоболие, включително мигрена, зъббол, болки в гърба, ревматични и мускулни болки, менструални болки, болки при възпалено гърло.

Как действа ПАНАДОЛ?

Панадол съдържа парациетамол – аналгетик (болкоуспокояващо) и антипиретик (понижава температурата). Панадол не дразни стомаха и таблетките са с овална форма, което улеснява тяхното прегълъщане.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМАТЕ ПАНАДОЛ

Запомнете: ПАНАДОЛ съдържа парациетамол.

Не приемайте с други лекарства, съдържащи парациетамол.

Не взимайте Панадол, ако сте алергични към парациетамол или някоя от другите съставки.

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да вземете ПАНАДОЛ, ако:

- имате бъбречно или чернодробно заболяване;
- взимате метоклопрамид, домперидон (използван за повлияване на гадене и повръщане) или холестирамин, прилаган за понижаване нивото на холестерин;
- взимате антикоагуланти – лекарства, използвани за разреждане на кръвта;
- трябва да взимате обезболяващо средство всеки ден за продължителен период;
- сте имали проблем с дишането при употреба на това или подобно лекарство в миналото;
- сте бременна или кърмите.

Бременност и кърмене

Епидемиологичните проучвания при бременност при човека не показват риск при употребата на парациетамол в препоръчаните дози.

Парациетамол се екскретира в майчиното мяко, но не в клинично значими количества.

Наличните данни не показват, че парациетамол е противопоказан по време на кърмене.

3. КАК ДА СЕ ПРИЕМА ПАНАДОЛ?

За перорално приложение.

Възрастни, включително и тези над 60 години, и деца на и над 12 години.



2 (две) таблетки на всеки 4 часа при необходимост. Не взимайте на интервали пократки от 4 часа и не надвишавайте 8 таблетки (4000mg парацетамол) за период от 24 часа.

Деца (от 6 до 12 години) – ½ (половин) до 1 (една) таблетка да се дава на всеки 4 часа при необходимост. Не трябва да се дават повече от 4 таблетки за 24 часа.
Не давайте на деца повече от 3 (три) дни без консултация с лекар.
Да не се дава на деца под 6 годишна възраст.
Ако симптомите се запазят, консултирайте се с Вашия лекар.
Да не се превишава препоръчаната доза.

Какво трябва да направите, ако приемете прекалено много?

Приемането на прекалено голямо количество може да увреди черния дроб. Ако вземете повече от препоръчаната доза, незабавно потърсете лекарска помощ, дори и да се чувствате добре.

Какво трябва да направите ако забравите или сте пропуснали да приемете необходимата доза?

Приемете дозата когато си спомните. Не приемайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛЯНИ РЕАКЦИИ

Нежеланите реакции при парацетамол са редки. Може да се наблюдават алергични реакции, напр. кожен обрив. Макар и рядко е възможна появата на промени в кръвната картина. Спрете приема на лекарството и се консултирайте с Вашия лекар, ако:

- наблюдавате алергична реакция като сърбеж, обрив, проблеми с дишането, появя на оток по устните, езика, гърлото или лицето;
- се появят язви в устата;
- сте имали проблеми с дишането при употреба на ацетилсалицилова киселина или нестероидни противовъзпалителни лекарства;
- имате неочаквано кървене или склонност към насиеняване.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ПАНАДОЛ

Да се пази на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява при температура под 30°C.

Не използвайте след датата, посочена на опаковката.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа ПАНАДОЛ?

Всяка таблетка съдържа парацетамол 500mg

Също така съдържа царевично нишесте, разтворимо нишесте, повидон, калиев сорбат, талк, стеаринова киселина.

За таблетната обвивка: хипромелоза, триацетин, пречистена вода.

Как изглежда ПАНАДОЛ и какво съдържа опаковката?

Панадол са бели таблетки с формата на капсула със заоблени краища и делителна черта от едната страна за улесняване на разчупването. "Panadol" е релефно щампован на таблетката.

Опаковката може да съдържа 12, 24 или 48 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба е:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
GlaxoSmithKline Export Ltd.



Brentford, TW8 9GS, Великобритания

Производител е:

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd,
Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford, Ирландия
и/или

S.C. EUROPHARM S.A.
2 Panselelor St., Brasov 500419, Румъния

Срок на годност – 5 години.

Без лекарско предписание.

Последна актуализация – април 2010

GSK logo

Panadol* е регистрирана търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies.

