

Листовка: Информация за потребителя**ПАНАНГИН 158 mg / 140 mg филмирани таблетки**

калиев аспартат, безводен/магнезиев аспартат, безводен

PANANGIN 158 mg / 140 mg film-coated tablets
potassium aspartate, anhydrous/magnesium aspartate, anhydrous

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Панангин филмирани таблетки и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Панангин филмирани таблетки
3. Как да приемате Панангин филмирани таблетки
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Панангин филмирани таблетки
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Панангин филмирани таблетки и за какво се използва

Активните вещества на Панангин филмирани таблетки играят важна роля при различни метаболитни процеси, както и за функционирането на нервите, мускулите, сърцето и кръвоносната система. Това лекарство се прилага като допълващо лечение на хронична сърдечна недостатъчност. Освен това се използва като добавка на хранителния прием на магнезий и калий.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемате Панангин филмирани таблетки**Не приемайте Панангин филмирани таблетки**

- ако сте алергични към активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- в случай на остра или хронична бъбречна недостатъчност;
- в случай на болест на Addison (недостатъчност на надбъбречната кора);
- в случай на определени тежки нарушения на сърдечната проводимост (наречени трета степен атриовентрикуларен блок);
- в случай на изключително ниско кръвно налягане (по-малко от 90 mm/Hg), причинено от циркулаторен колапс, свързан с невъзможността на сърцето да изпомпва достатъчно кръв (кардиогенен шок).

Предупреждения и предпазни мерки

Ако страдате от състояние, свързано с високо ниво на калий трябва да се консултирате с Вашия лекар преди да приемете Панангин филмирани таблетки.

Други лекарства и Панангин филмирани таблетки

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Тетрациклини (определенi антибиотици) приети през устата, желязо-съдържащи соли и натриев флуорид възпрепятстват абсорбцията на Панангин. Най-малко 3 часа са нужни между приема на другите лекарства и Панангин филмирани таблетки.

Съвместното приложение на калий-съхраняващи диуретици и/или АСЕ инхибитори (лекарства понижаващи кръвното налягане) може да доведе до високи нива на калий.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Няма налични данни, които да показват че това лекарство може да има вреден ефект при тези състояния.

Шофиране и работа с машини

Панангин филмирани таблетки не повлияват способностите необходими за шофиране и работа с машини.

3. Как да приемате Панангин филмирани таблетки

Обичайната доза е 2 филмирани таблетки три пъти на ден, като допълващо лечение при сърдечни показания. При тежки случаи дневната доза може да бъде увеличена до 3 филмирани таблетки три пъти на ден, в продължение на една седмица. След това дневната доза може да бъде намалена на една филмирана таблетка три пъти на ден. Поддържащата доза при продължително лечение е 3x1 таблетка дневно. Стомашната киселина може да намали ефективността на продукта, затова се препоръчва филмираната таблетка да се приема след хранене.

Ако сте приели повече от необходимата доза Панангин филмирани таблетки

Няма съобщения за предозиране (свързани с употребата на Панангин филмирани таблетки). В случай, че приемете повече от необходимата доза Панангин филмирани таблетки, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Симптоми на високи нива на калий: слабост, изтръпване на крайниците, забавен сърден ритъм, парализа. Изключително високи концентрации на калий в плазмата могат да предизвикат тежки сърдечни нарушения.

Симптоми на високи нива на магнезий: гадене, повръщане, летаргия, високо кръвно налягане, забавен сърден ритъм, слабост. При изключително високи концентрации на магнезий в плазмата може да се развият забавяне на рефлексите, мускулна парализа, спиране на дишането и сърдечната дейност.

Ако сте пропуснали да приемете Панангин филмирани таблетки

Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

По-високите дози могат да причинят по-честа дефекация.

Съобщаване на нежелани реакции



Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване към Изпълнителната агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: +35928903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Панангин филмирани таблетки

Да се съхранява под 25°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлите лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Панангин филмирани таблетки

Активните вещества са:

158 mg калиев аспартат, безводен (*potassium aspartate, anhydrous*) (като 166,3 mg калиев аспартат хемихидрат) и 140 mg магнезиев аспартат, безводен (*magnesium aspartate, anhydrous*) (като 175 mg магнезиев аспартат тетрахидрат).

Другите съставки са:

Сърцевина:

Силициев диоксид, колоиден безводен,

Повидон,

Магнезиев стеарат,

Талк,

Царевично нишесте,

Картофено нишесте.

Покритие:

Макролол 6000,

Титанов диоксид (E171),

Еудражит Е 100%,

Талк.

Как изглежда Панангин филмирани таблетки и какво съдържа опаковката

50 филмирани таблетки са опаковани в един флакон от полипропилен, с плътно прилепваща полиетиленова капачка. Един флакон е опакован в сгъваема картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.,

H-1103 Budapest,

Унгария

Дата на последно преразглеждане на листовката 11/2016

