

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА	
Листовка Приложение 2	
Към Рег. №	20220181
Разпоръчителен №	71380
BG/MA/MP	'11-03-2026
Съставителен №	

Листовка: информация за потребителя

Парабол Макс 400 mg меки капсули
ибупрофен

Parabol Max 400 mg soft capsules
ibuprofen

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Трябва да се свържете с лекар, ако симптомите Ви се влошат или не се подобряват:
 - след 3 дни при юноши
 - след 3 дни ако имате висока температура и след 4 дни при лечение на болка при възрастни.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Парабол Макс и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Парабол Макс
3. Как да приемате Парабол Макс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Парабол Макс
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Парабол Макс и за какво се използва

Ибупрофен принадлежи към група от лекарства, известни като нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС). НСПВС осигуряват облекчение чрез промяна на отговора на организма към болка и висока температура.

Парабол Макс се използва при възрастни и юноши с тегло от 40 kg (на възраст на и над 12 години) за краткосрочно симптоматично лечение на лека до умерена болка като:

- главоболие,
- менструална болка,
- зъбобол и
- висока температура и болка, свързана с простудни заболявания.

Трябва да се свържете с лекар, ако симптомите Ви се влошат или не се подобряват:

- след 3 дни при юноши
- след 3 дни ако имате висока температура и след 4 дни при лечение на болка при възрастни.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Парабол Макс

Не приемайте Парабол Макс ако:

- сте алергични към ибупрофен или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
- някога сте страдали от задух, астма, хрема, възпаление или копривна треска след употреба на ацетилсалицилова киселина или други подобни болкоуспокояващи (НСПВС);
- имате (или сте имали два или повече епизода на стомашна язва, перфорация или кървене);



- сте имали стомашно-чревно кървене или перфорация, когато преди това сте приемали НСПВС (нестероидни противовъзпалителни средства);
- страдате от неизяснени смущения в кръвообразуването;
- имате тежки чернодробни, бъбречни или сърдечни проблеми;
- сте в последните 3 месеца от бременността (вж. раздел "Бременност, кърмене и фертилитет");
- страдате от тежка дехидратация (причинена от повръщане, диария или недостатъчен прием на течности).
- страдате от кръвоизлив в мозъка (мозъчно-съдов кръвоизлив) или друг активен кръвоизлив.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Парабол Макс ако:

- имате системен лупус еритематозус (СЛЕ) или смесено заболяване на съединителната тъкан (състояния на имунната система, причиняващи болки в ставите, кожни обриви и повишена температура);
- имате някои наследствени нарушения на кръвообразуването (напр. остра интермитентна порфирия) или проблеми със съсирването на кръвта;
- имате анамнеза за стомашно-чревни заболявания (като улцерозен колит, болест на Crohn);
- имате намалена бъбречна функция;
- имате проблеми с черния дроб;
- наскоро сте претърпели голяма операция;
- имате или сте имали астма или алергично заболяване, тъй като може да се появи задух;
- страдате от сенна хрема, назални полипи или хронични обструктивни респираторни нарушения, тъй като съществува повишен риск от алергични реакции. Алергичните реакции могат да се проявят като астматични пристъпи (т.нар. аналгетична астма), остри отоци (оток на Квинке) или кожен обрив;
- приемате други лекарства, които биха могли да повишат риска от язва или кървене, като перорални кортикостероиди, лекарства за разреждане на кръвта (като варфарин), селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (лекарства за депресия) или антитромбоцитни средства като ацетилсалицилова киселина;
- имате инфекция - моля, вижте заглавието "Инфекции" по-долу.

Инфекции

Ибупрофен може да скрие признаците на инфекции, например повишена температура и болка. Поради това е възможно това лекарство да забави подходящото лечение на инфекцията, което може да доведе до повишен риск от усложнения. Това се наблюдава при бактериална пневмония и бактериални кожни инфекции, свързани с варицела. Ако приемате това лекарство, докато имате инфекция и симптомите на инфекцията продължават или се влошават, трябва да се консултирате незабавно с лекар.

Други предупреждения

Продължителната употреба на болкоуспокояващи при главоболие може да го влоши. Ако се наблюдава или подозира такава ситуация, трябва да спрете приема на Парабол Макс и да се свържете с Вашия лекар.

- Трябва да избягвате приема на това лекарство, ако имате варицела;
- Когато ибупрофен се приема за по-дълъг период от време, трябва да се правят редовни изследвания на черния дроб, бъбреците и кръвта;
- Приемането на ибупрофен в комбинация с други НСПВС, включително специфични инхибитори на циклооксигеназа 2, може да увеличи риска от нежелани реакции и трябва да се избягва (вж. раздела "Други лекарства и Парабол Макс" по-долу);
- Като цяло, обичайната употреба на (няколко вида) аналгетици може да доведе до трайни тежки бъбречни проблеми и трябва да се избягва. Рискът се увеличават допълнително от загубата на сол и дехидратацията;
- Съществува риск от бъбречно увреждане при дехидратирани деца и юноши;
- Признаци на алергична реакция към това лекарство, включително проблеми



дишането, подуване в областта на лицето и шията (ангиоедем), болка в гърдите, са съобщавани при ибупрофен. Прекратете незабавно употребата на Парабол Макс и се свържете незабавно с Вашия лекар или потърсете незабавно спешна медицинска помощ, ако забележите някой от тези признаци.

Сериозни кожни реакции

Сериозни кожни реакции, включително ексфолиативен дерматит, еритема мултиформе, синдром на Стивънс-Джонсън, токсична епидермална некролиза, лекарствена реакция с еозинофилия и системни симптоми (DRESS), остра генерализирана екзантематозна пустулоза, са съобщавани във връзка с лечението с ибупрофен. Прекратете употребата на Парабол Макс и незабавно потърсете медицинска помощ, ако забележите някой от симптомите, свързани със сериозните кожни реакции, описани в точка 4.

Противовъзпалителни/болкоуспокояващи лекарства като ибупрофен могат да бъдат свързани с леко повишен риск от сърдечен удар или инсулт, особено когато се използват във високи дози. Не превишавайте препоръчителната доза или продължителността на лечението.

Трябва да обсъдите лечението си с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Парабол Макс ако имате:

- сърдечни проблеми, включително сърдечна недостатъчност, стенокардия (болка в гърдите) или ако сте имали инфаркт, байпас, периферна артериална болест (лоша циркулация в краката или крака поради тесни или запушени артерии), или какъвто и да е вид инсулт (включително „мини-инсулт“ или преходна исхемична атака "ТИА");
- имате високо кръвно налягане, диабет, висок холестерол, имате фамилна анамнеза за сърдечни заболявания или инсулт, или ако сте пушач.

Нежеланите ефекти се свеждат до минимум чрез използване на минималната ефективна доза за най-кратък период от време. Пациенти в старческа възраст са изложени на повишен риск от нежелани реакции.

Консултирайте се с лекар преди употребата на Парабол Макс ако някое от гореспоменатите състояния се отнася за Вас.

Други лекарства и Парабол Макс

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Това лекарство може да повлияе или да бъде повлияно от някои други лекарства. Например:

- лекарства, които са антикоагуланти (т.е. разреждат кръвта/предотвратяват съсирването, напр. аспирин/ацетилсалицилова киселина, варфарин, тиклопидин);
- лекарства, които намаляват високото кръвно налягане (АСЕ-инхибитори като каптоприл, бета-блокери като атенолол, ангиотензин-II рецепторни антагонисти като лосартан).

Някои други лекарства също могат да повлияят или да бъдат повлияни от лечението с ибупрофен. Затова винаги трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Парабол Макс с други лекарства.

Кажете им, ако в момента приемате:

други НСПВС (противовъзпалителни и аналгетични средства), включително селективни инхибитори на циклооксигеназа-2	може да увеличи риска от стомашно-чревни язви или кървене
дигоксин (при сърдечна недостатъчност)	ефектът на дигоксина може да се увеличи
глюкокортикоиди (лекарствени продукти, съдържащи кортизон или кортизонopodobни вещества)	може да увеличи риска от стомашно-чревни язви или кървене



антитромбоцитни средства	може да увеличи риска от стомашно-чревни язви или кървене
фенитоин (за епилепсия)	ефектът на фенитоина може да се засили
селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (лекарства, използвани при депресия)	може да увеличи риска от кървене
литий (лекарство за лечение на маниакално-депресивно заболяване и депресия).	ефектът на лития може да се засили
пробенацид и сулфинпиразони (лекарства за лечение на подагра)	разграждането на ибупрофен от организма може да отнеме повече време
калий-съхраняващи диуретици	може да доведе до високи нива на калий в кръвта (хиперкалиемия)
метотрексат (лекарство за лечение на рак или ревматизъм)	ефектът на метотрексат може да се засили
такролимус и циклоспорин (имуносупресивни лекарства)	може да настъпи увреждане на бъбреците
зидовудин (лекарство за лечение на СПИН)	употребата на ибупрофен може да доведе до повишен риск от кървене в ставата или кървене, което води до подуване при ХИВ (+) хемофилици.
сулфонилурейни препарати (антидиабетни лекарства)	възможни са взаимодействия
хинолонови антибиотици	рискът от конвулсии (припадъци) може да се повиши
мифепристон (използва се за прекъсване на бременност)	ефектът на мифепристон може да бъде намален
Ацетилсалицилова киселина (ниска доза)	ефектът на разреждане на кръвта може да бъде отслабен
Лекарства за разреждане на кръвта (като варфарин)	ибупрофен може да засили ефекта на тези лекарства
Вориконазол и флуконазол (инхибитори на СYP2C9), използвани при гъбични инфекции	ефектът на ибупрофен може да се засили. Намаляването на дозата на ибупрофен трябва да се обмисли, особено когато високи дози ибупрофен се използват с вориконазол или флуконазол

Прием на Парабол Макс с алкохол

Не трябва да пиете алкохол, докато използвате това лекарство. Някои нежелани реакции, като например тези, засягащи стомашно-чревния тракт или централната нервна система, могат да се случат по-често, когато алкохолът се приема едновременно с ибупрофен.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, мислите, че може да сте бременна или планирате да имате бебе, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете това лекарство.

Бременност

Уведомете Вашия лекар, ако забременеете, докато приемате Парабол Макс.

Не приемайте това лекарство, ако сте в последните 3 месеца от бременността, тъй като може да навреди на нероденото Ви дете или да причини проблеми при раждането. Може да причини бъбречни и сърдечни проблеми на Вашето неродено бебе. Може да повлияе на Вашата и на Вашето бебе склонност към кървене и да причини забавено или удължено раждане. Не трябва да използвате това лекарство през първите 6 месеца от бременността, освен ако не е абсолютно необходимо и лекарят не Ви посъветва друго. Ако имате нужда от лечение през този период или докато се опитвате да забременеете, трябва да използвате най-ниската доза за възможно най-кратко време. Ако се приема повече от няколко дни след 20-та седмица от бременността, ибупрофен може да причини проблеми с бъбреците при Вашето неродено бебе, което може да



доведе до ниски нива на амниотичната течност, която заобикаля бебето (олигохидрамнион) или стесняване на кръвоносен съд (артериалния канал) в сърцето на бебето. Ако се нуждаете от лечение за повече от няколко дни, Вашият лекар може да препоръча допълнително наблюдение.

Кърмене

Само малки количества ибупрофен и неговите метаболити преминават в кърмата. Парабол Макс може да се приема по време на кърмене, ако се използва в препоръчаната доза и за възможно най-кратко време.

Фертилитет при жени

Ибупрофен принадлежи към група лекарства (НСПВС), които могат да влошат фертилитета при жените. Този ефект е обратим при спиране на лекарството.

Шофиране и работа с машини

Ибупрофенът обикновено няма или има незначително влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Въпреки това, тъй като при по-високи дози могат да се появят странични ефекти от страна на централната нервна система, като умора и замаяност, способността за шофиране или за работа с машини може да бъде нарушена в отделни случаи. Тези пациенти трябва да избягват шофиране или работа с машини. Това важи в по-голяма степен при комбинация с алкохол.

Парабол Макс съдържа сорбитол

Това лекарство съдържа 72 mg сорбитол във всяка капсула. Сорбитолът е източник на фруктоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че Вие (или Вашето дете) имате непоносимост към някои захари или ако сте били диагностицирани с наследствена непоносимост към фруктоза (HFI), рядко генетично заболяване, при което човек не може да разгради фруктозата, говорете с Вашия лекар преди Вие (или Вашето дете) да приемете това лекарство.

3. Как да приемате Парабол Макс

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Вашият лекар или фармацевт са ви казали. Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако не сте сигурни. Освен ако Вашият лекар не е предписал друго, стандартната доза е:

Дозировка

Възрастни и юноши с тегло от 40 kg (на 12 и повече години)

Като начална доза: приемайте по 1 капсула (400 mg ибупрофен), а след това, ако е необходимо, по 1 капсула (400 mg ибупрофен) на всеки шест часа. Не приемайте повече от 3 капсули за 24 часа.

Деца под 12-годишна възраст и юноши с тегло под 40 kg

Парабол Макс не е предназначен за употреба при юноши с тегло под 40 kg или деца под 12-годишна възраст.

Начин на приложение

За перорална употреба. Приемайте това лекарство с чаша вода. Не дъвчете капсулата.

Препоръчително е пациентите с чувствителен стомах да приемат това лекарство с храна. Ако се приеме малко след хранене, началото на действието на ибупрофен може да се забави. Ако това се случи, не приемайте повече Парабол Макс от препоръчаното в рамките на този раздел или докато не изтече правилният интервал за повторно дозиране.

Продължителност на лечението

Този продукт е само за краткосрочна употреба. Най-ниската ефективна доза трябва да се използва за най-краткото време, необходимо за облекчаване на симптомите.

Подрастващи



Ако при деца и юноши този лекарствен продукт е необходим за повече от 3 дни, или ако симптомите се влошават, трябва да се консултирате с лекар.

Възрастни

Ако Парабол Макс е необходим за повече от 3 дни за лечение на повишена температура и 4 дни за лечение на болка или ако симптомите се влошат, консултирайте се с Вашия лекар. Моля, говорете с лекар или фармацевт, ако смятате, че ефектът на това лекарство е по-голям или по-малък от очаквания.

Ако сте приели повече от необходимата доза Парабол Макс

Ако сте приели повече от необходимата доза Парабол Макс или ако деца са приели това лекарство случайно се свържете с Вашия лекар или най-близката болница, за да получите оценка за риска и съвет за предприемане на действия. Симптомите на предозиране могат да включват гадене, повръщане (може да има капки от кръв), кръв в изпражненията (стомашно-чревно кървене), шум в ушите, главоболие, болки в стомаха, диария и треперещи движения на очите. При високи дози са съобщавани слабост и замаяност, сънливост, объркване, дезориентация, загуба на съзнание, усещане за хлад, болка в гърдите, палпитации, гърчове (главно при деца), кръв в урината, ниски нива на калий в кръвта и проблеми с дишането.

Ако имате някакви допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите реакции могат да бъдат сведени до минимум, като се приема най-ниската доза за най-краткото време, необходимо за облекчаване на симптомите. Възможно е да получите някои от известните нежелани реакции на НСПВС (вж. по-долу). Ако това се случи, или ако имате притеснения, спрете приема на това лекарство и говорете с Вашия лекар възможно най-скоро. Възрастните хора използващи този продукт, са изложени на повишен риск от развитие на проблеми, свързани с нежелани реакции.

Спрете приема на лекарството и потърсете незабавна медицинска помощ, ако развиете:

- **признаци на чревно кървене** като: яркочервени изпражнения, катранено-черни изпражнения, повръщане на кръв или тъмни частици, които приличат на утайка от кафе;
- **признаци на сериозна алергична реакция** като: влошаване на астмата, необясними хрипове или задух, подуване на лицето, езика или гърлото, затруднено дишане, учестен сърдечен ритъм, спад на кръвното налягане, водещ до шок. Това може да се случи дори при първата употреба на това лекарство;
- червеникави плоски, подобни на мишена или кръгли петна по торса, често с мехури в центъра, белене на кожата, язви в устата, гърлото, носа, гениталиите и очите. Тези сериозни кожни обриви могат да бъдат предшествани от повишена температура и грипоподобни симптоми [ексфолиативен дерматит, еритема мултиформе, синдром на Стивънс-Джонсън, токсична епидермална некролиза] [много редки – може да засегнат до 1 на 10 000 души];
- широко разпространен обрив, повишена телесна температура, увеличени лимфни възли и повишаване на еозинофилите (вид бели кръвни клетки) (DRESS синдром) [с неизвестна честота – честотата не може да бъде оценена от наличните данни];
- червен, люспест, широко разпространен обрив с подкожни подутини и мехури, локализирани главно по кожните гънки, торса и горните крайници, придружен от повишена температура. Симптомите обикновено се появяват в началото на лечението (остра генерализирана екзантематозна пустулоза) [с неизвестна честота – честотата не може да бъде оценена от наличните данни];
- Болка в гърдите, която може да е признак на потенциално сериозна алергична реакция наречена синдром на Кунис [неизвестна честота – честотата не може да бъде оценена от наличните данни].



Уведомете Вашия лекар, ако имате някоя от следните нежелани лекарствени реакции, те могат да се влошат или може да забележите други ефекти, които не са изброени.

Чести (може да засегне до 1 на 10 души)

- стомашно-чревни оплаквания, като парене, болки в корема, чувство на отпадналост и лошо храносмилане, повръщане, газове (метеоризъм), диария, запек и леки кръвозагуби в стомаха и/или червата, които в изключителни случаи могат да причинят анемия.

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души)

- язви на стомаха или червата, понякога с кървене и перфорация, възпаление на лигавицата на устата с язва (улцерозен стоматит), възпаление на стомаха (гастрит), влошаване на колит и болест на Крон;
- централни нервни смущения, като главоболие, замаяност, безсъние, възбуда, раздразнителност или умора;
- зрителни смущения;
- алергични реакции, като кожни обриви, сърбеж и астматични пристъпи. Трябва да спрете приема на Парабол Макс и незабавно да информирате Вашия лекар;
- различни кожни обриви.

Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 души)

- тинитус (звънене в ушите);
- Увреждане на бъбреците (папиларна некроза) и повишена концентрация на пикочна киселина в кръвта;
- увреждане на слуха;
- повишена концентрация на урея в кръвта;
- намаляване на нивата на хемоглобина.

Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 души)

- във връзка с лечение с НСПВС са съобщавани подуване (оток), високо кръвно налягане (хипертония) и сърдечна недостатъчност;
- възпаление на хранопровода или панкреаса, образуване на мембраноподобни стеснения в тънките и дебелите черва (чревни, мембранни стриктури);
- тежки инфекции на кожата и усложнения на меките тъкани са възникнали по време на инфекция с варицела (варицела);
- отделяне на по-малко урина от нормалното и подуване (особено при пациенти с високо кръвно налягане или намалена бъбречна функция); подуване (оток) и мътна урина (нефротичен синдром); възпалително бъбречно заболяване (интерстициален нефрит), което може да доведе до остра бъбречна недостатъчност. Ако се появи някой от гореспоменатите симптоми или ако имате силна обща отпадналост, спрете приема на Парабол Макс и незабавно се консултирайте с Вашия лекар, тъй като това може да са първите признаци на бъбречно увреждане или бъбречна недостатъчност;
- проблеми с образуване на кръвни клетки - първите признаци са: повишена температура, възпалено гърло, повърхностни язви в устата, грипоподобни симптоми, силно изтощение, кървене от носа и кожата. В тези случаи трябва незабавно да спрете терапията и да се консултирате с лекар. Не трябва да лекувате тези симптоми с болкоуспокояващи или лекарствени продукти, които намаляват температурата (антипиретични продукти);
- психотични реакции и депресия;
- описано е влошаване на инфекциозни възпаления (напр. некротизиращ фасциит), свързани с употребата на някои болкоуспокояващи (НСПВС). Ако по време на употребата на Парабол Макс се появят или влошат признаци на инфекция, трябва незабавно да отидете на лекар, за да се проучи дали има нужда от антиинфекциозна/антибиотична терапия;
- високо кръвно налягане, сърдечбиене, сърдечна недостатъчност, сърдечен удар;
- нарушена чернодробна функция, увреждане на черния дроб, особено по време на продължително лечение, чернодробна недостатъчност, остро възпаление на черния



- дроб (хепатит);
- симптоми на асептичен менингит със скованост на врата, главоболие, чувство на неразположение, треска или помрачаване на съзнанието са наблюдавани при употреба на ибупрофен. Пациентите с автоимунни нарушения (СЛЕ, смесено съединително-тъканно заболяване) може да са по-склонни да бъдат засегнати. Свържете се незабавно с лекар, ако те се появят;
- косопад (алопеция);
- тежки общи реакции на свръхчувствителност;
- влошаване на астмата и бронхоспазъм;
- възпаление на кръвоносните съдове (васкулит).

С неизвестна честота (честотата не може да бъде определена от наличните данни)

- кожата става чувствителна към светлина (реакция на фоточувствителност).

Лекарства като ибупрофен могат да бъдат свързани с леко повишен риск от сърдечен удар ("миокарден инфаркт") или инсулт.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

тел.: +359 2 8903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Парабол Макс

Съхранявайте това лекарство на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение. Съхранявайте в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

Не изхвърляйте лекарства чрез отпадъчни води или битови отпадъци. Попитайте Вашият фармацевт как да изхвърлите лекарства, които вече не използвате. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация.

Какво съдържа Парабол Макс

Активното вещество е ибупрофен. Всяка капсула съдържа 400 mg ибупрофен.

Другите съставки са: макрогол 600 (E1521), калиев хидроксид (E525), пречистена вода, желатин, течен частично дехидратиран сорбитол (E420).

Как изглежда Парабол Макс и какво съдържа опаковката

Прозрачна, продълговата, мека желатинова капсула (около 15,8 mm x 9,8 mm), съдържаща бистра безцветна течност.

Парабол Макс се предлага в опаковки от 10, 20 или 30 меки капсули в блистери. Не всички размери опаковки ще бъдат пуснати на пазара.



Притежател на разрешението за употреба

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Германия

Производители

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Германия

Centrafarm Services B.V.
Van de Reijtstraat 31 E
4814NE Breda
Нидерландия

Clonmel Healthcare Ltd.
Waterford Road
Clonmel, Co. Tipperary
Ирландия

Този лекарствен продукт е разрешен под следните имена в ЕИО:

България: Парабол Макс

Чешка Република: IBOVAL RAPID

Ирландия: Easofen Rapid Relief Max Strength 400 mg soft capsules

Нидерландия: Ibuprofen Healthypharm liquid caps 400 mg, zachte capsules

Румъния: Modafen Forte 400mg capsule moi

Белгия: Ibuprofen EG Rapidcaps 400 mg zachte capsules

Ibuprofen EG Rapidcaps 400 mg capsules molles

Ibuprofen EG Rapidcaps 400 mg Weichkapseln

Германия: Ibudolor 400 mg Weichkapseln

Естония: Ibuprofen STADA

Испания: Ibuprofeno Rapid Stadacare 400 mg cápsulas blandas

Франция: IBUPROFENE EG CONSEIL 400 mg, capsule molle

Люксембург: Ibuprofen EG RapidCaps 400 mg capsules molles

Литва: Ibuprofen STADA 400 mg minkštosios kapsulės

Латвия: Ibuprofen STADA 400 mg mīkstās kapsulas

Полша: Ibuprofen MODAFEN Forte Caps

Дата на последно преразглеждане на листовката

02/2026

