

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Septolete plus lozenges
Benzocaine, cetylpyridinium chloride
Септолете плюс таблетки за смучене
бензокаин, цетилпиридин хлорид

Двойно действие
При болезнено гърбо
антисептик

Прочетете внимателно упътването, преди да започнете да вземате това лекарство, защото то съдържа важна за вас информация.

Този лекарствен продукт се дава без рецепта за лечение на по-леки заболявания без лекарска намеса. Независимо от това, вие трябва да използвате лекарството внимателно, за да имате максимален ефект от него.

- Запазете листовката. Може да ви се наложи да я прочетете отново.

- Ако имате нужда от допълнителна информация или съвет, консултирайте се с Вашия фармацевт.

- Трябва да се консултирате с лекар, ако не почувствате подобрение след 3-дневно лечение.

- Ако някои от нежеланите реакции станат сериозни, или ако забележите нежелани реакции, които не са споменати в тази листовка, моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт.

В листовката:

1. Какво е Septolete plus и за какво се използва?
2. Преди да приемете Septolete plus
3. Как да приемате Septolete plus
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да се съхранява Septolete plus
6. Допълнителна информация


1. КАКВО Е SEPTOLETE PLUS И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

Таблетките за смучене Septolete plus оказват местно обезболяващо и антимикробно действие. Така те дезинфекцират устната кухина и гърлото и облекчават болката там.

Таблетките за смучене съдържат антисептика цетилпиридин хлорид, който унищожава някои бактерии и гъбички, а също в известна степен потиска развитието на вирусите. По този начин той успокоява възпалената уста и фаринкса и преди всичко предотвратява развитието на по-тежки бактериални инфекции. Тъй като може лесно да бъде овлажнен и има по-малко повърхностно съпротивление, цетилпиридин хлорид прониква и в труднодостъпните части на лигавицата на устата и гърлото където потиска бактериалния растеж.

Бензокаин е местен анестетик, подходящ за облекчаване на болката при гълтане, която често съпровожда инфекциите и възпаленията на устата и гърлото.

Таблетките за смучене Septolete plus съдържат полиолите малтитол и манитол. Те не съдържат захар, която е необходима за бактериалния растеж. Таблетките за смучене



Septolete plus са подходящи за диабетици, те не причиняват образуване на зъбна плака, а антисептичният им ефект е много по-добър поради липсата на захар в тях.

Таблетките за смучене Septolete plus се препоръчват за облекчаване на болката и за дезинфекция:

- при леки инфекции на устната кухина и гърлото (фарингити, ларингити, начало на ангина (силно болезнено гърло)).
- при възпаление на венците и на лигавицата на устата (гингивити, стоматити) ;

2. ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕТЕ SEPTOLETE PLUS

Не трябва да използвате таблетките за смучене Septolete plus

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към бензокаин, цетилпиридин хлорид или към някое от помощните вещества на Septolete plus.

Обърнете специално внимание на Septolete plus

- Ако имате отворена рана в устата, тъй като цетилпиридин хлорид забавя заздравянето на раните.
- Ако имате по-тежка инфекция, придружена с висока температура, главоболие и повръщане, трябва да се консултирате с вашия лекар, и то най-вече, ако симптомите ви не се подобряват след 3 дни;
- Ако сте пациент с диабет, трябва да знаете, че всяка таблетка за смучене съдържа 1 g малтитол. Поради забавена хидролиза и абсорбция в стомашно-чревния тракт, малтитол слабо повлиява нивото на кръвната захар.

Таблетките за смучене Septolete plus не се препоръчват при деца под 6 годишна възраст. Не се препоръчва приемането на дози, по-високи от предписаните.

Прием на други лекарствени продукти

Моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, които са без рецепта.

Не е известно Septolete plus да влияе върху ефектите на други лекарствени продукти.

Прием на таблетките за смучене Septolete plus с храната и напитки

Не трябва да вземате таблетките за смучене Septolete plus непосредствено преди хранене или с прясно мляко.

Бременност и кърмене

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди да започнете да вземате каквото и да е лекарствено средство.

Тъй като данните за безопасност по време на бременност и кърмене са ограничени, не се препоръчва приемането на таблетките за смучене Septolete plus по време на бременност и кърмене.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Не е докладвано таблетките за смучене Septolete plus да влияят на способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация за някои от помощните вещества на Septolete plus



Septolete plus лозенги съдържат малтитол. Ако имате непоносимост към някои видове захари, информирайте Вашия лекар за това.

3. КАК ДА СЕ ПРИЕМА SEPTOLETE PLUS

Винаги приемайте Septolete plus точно както ви е казал Вашия лекар. Ако за нещо не сте сигурен, трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчаната дозировка за лица в зряла възраст и деца над 12 години е до 8 таблетки за смучене на ден. Трябва да смучете по 1 таблетка на всеки 2 до 3 часа .

При деца от 6- до 12-годишна възраст се препоръчват до 4 таблетки за смучене на ден. Тези деца трябва да смучат по 1 таблетка на всеки 4 часа.

Ако вземете повече таблетки за смучене Septolete plus, отколкото е нужно

Като се има предвид какво е количеството на активните съставки в една таблетка за смучене, възможността за предозиране е минимална. Поглъщането на голям брой таблетки за смучене, може да доведе до стомашно-чревни проблеми: гадене, повръщане и диария. В такива случаи трябва да спрете да вземате лекарството, да пиете много вода или прясно мляко и да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт.

Ако забравите да вземете Septolete plus

Не взимайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Подобно на другите лекарствени средства, таблетките за смучене Septolete plus може също да причинят нежелани реакции, въпреки че не всички могат да ги проявят.

Ако таблетки за смученете Septolete plus се употребяват според предписанията, нежеланите реакции са редки. При чувствителни хора, по-високи от предписаните дози може да причинят стомашно-чревни разстройства поради дразнене на лигавичната мембрана на стомашно-чревния тракт.

Много рядко могат да настъпят алергични реакции.

Ако наблюдавате каквато и да било нежелана реакция, дори и тя да не е описана в тази листовка, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВА SEPTOLETE PLUS

Съхранявай в оригинална опаковка. Защиатавай от светлина и влажност

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Не употребявайте лекарството след изтичане на срока на годност, отбелязан на опаковката.

Срок на годност

Septolete plus не трябва да се използва след срока на годност, който е отбелязан на опаковката. Срока на годност се отнася до последния ден от месеца.



6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Septolete plus

- Активните вещества са benzocaine(бензокаин) и cetylpyridinium chloride (цетилпиридин хлорид). Всяка таблетка за смучене съдържа 5 mg benzocaine и 1 mg cetylpyridinium chloride.

Помощни вещества са: ментово есенциално масло, левоментол, малтитол течен, малтитол, манитол, глицерол, рициново масло, магнезиев стеарат, колоиден силиций, безводен, повидон, фармацевтичен восък, титаниев диоксид (E171), син оцветител V (E131).

Как изглежда Septolete plus и съдържанието на опаковката

Таблетите за смучене са сини на цвят, кръгли, двойноизпъкнали и лъскави.

Таблетите за смучене се предлагат в опаковки по 30, в блистерно фолио. Всяка кутия съдържа 3 блистера по 10 лозенги.

Таблетите за смучене се предлагат и в опаковки по 18, в блистерно фолио. Всяка кутия съдържа 2 блистера по 9 лозенги.

Информация за предписване

Без лекарско предписание.

Производител и притежател на разрешението за употреба

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Словения

Дата на последна корекция на листовката

май 2008

