



SCHUSSLER SALTS

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

## СИЛИЦЕЯ D12 сублингвални таблетки Силицея D12

SILICEA D12 sublingual tablets  
Silicea D12

Шуслерова сол № 11  
Schussler salt № 11

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

### Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява СИЛИЦЕЯ D12 сублингвални таблетки и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете СИЛИЦЕЯ D12 сублингвални таблетки
3. Как да приемате СИЛИЦЕЯ D12 сублингвални таблетки
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате СИЛИЦЕЯ D12 сублингвални таблетки
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

### 1. Какво представлява СИЛИЦЕЯ D12 сублингвални таблетки и за какво се използва

СИЛИЦЕЯ D12 сублингвални таблетки е хомеопатичен лекарствен продукт без специфични терапевтични индикации.

### 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете СИЛИЦЕЯ D12 сублингвални таблетки

#### Не приемайте СИЛИЦЕЯ D12 сублингвални таблетки

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

#### Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете СИЛИЦЕЯ D12 сублингвални таблетки.

#### Други лекарства и СИЛИЦЕЯ D12 сублингвални таблетки

Не се очаква взаимодействие с други лекарства.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, насърко сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

#### СИЛИЦЕЯ D12 сублингвални таблетки с храна и напитки

Не се очаква специфично взаимодействие с храни и напитки, но за предпочитане е да приемате това лекарство най-малко половин час преди или след хранене.

#### Бременност, кърмене и fertilitet

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

#### Шофиране и работа с машини

СИЛИЦЕЯ D12 сублингвални таблетки не засягат способността за шофиране и работа с машини.

Това лекарство съдържа лактоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да приемете този лекарствен продукт.

СИЛИЦЕЯ D12 сублингвални таблетки не съдържа глутен.

### 3. Как да приемате СИЛИЦЕЯ D12 сублингвални таблетки

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителните дози са следните:

Възраст на пациента	Остри състояния	Хронични състояния
Възрастни и деца над 12 години	По 1 сублингвална таблетка до 6 пъти дневно	По 1 сублингвална таблетка 1-3 пъти дневно
Деца от 6 до 11 години	По 1 сублингвална таблетка до 4 пъти дневно	По 1 сублингвална таблетка 1-2 пъти дневно
Деца от 1 до 5 години препоръчително е таблетката да се разтвори в малко количество вода	По 1 сублингвална таблетка до 3 пъти дневно	1 сублингвална таблетка дневно
Под 1 година*	Разтворете 1 до 2 таблетки в половин чаша вода и давайте на детето по една супена лъжица от този разтвор 1 до 3 пъти на ден.	Разтворете 1 таблетка в половин чаша вода и давайте на детето по една супена лъжица от този разтвор 1 до 3 пъти на ден.

Оставете сублингвалната таблетка бавно да се разтвори в устата.

#### Приложение при деца

\* Деца под 1-годишна възраст трябва да бъдат прегледани от лекар преди да се използва СИЛИЦЕЯ D12 сублингвални таблетки.

**Ако сте приели повече от необходимата доза СИЛИЦЕЯ D12 сублингвални таблетки**

Не се очакват нежелани ефекти в случай на предозиране.

**Ако сте пропуснали да приемете СИЛИЦЕЯ D12 сублингвални таблетки**

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

**Ако сте спрели приема на СИЛИЦЕЯ D12 сублингвални таблетки**

Не се очакват нежелани ефекти при прекратяване на приема на СИЛИЦЕЯ D12 сублингвални таблетки.

Ако имате никакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### 4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

#### Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно на:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +35928903417

уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

#### 5. Как да съхранявате СИЛИЦЕЯ D12 сублингвални таблетки

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелзан върху блистера и картонената опаковка.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Срок на годност: 5 години.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

#### 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

##### Какво съдържа СИЛИЦЕЯ D12 сублингвални таблетки

Всяка таблетка от 250 mg съдържа:

Силицея (Silicea trit.) D12.

Помощни вещества: магнезиев стеарат, лактоза, кроскармелоза.

##### Как изглежда СИЛИЦЕЯ D12 сублингвални таблетки и какво съдържа опаковката

Кутия с 80 сублингвални таблетки, съдържаща 8 блистера с по 10 таблетки.

##### Притежател на разрешението за употреба и производител

BOIRON

2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS

69510 MESSIMY

Франция

Дата на последно преразглеждане на листовката {10/2020}