

Листовка: информация за потребителя

СИМИЛАСАН Стрейнт Ай капки за очи, разтвор
SIMILASAN Strained Eye, eye drops, solution

Sodium chloride D 6/ Ruta graveolens D 6/ Cineraria maritima D 6

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява *СИМИЛАСАН Стрейнт Ай* и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате *СИМИЛАСАН Стрейнт Ай*
3. Как да използвате *СИМИЛАСАН Стрейнт Ай*
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате *СИМИЛАСАН Стрейнт Ай*
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява *СИМИЛАСАН Стрейнт Ай* и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт

В съответствие с хомеопатичните принципи *Симиласан Стрейнт Ай*, капки за очи може да се използва локално за облекчаване признаците и симптомите на:

- Умора, възпаление и парене на очите;
- Преумора и съзене на очите (лакримация);
- Зрителни нарушения, като замъглено или слабо виждане;
- Напрежение и болки в очите (вследствие на работа с компютър, гледане на телевизия, четене, шофиране).

Използването на този хомеопатичен лекарствен продукт се основава само на хомеопатичен опит.

Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате *СИМИЛАСАН Стрейнт Ай*

Не използвайте *СИМИЛАСАН Стрейнт Ай*:

- Ако сте алергични към активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- При малки деца под 2-годишна възраст.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате *СИМИЛАСАН Стрейнт Ай*, ако:

- Имате катаракта или глаукома;
- Страдате от други заболявания;
- Имате алергии;
- Приемате други лекарства (дори такива, които сте закупили без рецепта) за вътрешно или външно приложение.

При употреба на хомеопатично лекарство, първоначално симптомите могат да станат по-изразени за кратък период от време (първоначално обостряне).

Мерки, които трябва да се вземат в случай на първоначално влошаване (първоначално обостряне) на симптомите:

- Спрете употребата на лекарството, докато влошаването не премине.
- Отново започнете лечението до пълно възстановяване.
- Ако влошаването на симптомите продължава, прекратете използването на *СИМИЛАСАН Стрейнт Ай* и информирайте Вашия лекар или фармацевт.

При възпаление на окото, не се препоръчва носене на контактни лещи. Все пак, ако това се налага, отстранете контактните лещи, преди да използвате капките за очи и поставете лещите най-рано 15 минути след прилагане на лечението.

При използване на *СИМИЛАСАН Стрейнт Ай* капки за очи преди лягане и сутрин след събуждане, е препоръчително да сте свалили контактните си лещи или да изчакате 15 минути, преди да поставите лещите в очите.

Моля да имате предвид, че сухите очи са по-чувствителни към използването на контактни лещи.

Ако състоянието Ви се влоши или се появяват нови симптоми като замъглено виждане или болка, незабавно се консултирайте с Вашия лекар.

Използването на този хомеопатичен лекарствен продукт не може да замени лекарската диагноза или други предписани от лекаря лекарствени продукти.

Деца

Поради недостатъчно данни, използването на *СИМИЛАСАН Стрейнт Ай* при деца под 2-годишна възраст не се препоръчва.

Други лекарства и СИМИЛАСАН Стрейнт Ай

Въпреки че до този момент не са съобщени взаимодействия със *СИМИЛАСАН Стрейнт Ай*, ако приемате други лекарства, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате тези капки за очи.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Бременност, кърмене и фертилитет

Досегашният опит показва, че няма известен риск при бременност или кърмене, когато продуктът се използва в съответствие с препоръките.

Въпреки това, с този продукт никога не са провеждани систематични клинични изпитвания.

Като предпазна мярка, ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини



СИМИЛАСАН Стрейнт Ай капки за очи няма или има незначително влияние върху способността за шофиране или работа с машини.

3. Как да използвате *СИМИЛАСАН Стрейнт Ай*

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза

Деца над 2-годишна възраст и възрастни: 1-2 капки във всяко око веднъж или няколко пъти на ден, освен ако Вашият лекар не е предписал друго.

Инструкции за употреба:

- Притиснете меката част на апликатора-капкомер с два пръста и капнете капките в окото.
- Избягвайте да докосвате върха на капкомера с пръсти и директен контакт с окото.
- След употреба веднага поставете капачката и затворете опаковката.

Спазвайте дозировката, указана в листовката или предписана от Вашия лекар. Ако не се наблюдава подобрение, особено при дете, потърсете съвет от лекар. Ако смятате, че лекарството Ви действа твърде слабо или прекалено силно, говорете с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте използвали повече от необходимата доза *СИМИЛАСАН Стрейнт Ай*
Досега не са съобщавани случаи на предозиране.

Ако сте пропуснали да използвате *СИМИЛАСАН Стрейнт Ай*
Не използвайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

При употреба на *СИМИЛАСАН Стрейнт Ай* в съответствие с предписанията, са наблюдавани изолирани случаи на реакции на свръхчувствителност, като парене, дразнене, зачервяване, сърбеж и болка в очите.

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако забележите някакви нежелани реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ №8,

1303 София,

тел: +35928903417,

уебсайт: www.bda.bg.



Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате СИМИЛАСАН Стрейнт Ай

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената кутия след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Срок на годност след първо отваряне: 3 месеца.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарства, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа СИМИЛАСАН Стрейнт Ай

Активните вещества са: Sodium chloride D 6/ Ruta graveolens D 6/ Cineraria maritima D 6.

Другите съставки са: натриев нитрат, натриев тетраборат, борна киселина, сребърен сулфат, пречистена вода.

Как изглежда СИМИЛАСАН Стрейнт Ай и какво съдържа опаковката

СИМИЛАСАН Стрейнт Ай капки за очи е стерилен, прозрачен, безцветен разтвор, в кафява стъклена бутилка от 10 ml.

Притежател на разрешението за употреба

ММ Фарма Сървис ЕООД
ул. Родопи № 65, ет. 4, ап.6
гр. Пловдив 4000
България

Производител

Медитрайл Интернешънълс ЕООД
ул. Цанко Церковски №80
София 1421
България

Дата на последно преразглеждане на листовката

