

Листовка: Информация за потребителя

Синупрет сироп

Sinupret syrup

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 3	
Към Рег. №	20180047
Разрешение №	62056 / 04-04-2023
BG/MA/MP -	
Одобрение №	

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани лекарствени реакции неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 7 - 14 дни не се чувствате по-добре или се състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Синупрет сироп и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемате Синупрет сироп
3. Как да приемате Синупрет сироп
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Синупрет сироп
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация.

1. Какво представлява Синупрет сироп и за какво се използва

Синупрет сироп е растителен лекарствен продукт за лечение на остро и хронично възпаление на околоносните кухини и дихателния тракт и се използва като допълнително средство към антибиотичната терапия на подобни състояния.


2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Синупрет сироп

Не приемайте Синупрет сироп:

Ако сте алергични към някое от активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, ако симптомите продължат за период по-дълъг от 7 - 14 дни, състоянието Ви се влошава или симптомите се появяват периодично отново и/или ако имате повишена температура, кървене от носа, силна болка, гноен секрет от носа, влошаване на зрението или изтръпване на лицето, защото тези симптоми или реакции по принцип са считани за сериозни показания на всякакви форми на риносинусит, които изискват преглед от медицински специалист и спешно медицинско лечение.



При пациенти с установен гастрит и при пациенти с чувствителен стомах е необходимо особено внимание при приемането на това лекарство. Препоръчително е да приемате Синупрет сироп след хранене и с чаша вода.

Деца:

Употребата от деца на възраст под 2 години не е препоръчително поради липсата на достатъчно информация.

Други лекарства и Синупрет сироп

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Няма известни взаимодействия с други лекарства до настоящия момент.

Синупрет сироп с храна и напитки

Синупрет сироп може да се приема с храна, напитка или между храненията (вижте точка 3. Как да приемате Синупрет сироп).

Бременност, кърмене и фертилитет

Поради съображения за безопасност Синупрет сироп трябва да се използва по време на бременност само след точна преценка на рисковете и ползите, извършена от наблюдаващия лекар.

Не е известно дали активните вещества на Синупрет сироп се отделят в кърмата. Синупрет сироп трябва да се използва по време на кърмене само след точна преценка на рисковете и ползите, извършена от наблюдаващия лекар.

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Не са необходими специални предпазни мерки.

Синупрет сироп съдържа 448 mg алкохол (етанол) в 7,0 ml, което е еквивалентно на 64 mg/ml (8 % o/o). Количеството в 7,0 ml от това лекарство е еквивалентно на 12 ml бира или 5 ml вино. Малкото количество алкохол в това лекарство няма да има забележими ефекти.

Синупрет сироп съдържа течен малтитол. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с Вашия лекар преди да приемете този лекарствен продукт.

7,0 ml съдържат 5,5 g течен малтитол. Калорийната стойност е 2,3 kcal/g течен малтитол. Течният малтитол може да има лек слабителен ефект.

3. Как да приемате Синупрет сироп

Винаги приемайте това лекарство точно, както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия или фармацевт.

Ако не е предписано друго от Вашия лекар, обикновената дозировка е:



Възраст	Единична доза	Обща дневна доза
Деца на възраст до 2 години	Неприложимо	-
Деца на възраст от 2 до 5 години	2,1 ml. = 2,5 g	6,3 ml. = 7,5 g (3 пъти по 2,5 ml)
Деца на възраст от 6 до 11 години	3,5 ml. = 4,2 g	10,5 ml. = 12,6 g (3 пъти по 3,5 ml)
Младежи на възраст 12 и повече години и възрастни	7,0 ml. = 8,4 g	21,0 ml. = 25,2 g (3 пъти по 7,0 ml.)

Начин на употреба

Приемайте Синупрет сироп, като използвате приложената мерителна чашка 3 пъти на ден (сутрин, обед, вечер) неразреден или с малко вода. Ако е необходимо поглъщане с течност (различна от алкохол), се препоръчва чаша вода, която може да се изпие след това. Синупрет сироп може да бъде приеман с храна, с напитки или между храненията. Ако имате чувствителен стомах, най-добре приемайте Синупрет сироп след хранене.

Разклатете преди употреба!

Продължителност на употреба

Ако не е предписано друго, продължителността на приемане е от 7 до 14 дни. В случай, че нямате подобрение в рамките на този срок, моля, консултирайте се с Вашия лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Синупрет сироп

Ако сте приели повече от необходимата доза Синупрет сироп, моля уведомете Вашия лекар. Той може да вземе решение за необходимите мерки, които следва да се предприемат. Възможно е нежеланите реакции, описани по-долу, да бъдат по-интензивни.

Ако сте пропуснали да приемете Синупрет сироп

Ако сте приели твърде малко Синупрет сироп или сте забравили да приемете Синупрет сироп, не приемайте двойна доза следващия път, а продължете да го приемате поначина, предписан Ви от Вашия лекар или както е описано в тази листовка.

Ако сте спрели приема на Синупрет сироп

Прекъсването на приема на Синупрет сироп обикновено е безвредно.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Като всички лекарства това лекарство може да причини нежелани лекарствени реакции, въпреки, че не всеки ги получава.

Стомашно-чревни оплаквания (като стомашна болка, гадене) са **нечести (може да засегнат до 1 от 100 човека)**.

Реакции на свръхчувствителност на кожата (като обрив, зачервяване, сърбеж) са **нечести (може да засегнат до 1 от 100 човека)**.



Тежки системни алергични реакции (като подуване на устните, езика и гърлото и/или ларинкса със стесняване на въздушните пътища (ангиодем), задух, подуване на лицето) също може да се появят. Те са с неизвестна честота (честотата не може да се установи от наличната информация).

При първите признаци на реакция на свръхчувствителност Синупрет Сироп не бива да бъде приеман отново.

Ако се появи нежелана реакция, приемът на лекарството трябва да се прекрати и трябва да се говори с лекар. Лекарят може да определи тежестта и дали е необходимо някакво действие.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всякакви възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ №8, 1303, София, телефон +35 928 903 417, уебсайт www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Синупрет сироп

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Съхранявайте бутилката във външната картонена опаковка, за да я предпазите от светлина.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Синупрет сироп след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и бутилката (етикета). Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Информация относно срока на годност след отварянето:

Синупрет сироп може да бъде съхраняван за срок от 6 месеца след отварянето.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате.

Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и друга информация

Какво съдържа Синупрет сироп

Активното вещество е:

100 g сироп съдържат: 10 g екстракт (1:11) от корен на тинтява (*Gentianae radix*), иглика, цвят с чашка (*Primulae flos cum calycibus*), стрък на върбинка (*Verbenae herba*), стрък на киселец (*Rumicis herba*), цвят на черен бяз (*Sambuci* екстрахиращ агент – етанол 59 % (o/o).

Съдържа 8 % (o/o) алкохол (етанол).

Другите помощни вещества са:

Течен матитол, вкус на череша, пречистена вода.



Как изглежда Синупрет сироп и какво съдържа опаковката

Синупрет сироп се предлага в кафява стъклена бутилка от 100 ml с помощно средство за дозиране, капачка със защита от външна намеса и мерителна чаша. Синупрет сироп е светлокафяв, бистър, гъст сироп с мирис на череша и сладък вкус.

Може да се появи леко помътняване или утайка по време на съхранение, която не влияе върху действието на лекарството.

Притежател на разрешението за употреба и производител

BIONORICA SE

Kerschensteinerstrasse 11-15

92318 Neumarkt

Телефон: +49 (0) 9181 231-90

Телефакс: +49 (0) 9181 231-265

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба в България:

Айкор България ЕООД

Бул. „Илиянци“ № 42, гр. София 1220, България

Тел.: +359885189691

Дата на последно преразглеждане на листовката: февруари 2023 г.

