

АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
 Приложение 2
 Листовка: информация за потребителя 9800132
 SOLKOSERYL 8,30 mg/g гел за очи BG/M/Mp-50869
 депротеинизиран хемодиализат от телешка кръв, химично и биологично стандартизиран
 24-06-2020
 SOLCOSERYL 8.30 mg/g eye gel
 protein-free haemodialysate of calf blood, chemically and biologically standardized

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Солкосерил гел за очи и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Солкосерил гел за очи
3. Как да използвате Солкосерил гел за очи
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Солкосерил гел за очи
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Солкосерил гел за очи и за какво се използва

Солкосерил гел за очи съдържа депротеинизиран хемодиализат от телешка кръв, който подпомага оздравителните процеси. Той е специално предназначен при:

- механични увреждания на роговицата и конюктивата (ерозии и травми), след кератопластика, екстракция на катаракта, антиглаукоматозни операции;
 - химични, термични илъчеви изгаряния на роговицата;
 - корнеални язви, кератити (бактериални, вирусни, гъбични) в стадий на епителизация;
 - дистрофия на роговицата с различен генезис;
- както и за съкращаване срока на адаптация към контактни лещи.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Солкосерил гел за очи

Очните гелове и мази залепват за контактните лещи. Ето защо, когато се използва Солкосерил гел за очи не трябва да се носят контактни лещи. Помнете, че лекарството е предписано за лечение на специфично заболяване. То не трябва да се използва за лечение на други болести или да се прилага на друг човек. Спазвайте хигиенни процедури като миене на ръце до излекуване на очните наранявания.

Не използвайте Солкосерил гел за очи

- ако сте алергични (свърхчувствителни) към депротеинизирания хемодиализат или към някоя от останалите съставки на Солкосерил.

Предупреждения и предпазни мерки

Специални грижи трябва да се полагат ако използвате контактни лещи (вижте по-долу информацията за съставките).



Други лекарства и Солкосерил гел за очи

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Солкосерил има умерено влияние върху способността за шофиране и работа с машини. Краткосрочни зрителни нарушения (намаление на зрителната острота) могат да настъпят непосредствено след използване на гела за очи. Пациентите не трябва да шофират и да работят с машини 20 минути след използване на лекарството.

Солкосерил гел за очи съдържа бензалкониев хлорид, който може да предизвика дразнене.

Бензалкониевият хлорид може да се абсорбира от меките контактни лещи и може да промени цвета на лещите. Трябва да свалите контактните лещи преди употребата на това лекарство и да изчакате поне 15 минути преди да ги поставите отново.

Бензалкониевият хлорид може също да причини дразнене на очите, особено ако имате „сухо око“ или нарушение на роговицата (прозрачния слой в предната част на окото).

Ако имате необичайно усещане в окото, като парене или болка в окото след употребата на това лекарство, говорете с Вашия лекар.

3. Как да използвате Солкосерил гел за очи

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е 1 капка 3-4 пъти дневно в конюктивната торбичка, ако лекарят не е предписал друга схема.

След използване, незабавно затворете тубата и не докосвайте крайника.

Продължителността на лечението е не повече от 7-10 дни.

Не променяйте предписаната доза без разрешение на лекаря. Ако усетите, че ефекта от лечението е много слаб или твърде силен, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да използвате Солкосерил гел за очи

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели употребата на Солкосерил гел за очи

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

След накапване на Солкосерил гел е възможно да възникне преходно краткотрайно парене, което не е причина за прекратяване на лечението. Активните вещества от очния гел може да достигнат до кръвния поток и нежеланите реакции може да са не само локални, но и да се изразят на други места в тялото.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

5. Как да съхранявате Солкосерил гел за очи

Да се съхранява под 30°C.



Да се съхранява в оригинална опаковка.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не използвайте Солкосерил гел за очи по-дълго от четири седмици след отваряне на тубата.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Солкосерил гел за очи

- Активното вещество е: депотеинизиран хемодиализат от телешка кръв, химично и биологично стандартизиран 8,3 mg/g.

- Другите съставки са: бензалкониев хлорид, натриев едетат, сорбитол, кармелоза натрий и вода за инжекции.

Как изглежда Солкосерил гел за очи и какво съдържа опаковката

Солкосерил гел за очи се предлага в алуминиева туба от 5 g, поставена в картонена кутийка.

Притежател на разрешението за употреба

Майлан ЕООД

Офис сграда „Сердика офиси“

бул. Ситняково № 48, ет. 7

1505 София

България

Производител

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstrasse 1

61352 Bad Homburg

Германия

Дата на последно преразглеждане на листовката:

04/2020

