

Листовка: информация за потребителя  
ЕТАНОЛОВ РАЗТВОР НА ЙОД КУПРО 5%, дермален разтвор  
SOLUTION IODÉ SPIRITUEUX КУПРО 5%, cutaneous solution  
Йод (Iodine) 5%

**МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО!**

Състав: 50 ml от дермалния разтвор съдържа Йод 2,5g, калиев йодид 1,0g,  
етанол 96% об./об. – 26,0ml и пречиствена вода.

Лекарствена форма и опаковка

Дермален разтвор. Кафран бутлици от полипропилен от 50 ml, затворени с  
капачка на винт от полипропилен.

Име и адрес на произвоителя и притежателя на разрешението за  
употреба

“Купро 94” ООД, ул. “Иван Момчилов” 2, 5100 Горна Оряховица, България,  
тел./факс: 0618/600 14.

**Показания**

Антисептично средство за прилагане върху кожата при повърхностни лезии,  
нараствания и рани.

**ИНФОРМАЦИЯ НЕОБХОДИМА ПРЕДИ УПОТРЕБА**

Когато не трябва да се използва Етанолов разтвор на йод 5%

При съвкупствителност към някои от съставките, при прилагане дерматит  
и изгаряния.

**Специални предупреждения при употреба**

- \* Да не се приема вътрешно!
- \* Да не се нанася върху дигавици!
- \* Лекарствения продукт не трябва да се прилага под формата на компрес и  
под оклузивни преарзакти!
- \* Лекарствения продукт не трябва да се прилага след изтичане на срока на  
годност, отбелязан върху опаковката.
- \* Да се пазят очите!
- \* Да се съхранява на място, недостъпно за деца!
- \* Ако след употреба на лекарствения продукт симптомите продължават или  
състоянието се влоши, лечението трябва да се преосени.
- \* Запални продукти!

Лекарствени и други взаимодействия

Лекарствения продукт не трябва да се прилага едновременно с етерични  
масла, амонячни разтвори и живачни съединения.

Бременност и кърмене

Прилагането на лекарствения продукт по време на бременност и кърмене не  
се препоръчва.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не са известни

**ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА НА  
ЕТАНОЛОВ РАЗТВОР НА ЙОД КУПРО 5%**

Дозировка и начин на употреба

Само за прилагане върху кожата. С помощта на подходящ тампон  
лекарствения продукт се нанася върху съответния кожен участък.  
Приложението на продукта не трябва да продължава повече от една седмица.

Необходими действия при предозироване

При прилагане повече от една седмица може да причини пригитивни и  
корозивни увреждания на кожата.

Нежелани лекарствени реакции

Възможна е проява на нежелани реакции, свързани с нарушение на кожата и  
подкожната тъкан, уртикария и дерматит при външно приложение.

Съхранение

Етанолов разтвор на йод 5% трябва да се съхранява в оригинална опаковка  
при температура до 25 °С, в сухо и защитено от светлина място.

Да се съхранява на недостъпно за деца място!

Срок на годност

Не използвайте Етанолов разтвор на йод 5% след срока на годност, отбелязан  
върху картонената кутия след текста “годен до:”!

На опаковката – 1 (една) година.

Дата на последна редакция на листовката  
Декември 2009г.

