

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

СТОДАЛИНО, сироп
STODALINO, syrup
Хомеопатичен лекарствен продукт

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка Приложение 2	
Към Рег. №	9600039
Разрешение №	26-07-2023
BG/MA/MP	- 63/00
Одобрение №	

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява СТОДАЛИНО, сироп и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете СТОДАЛИНО, сироп
3. Как да приемате СТОДАЛИНО, сироп
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате СТОДАЛИНО, сироп
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява СТОДАЛИНО, сироп и за какво се използва

СТОДАЛИНО, сироп е хомеопатичен лекарствен продукт, използван за симптоматично лечение на кашлица от различен произход.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете СТОДАЛИНО, сироп**Не приемайте СТОДАЛИНО, сироп**

Ако сте алергични (свръхчувствителни) към активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да приемете този лекарствен продукт.

Съдържа 11,1 g захароза на 15 ml и 3,7 g на 5 ml. Това трябва да се има предвид при пациенти със захарен диабет.

Това лекарство съдържа 66 mg или 198 mg алкохол (етанол) във всяка доза от 5 ml или 15 ml съответно еквивалентни на 1,67 % V/V. Количеството в 5 ml от това лекарство е еквивалентно на по-малко от 2 ml бира или 1 ml вино. Количеството в 15 ml от това лекарство е еквивалентно на по-малко от 5 ml бира или 2 ml вино.

Малкото количество алкохол в това лекарство (по-малко от 100 mg в доза от 5 ml) няма да има никакви забележими ефекти.

Това лекарство съдържа 5,4 mg или 16,1 mg бензоена киселина във всяка доза от 5 ml или 15 ml съответно, еквивалентни на 1,07 mg/ml.



Деца

Бензоената киселина може да засили симптомите на жълтеница (пожълтяване на кожата и очите) при новородените (на възраст до 4 седмици).

Други лекарства и СТОДАЛИНО, сироп

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Прием на СТОДАЛИНО, сироп с храни и напитки

Този лекарствен продукт трябва да се приема между храненията.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Няма наблюдавано въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.

СТОДАЛИНО, сироп съдържа етанол, захароза и бензоена киселина.

3. Как да приемате СТОДАЛИНО, сироп

Перорално приложение.

Възрастни и деца над 12 години: Една доза от 15 ml измерена с помощта на мерителната чашка, 3 до 5 пъти на ден.

Деца от 2 до 12 години: Една доза от 5 ml измерена с помощта на мерителната чашка, 3 пъти на ден.

Деца под 2 години: Една доза от 5 ml измерена с помощта на мерителната чашка, 3 пъти на ден. За да се приложи, сиропът трябва да се разрежи в малко количество течност.

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза СТОДАЛИНО, сироп

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете СТОДАЛИНО, сироп

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Не се очакват нежелани лекарствени реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно на

Изпълнителна агенция по лекарствата



ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +35928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате СТОДАЛИНО, сироп

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

СТОДАЛИНО, сироп може да се използва до 12 месеца след датата на първоначално отваряне на бутилката.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа СТОДАЛИНО, сироп

Състав за 100 g

Активните вещества са:

Anemone pulsatilla 6 CH.....	0.95 g
Rumex crispus 6 CH.....	0.95 g
Bryonia 3 CH.....	0.95 g
Ipecacuanha 3 CH.....	0.95 g
Spongia tosta 3 CH.....	0.95 g
Sticta pulmonaria 3 CH.....	0.95 g
Antimonium tartaricum 6 CH.....	0.95 g
Myocarde 6 CH.....	0.95 g
Coccus cacti 3 CH.....	0.95 g
Drosera TM.....	0.95 g

Помощни вещества: сироп от толутанов балсам, сироп от полигала, захарен сироп, карамел, бензоена киселина, етанол 96 об. %.

Как изглежда СТОДАЛИНО, сироп и какво съдържа опаковката

Сироп в бутилка от 200 ml и мерителна чашка или в бутилка от 200 ml с приспособление за отливане и мерителна чашка.

Притежател на разрешението за употреба и производител:

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Франция

Дата на последно преразглеждане на листовката 04/2023

