

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Судафед Бронхо Мед & Лимон 20 mg/ml сироп
Sudafed Broncho Honey & Lemon 20 mg/ml syrup
Гвайфенезин (Guaifenesin)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Код на продукта	20120714
Разрешение №	22510 / 12.06.2013
Обречение №	/

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт. Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след една седмица.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява лекарството и за какво се използва.
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете това лекарство.
3. Как да приемате това лекарство.
4. Възможни нежелани реакции.
5. Как да съхранявате това лекарство.
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява лекарството и за какво се използва

Судафед Бронхо Мед & Лимон 20 mg/ml сироп се използва за облекчаване на влажна кашлица.

Той съдържа:

Гвайфенезин (експекторант), който помага за освобождаване на секрета (флегмата) от белите дробове и улеснява откашлянето му.

Това е лекарство, което не предизвиква сънливост. Лекарството се употребява при възрастни и юноши на възраст 12 и повече години.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете това лекарство

НЕ приемайте това лекарство, ако

сте **алергични** (свръхчувствителни) към гвайфенезин или към някоя от останалите съставки (виж точка 6 и точка 2).

Обърнете специално внимание при употребата на това лекарство

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете това лекарство, ако:
сте имали **кашлица** повече от една седмица, кашлицата Ви се появява **отново** или се придружава от **треска**, **обрив** или **продължително главоболие**.
имате **продължителна кашлица**, която може да е причинена от **асма**.
имате кашлица, с която се отделя много **секрет** (флегма).
страдате от тежки **чернодробни** или **бъбречни проблеми**.
употребявате **алкохол**.



Прием на други лекарства

Винаги информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Не е препоръчително да приемате това лекарство с други лекарства, които са предназначени за спиране на кашлицата (антитусиви или потискащи кашлицата), тъй като те могат да попречат на неговото действие. Някои изследвания на урината може да се повлияят, ако се извършват до 24 часа след приема на това лекарство. Кажете на лекаря или медицинската сестра, която взема проба от урината, че приемате това лекарство.

Прием с храна и напитки

Може да приемате това лекарство с или без храни или напитки.

Съдържа приблизително 2 g захароза/доза. Това трябва да се има предвид при пациенти със захарен диабет.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или мислите, че може да сте бременна, кажете на Вашия лекар или фармацевт. Това лекарство не трябва да се използва по време на бременност, освен ако не Ви е препоръчано от лекар.

Ако кърмите, не вземайте това лекарство, докато не говорите с лекар или фармацевт.

Шофиране и работа с машини

Не се очаква този продукт да повлияе способността Ви да шофирате и да работите с машини. Ако обаче не се чувствате добре, не шофирайте и не работете с машини.

Важна информация относно някои от съставките на това лекарство

Судафед Бронхо Мед & Лимон 20 mg/ml сироп съдържа:

4,7 об % етанол (алкохол), т.е. до 400 mg на доза, еквивалентни на приблизително 10 ml бира, 4 ml вино на доза от 10 ml. Това може да навреди на хората, страдащи от алкохолизъм. Съдържанието на етанол трябва да се има предвид при бременни или кърмещи жени, деца и високорискови групи, напр. пациенти с чернодробно заболяване или епилепсия.

глюкоза и захароза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, консултирайте се преди да вземете това лекарство.

Съдържа приблизително 2 g захароза/доза. Това трябва да се има предвид при пациенти със захарен диабет.



3. Как да приемете това лекарство

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Този сироп е за перорално приложение.

Не прилагайте повече от указаната доза.

Възраст	Доза
Възрастни и юноши на 12 и повече години	Вземете 10 ml (две чаени лъжички от 5 ml) четири пъти дневно
Деца под 12 години	Да не се прилага
Пациенти с чернодробни или бъбречни проблеми	Говорете с лекар или фармацевт

НЕ вземайте повече от 4 дози (40 ml) за 24 часа.

Консултирайте се с лекар, ако симптомите Ви се влошат или ако не се подобрите до една седмица

Ако сте приели повече от необходимата доза от това лекарство

Ако някой е приел твърде голямо количество, свържете се с лекар или с най-близкото спешно отделение, като вземете тази листовка и опаковката с Вас.

Симптомите може да включват:

Стомашно разстройство, гадене и сънливост.

Ако сте пропуснали да приемете това лекарство

Трябва само да вземете това лекарство, като внимателно следвате указанията. Ако забравите да вземете една доза, вземете следващата доза, когато е необходимо. **Не** вземайте двойна доза, за да компенсирате забравената. **Не** вземайте повече от 4 дози (40 ml) за 24 часа.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Судафед Бронхо Мед & Лимон 20 mg/ml сироп може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако получите някоя от следните реакции, СПРЕТЕ приема на лекарството и потърсете незабавно лекарска помощ:

Алергични реакции, включително кожни обриви (които може да бъдат тежки и да включват образуване на мехури и обелване на кожата) и сърбеж.

Други нежелани реакции (странични ефекти), които могат да възникнат, включват:

Гадене или повръщане.

Коремна болка.



Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка, моля кажете на Вашия лекар или фармацевт.

5. Как да съхранявате това лекарство

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Няма специални условия за съхранение.

Да не се използва, ако капачката на бутилката е счупена при купуване.

Не използвайте този продукт след срока на годност, отбелязан върху бутилката и външната картонена опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се използва до 6 месеца след отварянето.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Судафед Бронхо Мед & Лимон 20 mg/ml сироп:

Активно вещество: Гвайфенезин. Този продукт съдържа 100 mg гвайфенезин на 5 ml.

Други съставки:

Натриев цитрат, лимонена киселина, карбомер, глицерол, етанол, глюкоза, захароза, сукралоза, натриев бензоат (E211), карамел (E150), аромати: мед, лимон, охлаждащ, левоментол, освежаващ, затоплящ, вещество за подсилване и вещество за намаляване на горчивия вкус, вода.

(За допълнителна информация относно някои от съставките виж точка 2).

Как изглежда Судафед Бронхо Мед & Лимон 20 mg/ml сироп и какво съдържа опаковката

Судафед Бронхо Мед & Лимон 20 mg/ml сироп е жълто-кафяв сироп за перорална употреба.

Опаковка – бутилка от кафяво стъкло (150 ml) и капачка, защитена от деца.

Моля запазете опаковката.



Притежател на разрешението за употреба:

McNeil Products Ltd.,
c/o Johnson & Johnson Ltd,
Foundation Park,
Roxborough Way,
Maidenhead, Berkshire 3L6 3UG
Великобритания

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Джонсън и Джонсън България ЕООД

Бизнес парк София

Сграда 4, етаж 3

София 1766

Тел. 02/489 94 00

Производител: Famar Orléans, 5 avenue de Concyr, 45071 Orleans, Cedex 2, Франция.

Дата на последно преразглеждане на листовката: Февруари 2013.

Това лекарство е разрешено за употреба в следните страни:

Belgium	Bronchosedal Mucus met warme honing en citroen smaak 20 mg/ml siroop
Bulgaria	Судафед Бронхо Мед & Лимон 20 mg/ml сироп
Cyprus	Benylin Mucus Cough Warm Honey & Lemon Flavour
Czech Republic	Benylin vlhký kašel med & citron 20 mg/ml sirup
Estonia	Sudafed Broncho Honey & Lemon 20 mg/ml
Greece	Hexoral Warm Honey & Lemon
Latvia	Actifed Tussin Honey & Lemon 20 mg/ml sīrups
Lithuania	Actifed Tussin Honey & Lemon 20 mg/ml sirupas
Luxembourg	Bronchosedal Mucus au goût chaud de miel et citron 20 mg/ml sirop
Poland	Benylin Muco na kaszel mokry o smaku cytryny i miodu
Portugal	Cêtusse Mucus mel e limão 100 mg/5 ml Xarope
Romania	Benylin Honey & Lemon 20mg/ml sirop
Slovakia	Benylin sirup s príchuťou medu a citrónu 20 mg/ml
Slovenia	Hexpectral z okusom medu in limone 20 mg/ml sirup
Sweden	Benylin 20 mg/ml Syrup
United Kingdom	Benylin Mucus Cough Warm Honey & Lemon Flavour 20 mg/ml Syrup

