

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

20093570

Сиафен® 100 mg/5 ml перорална суспензия

Syafen® 100 mg/5 ml oral suspension

ибупрофен (*ibuprofen*)

разрешение №

документ №

15-11-2022

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждате от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3 дни детето Ви не се чувства по-добре или състоянието му се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Сиафен и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Сиафен
3. Как да използвате Сиафен
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Сиафен
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Сиафен и за какво се използва

Сиафен перорална суспензия е противовъзпалително, болкоуспокояващо и температуропонижаващо лекарствено средство за употреба в детска възраст. Съдържа активното вещество ибупрофен, което е от групата на нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС).

Сиафен перорална суспензия се използва за:

- бързо и ефективно понижаване на високата температура на Вашето дете, включително след имунизация;
- бързо и ефективно облекчаване на слаба до умерена болка, например при възпаление на гърлото, никнене на млечни зъби, зъбобол, болки в ушите, главоболие, леки травми и навсяхвания;
- облекчаване на симптомите при простуда и грип.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Сиафен**Не използвайте Сиафен:**

- Ако детето Ви е алергично към активното вещество ибупрофен или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- Ако детето Ви някога е страдало от недостиг на въздух, астма, хрема, копривна треска, подуване на лицето, езика, устните или гърлото след прием на ацетилсалциликова киселина (аспирин), или други лекарства за облекчаване на болка и висока температура (НСПВС).
- Ако детето Ви страда или е страдало от язва, перфорация, или кръвоизлив от стомашно-чревния тракт (два или повече епизода на доказани язва или кръвоизлив).
- Ако детето Ви е получавало в миналото перфорация или кръвоизлив от стомашно-чревния тракт след прием на лекарства за облекчаване на болка и висока температура (НСПВС).



- Ако детето Ви страда от тежка чернодробна, бъбречна или сърдечна недостатъчност.
- През последните три месеца от бременността.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате Сиафен.

- Ако детето Ви страда от алергични заболявания, при които има опасност да бъде затруднено дишането (сенна хрема, бронхиална астма, хроничен синузит и/или полипи в носа) или проявява свръхчувствителност към храни и медикаменти.
- Ако детето Ви приема други лекарства от групата на НСПВС (включително COX-2 инхибитори като целеоксиг и еторикоксиг), тъй като едновременната им употреба трябва да се избягва.
- Ако детето Ви страда от автоимунно заболяване като системен лупус еритематозус (SLE) или смесена съединително-тъканна болест.
- Ако детето Ви страда или е страдало от високо кръвно налягане и/или сърдечна недостатъчност. Обсъдете лечението с лекуващия лекар. Не превишавайте препоръчаните дози и продължителността на лечението (24 часа за кърмачета на възраст 3-6 месеца с тегло над 5 kg или 3 дни за деца над 6 месеца).
- Сиафен се прилага с внимание при деца с чернодробни заболявания, бъбречни заболявания, сърдечно-съдови заболявания и нарушен кръвосъсирване.
- Сиафен се прилага с внимание при силно обезводнени деца, тъй като съществува рисък от бъбречно увреждане.
- Ако детето Ви страда от хронично заболяване на червата (болест на Крон или улцерозен колит), тъй като ибупрофен може да го обостри (виж т. 4).
- Сиафен може да раздразни стомаха и червата на Вашето дете по всяко време в хода на лечението, със или без предупредителни симптоми. Незабавно прекратете лечението и се обърнете към лекуващия лекар, ако детето Ви започне да се оплаква от болки в стомаха, гадене, повръщане, особено ако в миналото е имало язва или стомашно-чревен кръвоизлив.
- Ако детето Ви приема Сиафен едновременно с кортикоステроиди (например преднизолон), противосъсирващи лекарства като варфарин, лекарства срещу депресия (SSRIs) или средства, които разреждат кръвта като ацетилсалцилкова киселина, съществува по-голяма опасност от появя на усложнения от страна на стомашно-чревния тракт.
- Сиафен може, макар и рядко да предизвика сериозни кожни реакции (ексфолиативен дерматит, синдром на Стивънс Джонсън). Трябва да спрете приема на Сиафен и незабавно да потърсите лекарска помощ, ако развиете кожен обрив, лезии на лигавиците, мехури или други признания на алергия, тъй като това може да са първите признания на много сериозна кожна реакция. Вижте точка 4.
- Имате инфекция — вж. точка „Инфекции“ по-долу.

Този лекарствен продукт може да се използва при необходимост и от възрастни. Освен горната информация за тях се отнасят и следните предупреждения:

- Има данни, че употребата на лекарства като Сиафен (ibuiprofen), особено във високи дози и за продължителен период от време, може да бъде свързана с леко повишен рисък от проблеми със сърцето (например миокарден инфаркт или инсулт). Не превишавайте препоръчаните дози и продължителността на лечението.
- При проблеми със сърцето, прекаран инсулт или възможен рисък от появата им (например, при високо кръвно налягане, диабет, повишени стойности на холестерола или тютюнопушене) лечението трябва да се обсъди с лекуващия лекар или фармацевт.
- При пациентите в напреднала възраст по-често се наблюдават нежелани реакции при употреба на високи дози НСПВС, особено стомашно-чревните кръвоизливи, язви и перфорации, понякога с фатален изход. Такива пациенти трябва да започват лечението с възможно най-ниската ефективна доза.

Инфекции

Сиафен може да скрие признанията на инфекции, например повищена температура и болка. Поради това е възможно Сиафен да забави подходящото лечение на инфекция, което може да доведе до повишен рисък от усложнения. Това се наблюдава при



пневмония, причинена от бактерии и бактериални кожни инфекции, свързани с варикела. Ако приемате това лекарство, докато имате инфекция и симптомите на инфекцията продължават или се влошават, трябва да се консултирате незабавно с лекар.

Други лекарства и Сиафен

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако детето Ви приема, насърчено е приемало, или е възможно да приема други лекарства, включително и такива, отпускати без рецепт.

Уведомете лекуващия си лекар, ако детето Ви приема:

- други лекарства за облекчаване на болка и висока температура, които съдържат ибупрофен, други НСПВС или аспирин (>75 mg/ден). Сиафен не трябва да се приема едновременно с други лекарствени средства от същата група (НСПВС);
- кортикоステроиди (преднизолон);
- противосъъсирващи лекарства (варфарин);
- диуретици (отводняващи средства);
- лекарства за лечение на високо кръвно налягане (антихипертензивни средства);
- лекарства за лечение на сърдечна недостатъчност – дигоксин;
- антибиотици като цiproфлоксацин и левофлоксацин;
- литий (лекарство за депресия);
- метотрексат (лекарство за лечение на рак или ревматизъм);
- антиагреганти (аспирин) и селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (лекарства за депресия);
- лекарства, потискати имунната система (циклюспорин, таクロимус);
- лекарство за лечение на СПИН (зидовудин).

Бременност, кърмене и фертилитет

Сиафен перорална суспензия е предназначен за употреба при деца, но при необходимост може да се използва и от възрастни. Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата, на което и да е лекарство.

Бременност

Уведомете Вашия лекар, ако забременеете по време на употребата на Сиафен перорална суспензия. Не приемайте това лекарство в последните 3 месеца на бременността, тъй като може да навреди на нероденото ви дете или да причини проблеми при раждането. Може да причини проблеми с бъбреците и сърцето при нероденото Ви бебе. Може да повлияе на Вашата склонност и тази на Вашето бебе към кървене и може да бъде причина, раждането за да започне по-късно или да бъде по-продължително от очакваното. Не трябва да приемате Сиафен перорална суспензия през първите 6 месеца от бременността, освен ако не е абсолютно необходимо и по препоръка на Вашия лекар. Ако имате нужда от лечение през този период или докато се опитвате да забременеете, трябва да се използва най-ниската доза за възможно най-кратко време. От 20-та седмица от бременността, Сиафен перорална суспензия може да причини проблеми с бъбреците при нероденото Ви бебе, ако се приема повече от няколко дни, което може да доведе до намалено количество на окологрудната течност, която заобикаля бебето (олигохидрамнион). Ако имате нужда от лечение за повече от няколко дни, Вашият лекар може да препоръча допълнително проследяване.

Кърмене


Ибупрофен и неговите метаболити преминават в много малки количества в кърмата. При краткосрочна употреба на Сиафен в препоръчваните дози, обикновено не се налага преустановяване на кърменето, тъй като досега не е известно да вреди на кърмачето.

Фертилитет

Сиафен перорална суспензия принадлежи към група продукти (НСПВС), за които са известни единични случаи на временно понижаване на способността за забременяване при жените, при продължителна употреба на по-високи дози. Този ефект е обратим след спиране на лекарството.

Шофиране и работа с машини

Сиафен перорална суспензия е лекарствена форма за приложение в детската възраст, но при необходимост може да се използва и от възрастни.



При краткосрочна употреба в препоръчваните дози това лекарство не повлиява или повлиява незначително способността за шофиране и работа с машини.

Сиафен перорална суспензия съдържа метил- и пропил парагидроксибензоат, които могат да причинят алергични реакции (възможно е да са от забавен тип).

Сиафен перорална суспензия съдържа сорбитол. Ако Вашето дете има непоносимост към някои захари, консултирайте се с лекар, преди да започнете лечение със Сиафен.

3. Как да използвате Сиафен

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Най-ниската ефективна доза трябва да се използва за възможно най-краткото време, необходимо за облекчаване на симптомите. Ако имате инфекция, независимо се консултирайте с лекар, ако симптомите (напр. повишена температура и болка) продължават или се влошават (вж. точка 2).

- **При болка, температура и симптоми на простуда и грип:**

Обичайната дневна доза Сиафен перорална суспензия е 20 до 30 mg/kg телесно тегло, разделена на няколко приема по следния начин:

<i>Възраст на детето</i>	<i>Количество</i>	<i>Честота за 24 часа</i>
<i>Кърмачета от 3 до 6 месеца (над 5kg)</i>	2,5 ml	3 пъти
<i>Кърмачета от 6 до 12 месеца</i>	2,5 ml	3 до 4 пъти
<i>Деца от 1 - 3 години</i>	5 ml	3 пъти
<i>Деца от 4 - 6 години</i>	7,5 ml	3 пъти
<i>Деца от 7 - 9 години</i>	10 ml	3 пъти
<i>Деца от 10 - 12 години</i>	15 ml	3 пъти

Сиафен може да се дава приблизително на всеки 6 до 8 часа (или през интервал от минимум 4 часа между отделните приеми, когато е необходимо). Да не се превишава посочената в указанията доза.


Сиафен перорална суспензия не се препоръчва при деца под 3-месечна възраст или с тегло под 5 kg, освен ако не е предписан от лекар.

- **Температура, предизвикана от имунизация:**

Обикновено е достатъчна една доза от 2,5 ml Сиафен. Ако е необходимо, може да се даде още една доза 6 часа по-късно, но не повече от 2 дози по 2,5 ml за 24 часа. Ако температурата не се понижава, не давайте трета доза. Консултирайте се задължително с лекуващия лекар.

Продължителност на лечението: Сиафен перорална суспензия се препоръчва само за краткосрочна употреба – не повече от 3 дни.

- Кърмачета на възраст 3-5 месеца (с тегло над 5 kg): трябва да се потърси лекарска консултация, ако симптомите се влошават или не се повлияват в рамките на 24 часа, въпреки употребата на Сиафен перорална суспензия (три дози).



- Кърмачета и деца на възраст над 6 месеца: в случай, че е необходимо този лекарствен продукт да се приема повече от 3 дни или ако симптомите на детето се влошат, трябва да се потърси съвет от лекар.

Препоръчва се да се използва най-ниската ефективна доза за възможно най-кратък период от време.

Начин на приложение: перорално. Препоръчва се пациентите с чувствителен stomах да приемат Сиафен перорална сусペンзия по време на хранене.

Да се разклаща добре преди употреба.

Ако детето Ви е приело Сиафен повече от необходимата доза или ако лекарството случайно е било прието от деца, веднага се свържете с лекар, или най-близката болница, за да получите мнение за риска и съвет за действие, което трябва да се предприеме.

Симптомите могат да включват гадене, повръщане (примесено с кръв), главоболие, звънене в ушите, обърканост и бързи и неволеви движения на очите. При високи дози е съобщавано за сънливост, болка в гърдите, сърцебиене, загуба на съзнание, гърчове (главно при деца), слабост и замаяност, кръв в урината, усещане за студ и проблеми с дишането.

Ако сте пропуснали прием на Сиафен

Не давайте или не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако забравите да приемете или дадете една доза, приемете, или дайте тази доза веднага щом установите пропуска, след което продължете да приемате, или давате следващата доза според интервалите за дозиране посочени по-горе.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство също може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите реакции, предизвикани от Сиафен са много редки и са характерни за голяма част от лекарствата от групата на НСПВС.

Прекратете лечението и веднага се обърнете към лекар, ако се появят някои от следните симптоми:

- подуване на лицето, езика, устните или гърлото със затруднено прегълъщане и недостиг на въздух. Потърсете незабавно лекарска помощ. Това може да бъдат признания на редки, но сериозни алергични реакции.
- следи от кръв в изпражненията, оцветени в тъмно изпражнения, повръщане със следи от кръв или тъмни, с цвят на кафе частици. Възможни са влошаване на съществуващ колит или болест на Крон.
- появя на обриви по цялото тяло, лющене или образуване на мехури по кожата, устата, очите и половите органи (синдром на Стивънс-Джонсън).
- тежка кожна реакция, известна като DRESS синдром. Симптомите на DRESS включват: кожен обрив, повишена температура, подуване на лимфните възли и повишаване на еозинофилите (вид бели кръвни клетки).

Нечести (проявяват се при по-малко от 1 на 100 потребители):

Консултирайте се с лекар, ако се появят:

- обриви и сърбеж по кожата;
- главоболие;
- нарушен храносмилане, киселини в stomаха, болки или други stomачни проблеми.

Редки (проявяват се при по-малко от 1 на 1 000 потребители):

Консултирайте се с лекар, ако продължат повече от няколко дни или станат обстойконтинентни:

- диария, подуване на корема, запек или повръщане.



Много редки (проявяват се при по-малко от 1 на всеки 10 000 потребители):

Прекратете лечението и се консултирайте с лекар, ако се появят някои от следните симптоми:

- повищена температура, болки в гърлото, разяззвания в устата, грипоподобни симптоми, тежко изтощение, необичайна склонност към кървене и лесно получаване на синими (отклонения в кръвните показатели);
- схващане на врата, главоболие, гадене, повръщане, повищена температура и дезориентация (симптоми на асептичен менингит);
- сърдебиене, поја на гръден болка, нарушение на сърдечния ритъм. Лекарства като Сиафен (ибупрофен), могат да бъдат свързани с леко повишен рисък от сърден инцидент (миокарден инфаркт) или инсулт, които са малко вероятни при употребата му в детски дози.

С неизвестна честота:

- червен, люспест, обхващащ голяма повърхност обрив с издутини под кожата и мехури, локализиран главно по кожните гънки, тялото и горните крайници, придружен с висока температура при започването на лечение (остра генерализирана екзантематозна пустулоза). Спрете употребата на Сиафен, ако развиете тези симптоми и незабавно потърсете медицинска помощ. Вижте също точка 2;
- кожата става чувствителна към светлина.

При пациентите в старческа възраст, които използват това лекарство има повишен рисък от поја на нежелани реакции.

Нежеланите лекарствени реакции могат да бъдат сведени до минимум, като за овладяване на симптомите се употребява възможно най-ниската ефективна доза, за възможно най-кратък срок от време.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: +35 928903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Сиафен

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, при температура под 25°C.

Да не се замразява.

Използвайте лекарството до 1 месец след отваряне на бутилката.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлят лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Сиафен

- Активното вещество е: ибупрофен 100 mg в 5 ml суспензия.
- Другите съставки са: сорбитол (Е 420), натриев нищестен гликолат (тип A), ксантинова гума, полисорбат 80, глицерол, лимонена киселинаmonoхидрат, натриев цитрат дихидрат,



пропиленгликол, метил парагидроксибензоат (Е 218), пропил парагидроксибензоат (Е 216), захарин натрий, течна есенция "Тути фрути", пречистена вода.

Как изглежда Сиафен и какво съдържа опаковката

Перорална суспензия с бял, до почти бял цвят, с мирис на плодове.

По 120 ml в тъмни стъклени бутилки с алуминиева или полиетиленова капачка, или тъмни ПЕТ бутилки с полиетиленова капачка; по 1 бутилка в картонена кутия, заедно с мерителна чашка и листовка.

Притежател на разрешението за употреба и производител

СОФАРМА АД

ул. Илиенско шосе 16, 1220 София, България

Дата на последно преразглеждане на листовката: октомври 2022.

