

ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Симбикорт Турбухалер 160 микрограма/4,5 микрограма/инхалация, прах за инхалация Symbicort Turbuhaler 160 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, inhalation powder

будезонид/формотеролов фумарат дихидрат (budesonide/formoterol fumarate dihydrate)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Симбикорт Турбухалер и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Симбикорт Турбухалер
3. Как да използвате Симбикорт Турбухалер
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Симбикорт Турбухалер
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВЕТА	
Дистр. Турбухалер - лечение 2	
Към Рег. №	20010988
Разрешение №	-64036 30-11-2023
ВВ/МА/МР	/
Обсрбение №	/

1. Какво представлява Симбикорт Турбухалер и за какво се използва

Симбикорт Турбухалер е инхалатор, който се използва за лечение на астма при възрастни и юноши на възраст 12 - 17 години. Използва се също и за лечение на симптоми на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), при възрастни на и над 18 години. Той съдържа две различни лекарства – будезонид и формотеролов фумарат дихидрат.

- Будезонид принадлежи към група лекарства, наречени „кортикостероиди“. Той действа като намалява отока и възпалението в белия Ви дроб и предотвратява развитието им.
- Формотеролов фумарат дихидрат принадлежи към група лекарства, наречени „дългодействащи бета₂-адренорецепторни миметици“ или „броходилатори“. Той действа като отпуска мускулите на въздухоносните пътища. Това улеснява дишането.

Астма

За лечение на астма Симбикорт Турбухалер може да се предписва по два различни начина.

а) На някои хора се предписват два инхалатора за астма: Симбикорт Турбухалер и още един инхалатор за облекчаване на симптомите.

- Те използват Симбикорт Турбухалер всеки ден. Той помага да се предотврати появата на симптоми на астма.
- Инхалаторът за облекчаване на симптомите се използва при поява на симптоми на астма, за да се облекчи дишането.

б) На някои хора Симбикорт Турбухалер се предписва като единствен инхалатор за астма.

- Те използват Симбикорт Турбухалер всеки ден. Той помага да се предотврати появата на симптоми на астма.
- Те също използват Симбикорт Турбухалер, когато са им необходими допълнителни дози за облекчаване симптомите на астма и за да се улесни дишането и също така, ако е съществено, лекаря, да се предотврати появата на симптоми на астма (например, при физически усилия или излагане на алергени). За тази цел те не се нуждаят от допълнителен инхалатор.



Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

Симбикорт Турбухалер може да се използва и за лечение на симптоми на ХОББ при възрастни. ХОББ е хронично заболяване на дихателните пътища в белите дробове, което често се дължи на тютюнопушене.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Симбикорт Турбухалер

Не използвайте Симбикорт Турбухалер:

- ако сте алергични към будезонид, формотерол или към другата съставка на това лекарство (изброена в точка б), която е лактоза (съдържа малки количества млечен протеин).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Симбикорт Турбухалер, ако:

- Вие имате диабет;
- Вие имате белодробна инфекция;
- Вие имате високо артериално налягане или някога сте имали проблем със сърцето (включително неравномерен сърдечен ритъм, ускорен пулс, стесняване на артериите или сърдечна недостатъчност);
- Вие имате проблеми със щитовидната жлеза или с надбъбречните жлези;
- Вие имате ниско ниво на калий в кръвта;
- Вие имате тежко чернодробно заболяване.

Свържете се с Вашия лекар, ако имате замъглено зрение или други зрителни смущения.

Други лекарства и Симбикорт Турбухалер

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.

В частност, уведомете лекаря или фармацевта си, ако използвате някое от следните лекарства:

- Бета-блокери (като атенолол и пропранолол, използвани за лечение на високо артериално налягане), включително и под формата на капки за очи (като тимолол, използван за лечение на глаукома).
- Лекарства за лечение на ускорен или неравномерен сърдечен ритъм (като хинидин).
- Лекарства като дигоксин, използвани често за лечение на сърдечна недостатъчност.
- Диуретици, наричани още „отводняващи“ (като фуросемид). Те се използват за лечение на високото артериално налягане.
- Кортикостероиди, които се приемат през устата (като преднизолон).
- Ксантинови медикаменти (като теофилин или аминофилин). Те се използват често за лечение на астма.
- Други бронходилататори (като салбутамол).
- Трициклични антидепресанти (като амитриптилин) и антидепресанта нефазодон.
- Фенотиазинови медикаменти (като хлорпромазин и прохлорперазин).
- Лекарства, наречени „НIV-протеазни инхибитори“ (като ритонавир), използвани за лечение на НIV инфекцията.
- Лекарства за лечение на инфекции (като кетоназол, итраконазол, вориконазол, посаконазол, кларитромицин и телитромицин).
- Лекарства за лечение на болестта на Паркинсон (като леводопа).
- Лекарства за лечение на заболявания на щитовидната жлеза (като левотироксин).

Ако някое от изброените важи за Вас или не сте сигурни, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт, преди да започнете да използвате Симбикорт Турбухалер.

Също така уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако Ви предстои операция или стоматологична манипулация под обща упойка.



Бременност, кърмене и фертилитет

- Ако сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар, преди да започнете да използвате Симбикорт Турбухалер – не използвайте Симбикорт Турбухалер, освен ако Вашият лекар не Ви каже да го използвате.
- Ако забременеете, докато използвате Симбикорт Турбухалер, не спирайте да го използвате, а незабавно се свържете с Вашия лекар.
- Ако кърмите, говорете с Вашия лекар, преди да започнете да използвате Симбикорт Турбухалер.

Шофиране и работа с машини

Симбикорт Турбухалер не засяга или засяга в пренебрежима степен способността Ви да шофирате или да работите с инструменти и машини.

Симбикорт Турбухалер съдържа лактоза

Симбикорт Турбухалер съдържа лактоза, която представлява вид захар. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, обърнете се към него, преди да започнете да използвате това лекарство. Количеството лактоза, съдържащо се в това лекарство, обикновено не предизвиква проблеми при хора с непоносимост към лактоза.

Помощното вещество лактоза съдържа малко количество млечни протеини, които могат да причинят развитие на алергични реакции.

3. Как да използвате Симбикорт Турбухалер

- Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Важно е да използвате Симбикорт Турбухалер всеки ден, дори и да нямате симптоми на астма или ХОББ.
- Ако използвате Симбикорт Турбухалер за лечение на астма, Вашият лекар ще иска да проверява редовно какви симптоми имате.

Ако приемате кортикостероидни таблетки за астмата си или за ХОББ, Вашият лекар може да намали броя на таблетките, които взимате, след като започнете да използвате Симбикорт Турбухалер. Ако приемате кортикостероидни таблетки от дълго време, Вашият лекар може да иска да Ви прави изследвания на кръвта от време на време. Когато намалявате пероралните кортикостероидни таблетки, може да почувствате общо неразположение, въпреки че симптомите от гърдния Ви кош може да се подобряват. Може да изпитате симптоми като запушен или течащ нос, слабост или ставна и мускулна болка, и обрив (екзема). Ако някой от тези симптоми Ви притеснява, или ако се появят симптоми като главоболие, умора, гадене или повръщане, моля свържете се с Вашия лекар незабавно. Може да се наложи да приемете друго лекарство, ако развиете алергични или артритни симптоми. Трябва да говорите с лекаря си, ако се притеснявате дали трябва да продължите да използвате Симбикорт Турбухалер.

Вашият лекар може да прецени, че е нужно добавяне на кортикостероидни таблетки към обичайното Ви лечение по време на периоди на стрес (например, когато имате инфекция в гърдния кош или преди операция).

Важна информация за симптомите на астма или ХОББ

Ако почувствате, че докато използвате Симбикорт Турбухалер дишането Ви става затруднено или се появяват хрипове, трябва да продължите да го използвате, но веднага, щом това е възможно, трябва да посетите Вашия лекар, защото може да се нуждаете от допълнително лечение.

Незабавно се свържете с лекаря си, ако:

- Дишането Ви става по-трудно или често се събуждате нощем с пристъп на астма.
- Сутрин имате стягане на гърдите или стягането на гърдите продължава по-дълго от обичайно.



Тези белези могат да означават, че Вашата астма или ХОББ не е под адекватен контрол и е възможно незабавно да се нуждаете от различно или допълнително лечение.

Астма

Симбикорт Турбухалер може да се предписва по два различни начина за лечение на астма. Дозата Симбикорт Турбухалер, която трябва да приемате, както и честотата на приложение, зависят от това как Ви е предписан.

- а) Ако Ви е предписан Симбикорт Турбухалер и още един инхалатор за облекчаване на симптомите, прочетете подточката, озаглавена „а) Как да използвате Симбикорт Турбухалер плюс допълнителен инхалатор за облекчаване на симптомите.”
- б) Ако Симбикорт Турбухалер Ви е предписан като единствен инхалатор, прочетете подточката, озаглавена „б) Как да използвате Симбикорт Турбухалер като единствен инхалатор за лечение на астма”.

а) Как да използвате Симбикорт Турбухалер плюс допълнителен инхалатор за облекчаване на симптомите

Използвайте своя Симбикорт Турбухалер всеки ден. Това спомага да се предотврати развитието на симптоми на астма.

Възрастни (на и над 18 години)

- Обичайната доза е 1 или 2 инхалации два пъти дневно.
- Вашият лекар може да повиши дозата Ви до 4 инхалации два пъти дневно.
- Ако симптомите Ви са добре контролирани, Вашият лекар може да Ви предпише да приемате лекарството един път дневно.

Юноши (от 12 до 17 години)

- Обичайната доза е 1 или 2 инхалации два пъти дневно.
- Ако симптомите Ви са добре контролирани, Вашият лекар може да Ви предпише да приемате лекарството един път дневно.

За лечение на деца на възраст от 6 до 11 години е наличен Симбикорт Турбухалер в по-ниска доза.

Употребата на Симбикорт Турбухалер при деца на възраст под 6 години не се препоръчва.

Вашият лекар (или медицинска сестра) ще Ви помогне да контролирате астмата си. Те ще подберат най-ниската доза на това лекарство, достатъчна за контролиране на симптомите Ви. Все пак, не променяйте или не спирайте дозата, без преди това да сте се посъветвали с лекаря си (или медицинската си сестра).

Използвайте отделен инхалатор за облекчаване на симптомите, за да овладеете симптомите на астма, когато се появят такива. Винаги носете инхалатора за облекчаване на симптомите – в случай че имате нужда от него. Не използвайте Симбикорт Турбухалер за овладяване на симптомите на астма – използвайте инхалатора за облекчаване на симптомите.

б) Как да използвате Симбикорт Турбухалер като единствен инхалатор за лечение на астма
Използвайте Симбикорт Турбухалер по този начин, единствено ако Вашият лекар Ви е казал да го използвате така и сте на възраст на и над 12 години.

Използвайте своя Симбикорт Турбухалер всеки ден. Това спомага да се предотврати развитието на симптоми на астма. Може да си правите:

- 1 инхалация сутрин и 1 инхалация вечер;
или
- 2 инхалации сутрин;
или
- 2 инхалации вечер.



Вашият лекар може да повиши дозата Ви до 2 инхалации 2 пъти дневно.

Също така използвайте Симбикорт Турбухалер като инхалатор за облекчаване на симптомите, за да овладеете симптомите на астма, ако се появят такива и за да предотвратите появата на симптоми на астма (например, при физически усилия или излагане на алергени).

- Ако се появят симптоми на астма, направете си 1 инхалация и изчакайте няколко минути.
- Ако не се почувствате по-добре, направете си още една инхалация.
- Не си правете повече от 6 инхалации наведнъж.

Винаги носете своя Симбикорт Турбухалер със себе си, за да можете да го използвате, ако се нуждаете от него.

Обикновено не се налага използване на обща дневна доза на повече от 8 инхалации. Все пак, за ограничен период от време, Вашият лекар може да Ви позволи да си правите до 12 инхалации дневно.

Ако редовно Ви се налага да си правите 8 или повече инхалации дневно, запишете си час при Вашия лекар или медицинска сестра – може да се наложи да променят лечението Ви.

Не си правете повече от общо 12 инхалации за 24 часа.

Ако се появят симптоми на астма, докато се натоварвате физически, използвайте Симбикорт Турбухалер така, както е описано по-горе. Важно е да се посъветвате с Вашия лекар относно използването на Симбикорт Турбухалер, с цел предотвратяване появата на симптоми на астма; колко често имате физически натоварвания или сте изложени на алергени може да повлияе на лечението, което Ви е предписано.

Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

- За употреба само при възрастни (на възраст на и над 18 години).
- Обичайната дозировка е 2 инхалации 2 пъти дневно.

Вашият лекар може да Ви предпише и други бронходилататори, например антихолинергични лекарства (като тиотропиев или ипратропиев бромид) при ХОББ.

Как да подготвите новия си Симбикорт Турбухалер

Преди да започнете да използвате **новия** си Симбикорт Турбухалер **за първи път**, трябва да го подготвите за употреба по следния начин:

- Отвийте капачката и я повдигнете. Може да чуете шум.
- Задръжте своя Турбухалер прав, с червения диск отдолу.
- Завъртете докрай червения диск в едната посока. След това го завъртете докрай в другата посока (няма значение в коя посока ще го завъртите първоначално). Трябва да чуете щракване. Няма значение дали щракването ще се появи на първото или второто завъртане.
- Направете същото отново, завъртайки червения диск в двете посоки.
- Вашият Турбухалер вече е зареден и готов за употреба.

Как да си направите инхалация

Следвайте дадените по-долу инструкции при всяка инхалация, която се налага да си правите.

1. Отвийте капачката и я повдигнете. Може да чуете шум.
2. **Задръжте своя Турбухалер прав**, с червения диск отдолу.



3. Когато зареждате своя Турбухалер, не дръжте мундшука. За да заредите своя Турбухалер с една доза, завъртете докрай червения диск в едната посока.



След това го завъртете докрай в другата посока (няма значение в коя посока ще го завъртите първоначално). Трябва да чуete щракване. Няма значение дали щракването ще се появи на първото или второто завъртане. Вашият Турбухалер вече е зареден и готов за употреба. Зареждайте своя Турбухалер само тогава, когато трябва да го използвате.

4. Задръжте своя Турбухалер далече от устата си. Издишайте спокойно (дотогава, че да не Ви причинява дискомфорт). Не издишвайте в своя Турбухалер.

5. Внимателно поставете мундшука между зъбите си. Затворете устни. Вдишайте максимално дълбоко и силно през устата. Не дъвчете или хапете мундшука.



6. **Извадете своя Турбухалер от устата си. След това издишайте спокойно.** Количеството лекарство, което сте инхалирали, е много малко. Това означава, че след инхалация може да не усещате вкуса му. Обаче, ако сте следвали инструкциите, можете да сте сигурни, че сте инхалирали дозата си и лекарството вече е в белите Ви дробове.

7. Ако трябва да си направите втора инхалация, повторете стъпки от 2 до 6.

8. След употреба сложете обратно и затегнете капачката.



9. След ежедневните си сутрешни и/или вечерни дози изплаквайте устата си с вода, която изплювайте.

Не се опитвайте да махнете или усучете мундшука. Той е свързан с Вашия Турбухалер и не трябва да се отстранява. Не използвайте своя Турбухалер, ако е повреден или мундшукът е отделен от него.

Както е валидно за всички инхалатори, болногледачите трябва да се уверят, че децата, на които е предписан Симбикорт Турбухалер, използват правилна техника на инхалиране, както е описано по-горе.

Как да почиствате своя Турбухалер

Веднъж седмично избърсвайте външната повърхност на мундшука със суха кърпа. Не използвайте вода или други течности.

Кога да започнете да използвате нов Турбухалер

- Индикаторът за дозите Ви показва колко дози (инхалации) са останали във Вашия Турбухалер, като при пълен инхалатор броенето започва от 30, 60, или от 120.



- Скалата на индикатора е през 10 дози (за инхалатори от 60 и 120 дози) и в интервал от 15 дози (за инхалатор от 30 дози). Следователно индикаторът не показва всяка доза.
- Когато видите за първи път червена черта на ръба на индикатора, остават приблизително 20 дози. За последните 10 дози индикаторът е на червен фон. Когато цифрата „0“ на червен фон достигне до средата на прозореца, трябва да започнете да използвате нов Турбухалер.

Важно:

- Дискът ще продължи да се върти и „щрака“, дори и след като Вашият Турбухалер се изпразни.



- Звукът, който чувате при разклащане на своя Турбухалер, се дължи на абсорбатора на влага, а не на лекарството. Поради това звукът не може да Ви ориентира колко от лекарството е останало във Вашия Турбухалер.
- Ако по грешка преди инхалацията си заредите своя Турбухалер повече от веднъж, все пак ще си инхалирате една доза. Индикаторът обаче ще отчете всички заредени дози.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Симбикорт Турбухалер

Важно е да приемате Вашата доза както е препоръчал Вашият лекар или фармацевт. Вие не трябва да превишавате Вашата предписана доза без да потърсите медицински съвет.

Най-честите симптоми при прием на по-висока от необходимата доза Симбикорт Турбухалер са треперене, главоболие и ускорена сърдечна дейност.

Ако сте пропуснали да използвате Симбикорт Турбухалер

- Ако сте забравили да приемете една доза, приемете я веднага, щом си спомните. Ако обаче приближава времето за прием на следващата доза, пропуснете забравената.
- **Не** вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако развиете някой от следните симптоми, спрете да използвате Симбикорт Турбухалер и незабавно се обърнете към Вашия лекар:

- Отичане на лицето, особено на устата (на езика и/или гърлото и/или затруднено преглъщане) или поява на уртикариален обрив наред със затруднено дишане (ангиоедем) и/или внезапно примаяване. Това може да означава, че сте развили алергична реакция. Такава се развива рядко – при по-малко от 1 на всеки 1 000 души.
- Внезапно, остро развитие на хрипове или задух непосредствено след използването на инхалатора. Ако се развие който и да е от тези симптоми, спрете да използвате инхалатора Симбикорт Турбухалер незабавно и направете инхалация с инхалатора си „за облекчаване на симптоми”. Незабавно се свържете с лекаря си, защото може да се наложи промяна на лечението Ви. Това се случва много рядко – при по-малко от 1 на всеки 10 000 души.

Други възможни нежелани реакции:

Чести (може да се развият при по-малко от 1 на всеки 10 души)

- палпитации (сърцебиене), треперене. Ако тези нежелани реакции се проявят, те обикновено са леки и най-често при продължаване на лечението със Симбикорт Турбухалер изчезват.
- кандидоза (гъбична инфекция) на устата. Вероятността за развитието ѝ е по-малка, ако, след като използвате своя Симбикорт Турбухалер, редовно изплаквате устата си.
- леки болки в гърлото, кашлица и дрезгав глас;
- главоболие;
- пневмония (инфекция на белите дробове) при пациенти с ХОББ.

Уведомете Вашия лекар, ако получите някоя от следните нежелани реакции, докато приемате будезонид, тъй като те могат да бъдат симптоми на белодробна инфекция:

- висока температура или втрисане;
- повишено образуване на храчки, промяна в цвета на храчките;



- засилване на кашлицата или засилване на проблемите с дишането.

Нечести (може да се развият при по-малко от 1 на всеки 100 души)

- неспокойствие, нервност или безпокойство;
- нарушение на съня;
- замаяност;
- гадене;
- ускорена сърдечна дейност;
- кожни хематоми;
- мускулни крампи;
- замъглено зрение.

Редки (може да се развият при по-малко от 1 на всеки 1 000 души)

- обриви, сърбеж;
- бронхоспазм (съкращаване на мускулите на въздухоносните пътища, което води до поява на хрипове). Ако веднага след приложение на Симбикорт Турбухалер развиете хрипове, спрете да го използвате и незабавно се свържете с лекаря си.
- понижаване на нивото на калий в серума Ви;
- неравномерен сърдечен ритъм.

Много редки (може да се развият при по-малко от 1 на всеки 10 000 души)

- депресия;
- промени в поведението, особено при деца;
- болка или стягане в гърдите (стенокардия);
- повишаване на кръвната захар;
- промяна на вкуса, например неприятен вкус в устата;
- промяна на артериалното налягане.

Инхалаторните кортикостероиди могат да повлияят нормалната продукция на стероидни хормони в организма Ви, особено ако ги приемате във висока доза за продължителен период от време. Тези ефекти включват:

- Промяна на костната плътност (отслабване на костите).
- Катаракта (замъгляване на лещата на окото).
- Глаукома (повишено вътреочно налягане).
- Забавяне на растежа при деца и юноши.
- Повлияване на функцията на надбъбречните жлези (малки жлези в непосредствена близост до бъбреците).

Вероятността за развитие на тези ефекти е много по-малка при прием на инхалаторни кортикостероиди, отколкото при прием на кортикостероиди под формата на таблетки.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно (вижте подробна информация по-долу). Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

България

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Тел.: +359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg



Symbicort Turbuhaler 160 µg/4.5 µg/inhalation; **Ирландия:** Symbicort Turbohaler 200 µg/6 µg/inhalation; **Италия:** Symbicort 160 µg/4.5 µg/inhalation; **Латвия:** Symbicort Turbuhaler 160 µg/4.5 µg/inhalation; **Литва:** Symbicort Turbuhaler 160 µg/4.5 µg/inhalation; **Люксембург:** Symbicort Turbohaler 160 µg/4.5 µg/inhalation; **Малта:** Symbicort Turbohaler 200 µg/6 µg/inhalation; **Холандия:** Symbicort Turbuhaler 200 µg/6 µg/inhalation; **Норвегия:** Symbicort Turbuhaler 160 µg/4.5 µg/inhalation; **Полша:** Symbicort Turbuhaler 160 µg/4.5 µg/inhalation; **Португалия:** Symbicort Turbohaler 160 µg/4.5 µg/inhalation; **Румъния:** Symbicort Turbuhaler 160 µg/4.5 µg/inhalation; **Словакия:** Symbicort Turbuhaler 200 µg/6 µg/inhalation; **Словения:** Symbicort Turbuhaler 160 µg/4.5 µg/inhalation; **Испания:** Symbicort Turbuhaler 160 µg/4.5 µg/inhalation; **Швеция:** Symbicort Turbuhaler 160 µg/4.5 µg/inhalation; **Обединено Кралство:** Symbicort Turbohaler 200 µg/6 µg/inhalation.

Дата на последно преразглеждане на листовката:

<p><i>Подробна и актуална информация за този продукт е достъпна при сканиране със смарт телефон на баркода, поместен в Листовката и върху картонената опаковка. Същата информация е достъпна и на следния URL адрес: www.turbuhaler.bg.</i></p>	<p><i>място за QR код</i></p>
--	-------------------------------

