

Листовка: информация за потребителя

СИМПАТИЛ 75 mg/75 mg/20 mg филмирани таблетки
магнезий, глог, калифорнийски мак

SYMPATHYL 75 mg/75 mg/20 mg film-coated tablets
magnesium, hawthorn, california poppy

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 30 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява СИМПАТИЛ филмирани таблетки и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете СИМПАТИЛ филмирани таблетки
3. Как да приемате СИМПАТИЛ филмирани таблетки
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате СИМПАТИЛ филмирани таблетки
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява СИМПАТИЛ филмирани таблетки и за какво се използва

Това лекарство съдържа магнезий, глог и калифорнийски мак.

Комбинация от няколко от следните симптоми може да се дължи на дефицит на магнезий:

- нервност, раздразнителност, лека тревожност, преходна умора, леки нарушения на съня,
- прояви на тревожност като храносмилателни спазми или палпитации (при здраво сърце),
- мускулни крампи, изтръпване.

Приемът на магнезий може да подобри тези симптоми.

Ако симптомите не се подобрят след 30 дни лечение, преустановете приемът на СИМПАТИЛ.

Ако след 30 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете СИМПАТИЛ филмирани таблетки**Не приемайте СИМПАТИЛ филмирани таблетки:**

- ако сте алергични към активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- ако имате тежко бъбречно заболяване (тежко бъбречно увреждане).



Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете СИМПАТИЛ филмирани таблетки. Това лекарство съдържа азобагрило (азорубин или E122) и може да предизвика алергични реакции.

Деца и юноши

Поради липсата на достатъчно данни, това лекарство не трябва да се използва при деца и юноши под 18-годишна възраст.

Други лекарства и СИМПАТИЛ филмирани таблетки

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Освен ако Вашият лекар не Ви е предписал друго, не трябва да използвате СИМПАТИЛ филмирани таблетки, с някои лекарства, използвани за лечение на сърдечни аритмии (хинидини).

Трябва да приемате СИМПАТИЛ поне 1 час преди или след прием на роксадустант.

Трябва да изчакате поне 2 часа между приема на СИМПАТИЛ и лекарства за ХИВ (биктегравир, инхибитори на интегразата).

СИМПАТИЛ филмирани таблетки с храна и напитки и алкохол

Неприложимо.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Поради липсата на достатъчно данни, употребата на това лекарство не се препоръчва по време на бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини

СИМПАТИЛ не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

СИМПАТИЛ филмирани таблетки, съдържа азорубин (E122)

3. Как да приемате СИМПАТИЛ филмираните таблетки

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дозировка

Препоръчителната доза при възрастни е 4 таблетки на ден, като 2 таблетки се приемат сутрин и 2 таблетки вечер.

Начин на приложение

Перорално приложение.

Поглъщайте таблетките с чаша вода.

Таблетките трябва да се приемат преди хранене.

Продължителност на лечението



Ако няма подобрение на симптомите след 30 дни лечение, трябва да потърсите лекарска помощ.

Употреба при деца и юноши

Поради липсата на достатъчно данни, това лекарство не трябва да се използва при деца и юноши под 18-годишна възраст.

Ако сте приели повече от необходимата доза СИМПАТИЛ филмирани таблетки
Незабавно се свържете с Вашия лекар. В случай на предозиране може да изпитате намаляване на обема на урината Ви (анурия).

Ако сте пропуснали да приемете СИМПАТИЛ филмирани таблетки
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Ако сте спрели приема на СИМПАТИЛ филмирани таблетки
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

С неизвестна честота:

- Реакции на свръхчувствителност/алергични реакции, включително подуване на клепачите, сърцебиене, сърбеж, подуване на корема, стомашна болка, мускулна болка, треска;
- Храносмилателни нарушения като диария, коремна болка.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно на:

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Тел.: +359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате СИМПАТИЛ филмирани таблетки

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да не се съхранява над 25 °С.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.



6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа СИМПАТИЛ филмирани таблетки

- Активните вещества са:

Магнезий.....75 mg
като тежък магнезиев оксид (heavy magnesium oxide).....124,35 mg

Глог (*Crataegus monogyna* Jacq. и/или *C. laevigata* DC.) (сух екстракт от лист и цвят).....75 mg
Екстракционен разтворител: етанол 60% v/v
DER: 3,5-4,5:1

Калифорнийски мак (*Eschscholtzia californica* Cham.) (сух екстракт от стрък).....20 mg
Екстракционен разтворител: етанол 60% v/v
DER: 3,5-5,6:1

За една филмирана таблетка.

- Другите съставки са:

Микрокристална целулоза, натриев нишестен гликолат (тип А), стеаринова киселина, Opaglos® NA 7150*, Opadry® OY-S-30901**, талк.

* Състав на Opaglos® NA-7150: шеллак, повидон, ацетилирани моноглицериди.

** Състав на Opadry® OY-S-30901: хипромелоза, титанов диоксид, макрогол 6000, индигокармин алуминиев лак, азорубин алуминиев лак (E122), жълт железен оксид.

Помощни вещества на растителните препарати: силициев диоксид, малтодекстрин, безводен колоиден силициев диоксид.

Как изглежда СИМПАТИЛ филмирани таблетки, и какво съдържа опаковката

Това лекарство се предлага под формата на филмирани таблетки.
Всяка кутия съдържа 40 филмирани таблетки в PVC/PVDC/Al блистери

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба
LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL
22 AVENUE ARISTIDE BRIAND
94110 ARCUEIL
Франция

Производител
INNOTHERA CHOUZY
RUE RENE CHANTEREAU, CHOUZY-SUR-CISSE
41150 VALLOIRE-SUR-CISSE
Франция

Дата на последно преразглеждане на листовката 03/2026

