

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ТАНТУМ 5 % гел

TANTUM 5 % gel

Бензидаминов хидрохлорид (Benzydamine Hydrochloride)

Моля прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да използвате това лекарство.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.

- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява ТАНТУМ гел и за какво се използва
2. Преди да използвате ТАНТУМ гел
3. Как да използвате ТАНТУМ гел
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ТАНТУМ гел
6. Допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Reg. №	9700588
Разрешение №	11-27428/27-10-2014
Одобрение №	/

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТАНТУМ гел И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

ТАНТУМ гел съдържа активното вещество бензидаминов хидрохлорид. Бензидаминът под формата на неомазняващ гел притежава изразени противовъзпалителни и болкоуспокояващи свойства. Бързото абсорбиране и локалното въздействие върху възпалената тъкан води до бързо отслабване на оплакванията. При локално приложение ТАНТУМ гел има добра поносимост.

ТАНТУМ гел се прилага при:

- периферна венозна недостатъчност и нейните клинични прояви (оток, тежест на долните крайници, нощни спазми, болка и изтръпване в резултат на венозния застой);
- допълнително лечение при повърхностен флебит (възпаление на вените) и тромбофлебит (образуване на кръвен съсирек – тромб);
- усложнения от склеротерапия (вид лечение при някои венозни нарушения) или сафенектомия (хирургично отстраняване на така наречената вена сафена, намираща се в долните крайници);
- нарушения на кръвообращението на долните крайници по време на венозна недостатъчност.



2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТАНТУМ гел

Не използвайте ТАНТУМ гел

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество бензидамин или към някоя от останалите съставки на ТАНТУМ гел.

ТАНТУМ гел не трябва да се нанася върху лигавици или наранена кожа.

Обърнете специално внимание при употребата на ТАНТУМ гел

Да се избягва приложението на Тантум гел върху упорити кожни наранявания.

При продължителна употреба може да се появи кожно дразнене, проявяващо се най-често като оток, зачервяване и сърбеж. При тези случаи да се прекъсне прилагането на ТАНТУМ гел и да се потърси лекар.

При лечение с ТАНТУМ гел избягвайте пряката слънчева светлина. Ако оплакванията продължат или ако не се появи очакваният ефект от използването на ТАНТУМ гел, потърсете лекарска консултация при първа възможност.

Прием/употреба на други лекарства

Не са познати взаимодействия с други лекарства.

Бременност и кърмене

При употреба по предназначение е възможно използването на това лекарство при бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини

ТАНТУМ гел не влияе върху концентрацията при шофиране и работа с машини

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТАНТУМ гел

ТАНТУМ гел се нанася върху засегнатия кожен участък и леко са втрива до пълно абсорбиране.

Ако не е предписано нещо друго, ТАНТУМ гел се нанася 2-3 пъти дневно.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както при повечето лекарства за локално приложение и тук не е изключена възможността за поява на алергични реакции (зачервяване, оток, сърбеж).

При появата на тези или други, неотбелязани тук нежелани реакции, моля обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

Докладване на нежелани лекарствени реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване: Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, Тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ТАНТУМ гел

Да се съхранява при температура под 25 °C.



Не използвайте ТАНТУМ гел след срока на годност, отбелязан на опаковката.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа ТАНТУМ 5 % гел

1 g гел съдържа:

Активно вещество: Бензидаминов хидрохлорид 50 mg,

Другите съставки са: изопропилов алкохол, глицерол, хидроксиетилцелулоза, парфюмно масло, вода.

Как изглежда ТАНТУМ гел и какво съдържа опаковката

ТАНТУМ гел се предлага в туба, съдържаща 50 g гел и поставена в картонена кутия с приложена листовка за пациента.

Притежател на разрешението за употреба

Анджелини Фарма България ЕООД

Бул. Асен Йорданов 10

София 1592, България

Тел.: + 359 2 975 13 95

Факс: + 359 2 971 57 45

Производители

A.C.R.A.F. S.p.A., Via Vecchia del Pinocchio 22, 60131 Ancona, Италия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с притежателя на разрешението за употреба

Дата на последно одобрение на листовката

