

## ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

**Telfast® 180 mg film-coated tablets****Телфаст 180 mg филмирани таблетки**фексофенадинов хидрохлорид (*fexofenadine hydrochloride*)

**Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.**

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

**В тази листовка:**

- 1.Какво представлява Телфаст и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Телфаст
- 3.Как да приемате Телфаст
- 4.Възможни нежелани реакции
- 5.Как да съхранявате Телфаст
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

**1.Какво представлява Телфаст и за какво се използва**

Фексофенадинов хидрохлорид, активното вещество на Телфаст, е продукт от групата лекарства, наречени антихистамини.

**За какво се използва Телфаст**

Телфаст 180 mg филмирани таблетки се използва при възрастни и подрастващи на възраст 12 и повече години за облекчаване на симптомите които се появяват при дълговременни кожни алергични реакции (хронична идиопатична уртикария) като сърбеж, оток и обриви.

**2.Какво трябва да знаете, преди да приемете Телфаст****Не приемайте Телфаст и информирайте Вашия лекар ако:**

- сте алергични (свръхчувствителни) към фексофенадин, други антихистаминови лекарства някоя от останалите съставки на това лекарство(изброени в т.6)



### **Предупреждения и предпазни мерки**

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Телфаст.

- ако имате проблеми с черния дроб или бъбреците,
- ако имате или сте имали сърдечни заболявания, тъй като този лекарствен продукт може да доведе до по-бърз или неправилен сърден ритъм,
- ако сте в напреднала възраст.

Ако смятате, че някои от тези условия се отнася за Вас, или имате някакви съмнения, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди лечението с Телфаст.

### **Други лекарства и Телфаст**

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускані без рецепт.

Ако използвате лекарства които съдържат алуминий и магнезий, препоръчва се да предвидите около 2 часа между времето, в което вземате Телфаст и другите лекарствата. Това се прави, защото те могат да повлият на действието на Телфаст, като понижат количеството на приетото лекарство.

### **Бременност и кърмене**

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Иформирайте Вашия лекар, ако кърмите или възnamерявате да кърмите.

### **Бременност**

Телфаст не трябва да се използва по време на бременност, освен ако това е наложително.

### **Кърмене**

Телфаст не се препоръчва при кърмещи жени.

*Винаги се консултирайте с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да приемате някакво друго лекарство.*

### **Шофиране и работа с машини**

Телфаст не предизвиква съниливост, така, че може да шофирате и да работите с машини, докато се лекувате с Телфаст.



Въпреки това трябва да се уверите, че Вие не сте повлияни по този начин и, че не чувствате сънливост или замаяност, преди да шофирате или да изпълнявате задачи, които изискват концентрация.

### **3.Как да приемате Телфаст**

Винаги взимайте Телфаст 180 mg точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### **Как да приемате това лекарство**

- Приемайте лекарството през устата,
- Може да го приемате с или без храна,
- Спазвайте предписаното от Вашия лекар по време на целия период на лечение.

#### **Какво количество да приемате**

##### **Възрастни и деца над 12 години:**

Препоръчителната доза е 1 таблетка (180 mg) дневно.

#### **Ако сте приели повече от необходимата доза Телфаст**

Ако случайно сте приели твърде много таблетки, обърнете се към Вашия лекар за съвет или отидете в най-близката болница. Симптомите на предозиране са замаяност, сънливост, умора и сухота в устата.

#### **Ако сте пропуснали да приемете Телфаст**

- приемайте Телфаст както Ви е казал Вашия лекар
- Ако забравите да вземете една доза, вземете я веднага след като си спомните. Когато обаче времето в което трябва да приемете следващата доза е близко трябва да вземете само еднократна доза, както обикновено.
- Не приемайте повече от предписаната Ви дневна доза Телфаст
- Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

#### **Ако спрете приема на Телфаст**

Кажете на Вашия лекар ако искате да спрете приема на Телфаст преди да завършите вашето лечение. Ако спрете да приемате Телфаст по-рано от предвиденото, Вашите симптоми могат да се възстановят.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

### **4.Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, Телфаст 180 mg може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Кажете на Вашия лекар веднага и спрете приемането на Телфаст 180 mg ако получите подувания по лицето, устните или езика, защото това могат да са признания на тежка алергична реакция.



- Чести нежелани реакции (при по-малко от 1 на 10 и при по-вече от 1 на 100 пациенти): главоболие, сънливост, гадене, замайване.
- Нечести нежелани реакции (при по-малко от 1 на 100 и при по-вече от 1 на 1000 пациенти): умора
- С неизвестна честота: Реакции на свръхчувствителност проявени с ангиоедем, стягане в гърдите, диспнея, зачервяване на кожата и системна анафилаксия.; Сънливост, нервност, нарушения на съня или кошмари, параноя; ускорена сърдечна дейност, сърцебиене; диария; обрив, уртикария, сърбеж.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

## 5.Как да съхранявате Телфаст

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Телфаст след срока на годност, отбелязан върху опаковка.

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не се изискват специфични мерки за съхранение.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

### Какво съдържа Телфаст

- Активното вещество е фексофенадинов хидрохлорид (*hexofenadine hydrochloride*). Всяка таблетка съдържа 180 mg фексофенадинов хидрохлорид като съответното количество е отбелязано на блистера и картонената опаковка
- Другите съставки са:
  - *сърцевината на таблетката*: микрокристална целулоза, прешелатинирано царевично нишесте, кроскарамелоза натрий, магнезиев стеарат.
  - *обвивката на таблетката*: хипромелоза, повидон, титанов диоксид (E171), силициев диоксид, колоиден безводен, макрогол 400, железен оксид червен, железен оксид жълт.

### Как изглежда Телфаст и какво съдържа опаковката

Таблетките Телфаст 180 mg са с цвят на праскова и с формата на капсула, която от едната страна има маркировка „018” а от другата страна „e”. Таблетките се предлагат в бели непрозрачни блистери. Всеки блистер съдържа 10 филмирани таблетки, опаковани в картонена опаковка.

Предлагат се опаковки от 10 и 30 таблетки, опаковани в картонена кутия.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.



**Притежател на разрешението за употреба е:**  
**Санофи-Авентис България ЕООД**  
1303 София, бул. Александър Стамболов 103,  
България

**Производител:**  
Sanofi-Synthelabo Ltd. – Fawdon, Newcastle upon Tyne, NE3 3TT, Великобритания

**Дата на последно преразглеждане на листовката**  
Декември 2011

