

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА  
ТОРОGEL 2,5% gel  
ТОПОГЕЛ 2,5% гел



Кетопрофен

**ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ЛИСТОВКА, ЗАЩОТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ!**

Това лекарство се отпуска без рецепта. Въпреки това Вие трябва да използвате Топогел внимателно, за да получите най-добри резултати от лечението.

- Пазете тази листовка! Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от повече информация, обърнете се към фармацевт или лекар за съвет.
- Консултирайте се с лекар ако Вашите оплаквания се влошат или нямат подобрение след 5-7 дневно лечение.

**ОТ ТАЗИ ЛИСТОВКА ЩЕ НАУЧИТЕ:**

1. Какво е Топогел и за какво се прилага;
2. С какво да се съобразите преди да прилагате Топогел;
3. Как да прилагате Топогел;
4. Възможни нежелани реакции;
5. Как да съхранявате Топогел;
6. Друга информация.

**ТОПОГЕЛ 2,5% ГЕЛ СЪДЪРЖА:**

Лекарствено вещество в 100 g гел - Кетопрофен 2,5 g

Помощни вещества: динатриев едетат, карбомер, етанол, лавандулово масло, масло от цвят на горчив портокал, бензалкониев хлорид, глицерол, троламин, пропиленгликол, пречистена вода

**1. КАКВО Е ТОПОГЕЛ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?**


Топогел е производно на фенил-пропионовата киселина и притежава обезболяващ и противовъзпалителен ефект.

Топогел се използва за симптоматично лечение на лека до умерена локална болка, свързана с мускулни или ставни увреждания, в това число спортни и битови травми (навяхвания, натъртвания и отоци).

**2. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ТОПОГЕЛ**

Не използвайте Топогел ако имате:

- Свръхчувствителност към лекарственото или помощните вещества;
- Бронхиална астма или алергични заболявания;
- Кръстосана свръхчувствителност към ацетилсалицилова киселина и нестероидни противовъзпалителни средства;
- Кожни изменения като екзема, акне или при отворени кожни рани.



Топогел се прилага с повишено внимание при деца под 15-годишна възраст. Продуктът се използва с повишено внимание и при пациенти с увредена сърдечна, чернодробна или бъбречна функции.

По време на лечението не трябва да се допуска контакт с конюнктивата на очите и лигавиците.

Не се налага оклузивна превръзка. Продуктът не трябва да се прилага върху обширни кожни повърхности.

Лечението трябва да се прекрати при поява на обрив.

По време на лечението и две седмици след него трябва да се избягват директната слънчева светлина и солариум. Препоръчваната продължителност на лечението трябва да се спазва поради риск от получаване на контактен дерматит и фоточувствителност.

Гелът съдържа етанол – при често приложение може да се предизвика дразнене и изсушаване на кожата.

### **Приложение на Топогел и прием на храна и напитки**

Топогел се прилага върху кожата.

### **Бременност**

Топогел може да се прилага по време на първите шест месеца от бременността, ако лекарят прецени. По време на последните три месеца всички подобни лекарствени продукти могат да причинят сърдечно-белодробни и бъбречни увреждания у плода. В края на бременността може да се наблюдава удължено време на кървене у майката и плода. По тази причина Топогел не се прилага в последните три месеца на бременността.

### **Кърмене**

Топогел не се прилага по време на кърмене, поради преминаване на количества от него в майчиното мляко.

### **Шофиране и работа с машини**

Продуктът не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

### **Прием на други лекарства**

**Моля информирайте своя лекар или фармацевт ако приемате или сте приемали други лекарства, дори и ако не са предписани от лекар!**

Вероятността за лекарствени взаимодействия е ниска защото лекарството не попада директно в кръвта.

### **3. КАК СЕ ПРИЛАГА ТОПОГЕЛ?**

**Прилагайте Топогел точно както е посочено в тази листовка!**

*Възрастни и деца над 15 години*

Гелът се нанася върху болезненото или възпалено място два или три пъти дневно. След нанасянето се масажира леко в продължение на няколко



минути. Количеството на гела се съобразява с това да се покрие засегнатото място. Дневната доза не трябва да надвишава 15 g (7,5 g отговарят на 14 cm гел).

Продължителността на лечението не трябва да превишава една седмица. След употреба тубата трябва да се затваря плътно. Препоръчва се измиване на ръцете след намазване.

#### **Приемане на по-голяма доза**

Малка е вероятността да настъпи предозиране при локална употреба. При поглъщане по невнимание, гелът може да предизвика системни нежелани реакции, които зависят от поетото количество. Ако това се случи, се прилага симптоматично и поддържащо лечение.

#### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

**Както всички лекарства и Топогел има нежелани реакции.**

Могат да се наблюдават локализирани кожни реакции на мястото на апликацията.

*Нечести ( $\leq 1/100 - \geq 1/1000$ )*

Зачервяване, сърбеж, пруритус, екзема.

*Редки ( $< 1/1000 - > 1/10000$ )*

Светлочувствителност, поява на мехури, обрив.

*Много редки ( $< 1/10000$ )*

Тежка алергична реакция със съдов произход, влошаване на предходна бъбречна недостатъчност.

**Ако забележите нежелани реакции, които не са посочени в тази листовка, моля информирайте своя лекар или фармацевт!**

#### **5. СЪХРАНЕНИЕ**

Да се пази на място, недостъпно за деца!

Да се съхранява при температура под 25<sup>0</sup> C!

Да не се замразява!

Да се съхранява на защитено от пряка слънчева светлина място.

Да не се употребява след датата, посочена на опаковката!

Срок на годност - 2 (две) години от датата на производство.

#### **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

**Притежател на Разрешението за употреба**

Актавис ЕАД

ул. "Атанас Дуков" №29

1407 София, България

**Производител**

"Балканфарма-Троян" АД

ул. "Крайречна" №1

5600, Троян, България



За всяко допълнителна информация относно този лекарствен продукт се обръщайте към местното представителство на Притежателя на разрешението за употреба:

Актавис ЕАД

ул. "Атанас Дуков" №29

1407 София, България

Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

Последна актуализация на текста – Ноември 2008

