

## ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

**ТРОКСЕРУТИН ДС**  
2 % гел

**TROXERUTIN DS**  
2 % gel  
Троксерутин (*Troxerutin*)

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Листовка - Приложение 2

Към Рег. № 20040044

Разрешение № ВГ/ММ/Мб-54774-5

Обсърение № 01-02-2019

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

### В тази листовка:

1. Какво представлява ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да използвате ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел
3. Как да използвате ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

### 1. Какво представлява ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел и за какво се използва

#### Как действа ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел?

ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел притежава венотонично, капиряротонично, обезболяващо и противовъзпалително действие. Намалва повишената пропускливост на капилярите. Антагонизира венодилатативния ефект на хистамина, брадикинина и други медиатори на възпалението. Действа противовъзпалително върху перивенозната тъкан. Намалва отока, отстранява болката, подобрява трофиката и патологичните промени, свързани с венозната недостатъчност.

#### За какво се използва ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел?

ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел се използва при болка и оток следствие на хронична венозна недостатъчност, отекли и тежки крака, оток следствие на травма, мускулни травми, навяхване и изкълчване, болка след вено-склерозираща терапия.

### 2. Какво трябва да знаете преди да използвате ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел

#### Не използвайте ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел

- ако сте алергични към троксерутин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

#### Предупреждения и предпазни мерки

Не трябва да се нанася върху лигавици, открити рани и екземи.

#### Други лекарства и ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел



Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

При външно приложение на троксерутин няма данни за лекарствени взаимодействия.

#### **Бременност, кърмене и фертилитет**

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди използването на това лекарство.

Няма данни за нежелани ефекти върху плода и новороденото. Лекарственият продукт може да се прилага през втория и третия триместър на бременността, както и по време на кърмене.

#### **Шофиране и работа с машини**

Употребата на продукта не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

**ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел съдържа бензалкониев хлорид разтвор, който е дразнещо вещество и може да причини кожни реакции.**

### **3. Как да използвате ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел**

Винаги използвайте ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел точно, както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

**Начин на приложение:** Прилага се върху кожата.

Поразеният участък от кожата се намазва сутрин и вечер с малко количество гел. Нанася се и се втрива с леко масажирание отдолу нагоре до окончателното проникване на продукта.

**Ако сте използвали повече от необходимата доза ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел**

Няма опасност от предозиране поради начина на употреба. При случайно поглъщане на големи количества е необходимо промиване на устната кухина и стомаха, при нужда симптоматично лечение.

**Ако сте пропуснали да използвате ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел**

Ако по някаква причина е пропуснато използването на продукта, пациентът може по всяко време да извърши манипулацията, като съблюдава интервала между две нанасяния да е не по-малко от 10-12 часа.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

### **4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Не са установени нежелани лекарствени реакции, освен в редки случаи е възможна появата на зачервяване, сърбеж, кожни обриви. Те преминават бързо след прекъсване на лечението.

#### **Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. "Дамян Груев" № 8; 1303 София; тел.: +359 2 8903417; уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg). Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.



## **5. Как да съхранявате ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел**

При температура под 25°C, на сухо и защитено от светлина място.

Да не се замразява!

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

### **Срок на годност:**

5 години.

**Срок на годност след отваряне на първична опаковка:** 1 месец.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## **6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**

### **Какво съдържа ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел**

- Активното вещество е: троксерутин. 1 g гел съдържа 20 mg троксерутин.
- Другите съставки са: карбомер, троламин, динатриев едетат, бензалкониев хлорид разтвор, пречистена вода.

### **Как изглежда ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел и какво съдържа опаковката**

ТРОКСЕРУТИН ДС 2 % гел е с жълт до бледо кафяв цвят, хомогенен, прозрачен гел, 2 % за външно приложение в алуминиева туба по 40 g, поставена в индивидуална картонена кутия.

### **Производител**

ВЕТПРОМ АД, 2400 гр. Радомир, България, ул. "Отец Паисий" № 26

тел.: 02 451 93 00

e-mail: office@vpharma.bg

### **Притежател на разрешението за употреба**

ДАНСОН-БГ ООД, 2400 гр. Радомир, България, ул. "Отец Паисий" №26,

тел.: 02 451 93 00,

e-mail: office@danhson.bg

**Дата на последна редакция на листовката:** 11/2018 г.