

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Разтърка характеристика на продукта Приложение 1	
Към Reg. №	20050863
Разрешение №	67530
BG/MA/MP -	17-01-2025
Оценение №	/

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Тайлол Хот Д 500 mg/4 mg/60 mg прах за перорална супензия
Tylol Hot D 500 mg/4 mg/60 mg powder for oral suspension

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяко саше Тайлол Хот Д съдържа: парacetамол 500 mg, хлорфенираминов малеат 4 mg, псевдофедринов хидрохлорид 60 mg.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах за перорална супензия.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания

Тайлол Хот Д е показан за облекчаване на следните симптоми на простуда и грип:

- назална конгестия
- хрема
- кихане
- повищена телесна температура
- лека до умерена болка от различен произход

4.2. Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Препоръчителната дозировка на Тайлол Хот Д е посочена по-долу:

Съдържанието на всяко саше се разтваря в 160 ml топла вода (стандартна чаша) и се изпива веднага, без изчакване. Ако е необходимо, следващата доза да се вземе след интервал от 6 часа. Препоръчителната максимална дневна доза е 4 сашета.

Начин на приложение

Тайлол Хот Д се приема през устата.

4.3. Противопоказания

Тайлол Хот Д не трябва да се прилага при пациенти:

- със свръхчувствителност към парacetамол, хлорфенираминов малеат, псевдофедринов хидрохлорид или някоя от помощните вещества, изброени в точка 6.1
- с тежки чернодробни и бъбречни заболявания.
- приемащиmonoаминооксидазни инхибитори. За да се започне лечение с Тайлол Хот Д, тези лекарства трябва да бъдат спрени поне 2 седмици по-рано.
- страдащи от фенилкетонурия, тъй като съдържа аспартам, който е източник на фенилаланин.



- тежка хипертония или неконтролирана хипертония;
- тежко остро или хронично бъбречно заболяване/бъбречна недостатъчност.

4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Тайлол Хот Д трябва да се прилага под лекарски контрол при пациенти с:

- чернодробни, бъбречни, сърдечни, белодробни увреждания
- предшестваща анемия
- тежки сърдечни заболявания
- бронхиална астма
- глаукома
- хипертиреоидизъм
- хипертония, въпреки че псевдофедриновия хидрохлорид не показва влияние върху пациенти с нормално кръвно налягане
- захарен диабет

Синдром на задна обратима енцефалопатия (posterior reversible encephalopathy syndrome, PRES) и синдром на обратимата церебрална вазоконстрикция (reversible cerebral vasoconstriction syndrome, RCVS).

Съобщени са случаи на PRES и RCVS при употреба на продукти, съдържащи псевдофедрин (вж.точка 4.8). Рискът е повишен при пациенти с тежка или неконтролирана хипертония или с тежко остро или хронично бъбречно заболяване/бъбречна недостатъчност (вж.точка 4.3).

Приемът на псевдофедрин трябва да се преустанови и да се потърси незабавно лекарска помощ, ако се появят следните симптоми: внезапно силно главоболие или "гръмотевично" главоболие, гадене, повръщане, обърканост, гърчове и/или нарушения на зрението. Повечето съобщени случаи на PRES и RCVS отшумяват след преустановяване на употребата и подходящо лечение.

Трябва да се избягва едновременното приложение на Тайлол Хот Д с други парацетамол – съдържащи продукти, тъй като то може да доведе до предозирането на парацетамол. Да не се превишава препоръчаната максимална дневна доза или тази предписана от лекаря.

Пациенти, които употребяват антихипертензивни лекарства и/или антидепресанти трябва да се посъветват със съответния специалист.

По време на терапията с Тайлол Хот Д може да се появи умора, сънливост или световъртеж, затова шофирането на автомобил и управлението на потенциално опасни машини трябва да става особено внимателно.

Едновременното приемане на Тайлол Хот Д с алкохол трябва да се избягва, защото може да се появи допълнително понижение на бдителността.

Консултация с лекар е наложителна, ако високата температура продължи повече от 3 дни, а другите симптоми – повече от 5 дни.

Този лекарствен продукт съдържа лактоза и не трябва да се прилага при пациентите с редки вродени заболявания като галактозна непоносимост, лактозна недостатъчност или глюкозо-галактозна малабсорбация.

Педиатрична популация

Употребата на Тайлол Хот Д при деца под 12 години трябва да става под лекарски контрол.



4.5 Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

При високи дози се потенцира ефекта на продължително прилагани антикоагуланти. Парацетамол приложен в големи дози за продължителен период може да взаимодейства с кумарин, дериватите на индандион и фенотиазин. Алкохолът, барбитуратите и трицикличните антидепресанти могат да увеличат хепатотоксичността на парацетамол. Дозата на парацетамол се намалява при пациенти, които приемат антиепилептични лекарства като карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин или примидон. Хлорфенираминов малеат може да забави метаболизма на фенитоин в черния дроб като увеличи плазмената му концентрация. Рядко може да настъпи повишаване на артериалното налягане, при едновременното приложение на псевдофедринов хидрохлорид с деконгестанти, трициклични антидепресанти, медикаменти подтикващи апетита, амфетамини като психостимуланти и МАО инхибитори. Метилдопа, α - и β -адренергични блокери, гуанитидин могат да загубят ефективността си при едновременно приложение с псевдофедринов хидрохлорид.

4.6 Фертилитет, бременност и кърмене

При бременни и кърмачки е препоръчителен лекарски контрол.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

По време на лечение с Тайлол Хот Д може да се появи умора, съниливост или световъртеж, затова шофирането на автомобил и управлението на потенциално опасни машини трябва да става внимателно.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Като цяло Тайлол Хот Д се понася добре.

Нежеланите лекарствени реакции са категоризирани съгласно системо-органни класове, като се използва следната конвенция: много чести ($\geq 1/10$), чести ($\geq 1/100$ до $< 1/10$), нечести ($\geq 1/1000$ до $< 1/100$), редки ($\geq 1/10\ 000$ до $< 1/1000$), много редки ($< 1/10000$), с неизвестна честота (при наличните данни не може да се направи оценка).

Парацетамол:

Нарушения на кръвта и лимфната система:

Редки: тромбоцитопения, левкопения и панцитопения

Много редки: неутропения, тромбоцитопенична пурпura и агранулоцитоза

Нарушения на имунната система:

Редки: реакции на свръхчувствителност като уртикария и макуло-папулозен обрив и сърбеж

Псевдофедрин:

Нарушения на имунната система:

Много редки: макуло-папулозен обрив

Нарушения на нервната система:

Много редки: превъзбуддане на централната нервна система може да възникне нарушение, халюцинации

С неизвестна честота: синдром на задна обратима енцефалопатия (PRES) (вж. точка 4.4) и синдром на обратима церебрална вазоконстрикция (RCVS) (вж. точка 4.4).



Нарушения на бъбреците и никочните пътища:
Много редки: ретенция на урината

Хлорфенираминов малеат:

Нарушения на кръвта и лимфната система:
С неизвестна честота: хемолитична анемия

Нарушения на нервната система:
С неизвестна честота: седация, главоболие, световъртеж

Нарушения на очите:
С неизвестна честота: замъглено виждане

Сърдечни нарушения:
С неизвестна честота: палпитации, аритмия, хипотония

Стомашно-чревни нарушения:
С неизвестна честота: сухота в устата, липса на апетит, повръщане, диария

Хепатобилиарни нарушения:
С неизвестна честота: хепатит

Нарушения на бъбреците и никочните пътища:
С неизвестна честота: ретенция на урината

Хлорфенираминов малеат може да доведе до поява на антимускаринови реакции.


Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция директно на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ):

ул. Дамян Груев 8
1303 София
Тел. +359 2 8903417
Уебсайт: www.bda.bg

4.9. Предозиране

Ако се подозира предозиране, пациентът трябва незабавно да се насочи към здравно заведение. В зависимост от погълнатата доза, при някои пациенти при предозиране парacetamol може да бъде хепатотоксичен. След 12 до 48 часа следва покачване на чернодробните ензими, удължаване на промеждинното време; клиничните симптоми се позитивират 1 до 6 часа след приема. Десет грама общо количество погълнат парacetamol от възрастни могат да се окажат токсични; при деца по-малко от 150 mg/kg парacetamol не са хепатотоксични. Ранни симптоми на чернодробно връждане са: сънливост, повръщане, изпотяване и общо неразположение. Потвърждението чрез кръвни проби може да се докаже трудна задача в 48 до 72 час след приема. Уместно е приложението на ацетилцистеин, когато е възможно по-рано след приема на свръхдозата, без изчакване на резултата от определящите промени.



парацетамол. Може да се препоръча очистване с гастрален лаваж и индуцирано повръщане с ипекак сироп. Мониторирането включва определяне плазменото ниво на парацетамол поне 4 часа след приема на свръхдозата. Ако нивото в плазмата на парацетамол е потенциално хепатотоксично, тестове за определяне на чернодробната функция се правят на всеки 24 часа поне 96 часа след приема. Благодарение на различния метаболизъм на парацетамол при децата, инцидентите на тежко отравяне и смърт са относително редки. Лесно е да се определи количеството на максимално действие при деца. Ако свръхдозата надхвърля 150 mg/kg, следва да се определи нивото на парацетамол в плазмата, но не по-късно от 4 часа след приема. Препоръчва се предизвикване на повръщане с ипекас сироп. Ако плазмената концентрация на парацетамол надхвърля референтната граница както е показана в "номограма на свръхдоза", тогава е нужно лечение с ацетилцистеин. Терапия с ацетилцистеин се започва и ако нивото на парацетамол не може да се определи и вероятното общо количество надхвърля 150 mg/kg. Интоксикацията с хлорфенираминов малеат става очевидна няколко часа след приема; прилага се лечение както е описано в схемата за лечение на антихистамин / антихолинергично отравяне. Симптомите, свързани с предозиране на псевдофедринов хидрохлорид са: леко беспокойство, тахикардия и/или леко покачване на кръвното налягане. Симптомите стават очевидни 4 до 8 часа след приема. Всички симптоми са преходни и не изискват специфично лечение.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Парацетамол, комбинации с изключение на психолептици
ATC код: N02BE51

Тайлол Хот Д притежава аналгетичен, антиприретичен, антихистаминов и намаляващ отока на лигавицата на горните дихателни пътища ефект, който се дължи на активните му съставки.

Парацетамол е клинично доказан аналгетик и антиприретик. Аналгезията се осъществява чрез повишаване на прага на болката; антиприретичното действие е чрез повлияване центъра на терморегулация в хипотоламуса.

Хлорфенираминов малеат има антагонистично действие срещу хистамин H₁-рецептора, по този начин облекчава следните симптоми: хрема, назална конгестия, зачервяване и/или свръхчувствителност от страна на очите.

Псевдофедринов хидрохлорид е симпатикомиметичен амин, който намалява отока на лигавицата на горните дихателни пътища.

5.2. Фармакокинетични свойства

След прием през устата парацетамол бързо и напълно се абсорбира в stomашно-чревния тракт. Върхови плазмени концентрации се постигат за 10 до 60 минути. Парацетамол бързо и равномерно се разпределя в повечето тъкани в организма. Времето на полуживот е 1.25 до 3 часа. Метаболизира се в черния дроб чрез микрозомната ензимна система. Около 85% от погълнатата доза се екскретира чрез урината като свободно конюгиран парацетамол в рамките на 24 часа.

Хлорфенираминов малеат бавно и напълно се абсорбира в stomашно-чревния тракт. Върхови плазмени концентрации се постигат за 2.5 до 6 часа. Бионаличността е 25 до 50%. По-голяма част от абсорбирания хлорфенираминов малеат (70%) се свързва с плазмените белъци. Хлорфенираминов малеат се разпределя в повечето тъкани, включително централната нервна система. Времето на полуживот е между 2 и 43 часа; продължителността на действие е 4 до 6 часа. По-голямата част от хлорфенираминов малеат се метаболизира. Непроменената част и метаболитите се екскретират чрез урината и в малки количества чрез изпражненията.



Псевдофедринов хидрохлорид се абсорбира в стомашно-чревния тракт. Той е резистентен на мономикозидазния метаболизъм. Малки количества от метаболитите му и главно в непроменен вид се екскретират чрез урината.

Тъй като Тайлол Хот Д не съдържа захар, той е подходящ за диабетици и пациенти, които предпочитат нискокалорична диета.

5.3. Предклинични данни за безопасност

Предклиничните данни за безопасност не показват съществени рискове от употреба на Тайлол Хот Д при хората.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Помощни вещества
Лимонена киселина, безводна
Винена киселина
Натриев хидрогенкарбонат
Натриев карбонат, безводен
Повидон
Лактоза монохидрат
Натриев бензоат (Е 211)
Хинолиново жълто (Е 104)
Аромат на портокал
Сънсет жълто (Е 110)
Ацесулфам калий
Аспартам (Е 951)

6.2. Несъвместимости

Няма

6.3. Срок на годност

3 години

6.4. Специални условия на съхранение

Да се съхранява в оригиналната опаковка.
Да се съхранява на място недостъпно за деца.
Да се съхранява при температура под 25°C.
Да се пази от светлина и влага.

6.5. Вид и съдържание на опаковката

Саше от Polyester (PET)/ Aluminium/ LLDPE фолио.
6 или 12 броя сашета, опаковани в картонена кутия.

6.6 Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа



Съдържанието на всяко саше се разтваря в 160 ml топла вода (стандартна чаша) и се изпива веднага.

Неизползваният продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

НОБЕЛ ФАРМА ЕООД
Околовръстен път 36
София 1415, България

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Рег. № 20050463

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 03.10.2005

Дата на последно подновяване: 04.11.2010

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

11/2024

