

Листовка: информация за пациента

20130297

УНИРЕКС® 75 mg диспергиращи се таблетки
ацетилсалицилова киселина

35561

22.12.2016

UNIREX® 75 mg dispersible tablets
Acetylsalicylic acid

Особление №

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте т. 4.
- Ако след 3-5 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява УНИРЕКС 75 mg и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете УНИРЕКС 75 mg
3. Как да приемате УНИРЕКС 75 mg
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате УНИРЕКС 75 mg
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява УНИРЕКС 75 mg и за какво се използва

За предотвратяване на кардио-васкуларен риск от инфаркт на миокарда и инсулт при пациенти с прекарани кардио-васкуларни инциденти, нестабилна стенокардия или инсулт, както и след хирургична интервенция с направен байпас.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете УНИРЕКС 75 mg

Не приемайте УНИРЕКС 75 mg:

- ако сте алергични към активното вещество или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете УНИРЕКС 75 mg, ако страдате от пептична язва, хемофилия, чернодробно или бъбречно заболяване, дехидратация, алергия или подагра. Преди да приемате ацетилсалицилова киселина за продължително време с цел предотвратяване на кардио-васкуларен или церебро-васкуларен риск, първо трябва да се консултирате с лекар, който ще обясни ползите и рисковете за всеки индивидуален случай.

Деца и юноши

УНИРЕКС 75 mg е предназначен за възрастни и юноши над 16 год. възраст. При деца е установена взаимовръзка между приема на ацетилсалицилова киселина и синдрома на Рей. Синдромът на Рей е много рядко заболяване, което може да бъде и фатално.

Други лекарства и УНИРЕКС 75 mg

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, насърко сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, особено такива за лечение на подагра, лекарства, които правят кръвта по-течлива, метотрексат (за лечение на онкологично заболяване или дкориазис), диуретици, ацетазоламид, метоклопрамид, стероидни лекарства или лекарства за подпомагане



на храносмилането. При посещение на лекар или постъпване в болница, винаги съобщавайте какви лекарства приемате.

УНИРЕКС 75 mg с храна, напитки и алкохол

Препоръчва се приема на УНИРЕКС 75 mg да става по време на хранене или след хранене. Не се препоръчва УНИРЕКС 75 mg да се приема едновременно с алкохол.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Не се препоръчва приема на УНИРЕКС 75 mg по време на бременност, кърмене или ако планирате бременност.

Шофиране и работа с машини

УНИРЕКС 75 mg не повлиява концентрацията и способността за шофиране и работа с машини.

УНИРЕКС 75 mg съдържа лактоза. Това трябва да се има предвид при хора с лактозна, галактозна или глюкозна непоносимост.

3. Как да приемате УНИРЕКС 75 mg

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза при възрастни и деца над 16 години е по 1 таблетка (75 mg) дневно разтворена в чаша вода. За препоръчване е да се приема по време или веднага след хранене.

Употреба при деца и юноши

УНИРЕКС 75 mg не бива да се приема от деца под 16 годишна възраст, освен ако не е изрично предписан от лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза УНИРЕКС 75 mg

Ако вие или някой друг, случайно или преднамерено приеме повече таблетки наведнъж, или ако се съмнявате, че дете е приело някоя таблетка, трябва да се свържете незабавно с Вашия лекар или с най-близката болница.

Ако сте пропуснали да приемете УНИРЕКС 75 mg

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако сте забравили да приемете таблетката, вземете я веднага щом се сетите, освен ако не е наблизило времето за следващия прием.

Ако сте спрели приема на УНИРЕКС 75 mg

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ацетилсалицилова киселина се понася добре от много пациенти, но при някои може да предизвика нежелани ефекти, като дразнене на стомаха. Ако забележите кръв в израженията или те са черни, трябва незабавно да съобщите на Вашия лекар. При някои пациенти



възможно да се прояви по-дълго кървене на рани. При свръхчувствителни пациенти е възможно да се прояви затруднено дишане или обриви. Ацетилсалициловата киселина може да предизвика замаяност, обърканост, намален слух или шум в ушите. Вие трябва веднага да информирате Вашия лекар, ако забележите някой от посочените или друг нежелан ефект.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, в Изпълнителната агенция по лекарствата, ул. "Дамян Груев" № 8, 1303 София, тел. +35 928903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате УНИРЕКС 75 mg

Да се съхранява в оригиналната опаковка, при температура под 25°C на място, недостъпно за деца.

Период на използване след първоначално отваряне на опаковката – 6 месеца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа УНИРЕКС 75 mg

- Активното вещество е: ацетилсалицилова киселина 75 mg
- Другите съставки (помощни вещества) са: нишесте, лактоза, захарин натрий, безводна лимонена киселина, калциев карбонат, талк и натриев лаурил сулфат.

Как изглежда УНИРЕКС 75 mg и какво съдържа опаковката

Таблетките Унирекс 75 mg са кръгли и бели. Продуктът се предлага по 100 таблетки в пластмасова опаковка със защитена капачка.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:

НАТУРПРОДУКТ ООД

бул. "Христофор Колумб" № 64, 1592 София, България

Reg. No: 20130297

Производител:

M&A Pharmachem Ltd,
Allenby Laboratories,
Wigan Road, Westhoughton,
Bolton BL5 2AL, Англия

Дата на последно преразглеждане на листовката:

11/2016

