

ЛИСТОВКА



Листовка: информация за потребителя

Код Рег. № 20011157

УРОСТИМ® за възрастни 50 mg таблетки

Регистрационен №

- 68251

25-03-2025

UROSTIM® Adults 50 mg tablets

Убити бактериални култури от (killed bacterial cultures of):

Escherichia coli 29, *Escherichia coli* J5, *Proteus mirabilis*, *Enterococcus faecalis*,
Klebsiella pneumoniae

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако не се чувствате по-добре до 10 дни или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Уростим® за възрастни и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Уростим® за възрастни
3. Как да приемате Уростим® за възрастни
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Уростим® за възрастни
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Уростим® за възрастни и за какво се използва

Уростим® за възрастни представлява полибактериален имуностимулатор, който повишава естествената резистентност на организма и специфичния имунитет към различни инфекции на урогениталния тракт чрез стимулиране на хуморалните и клетъчни фактори на имунната система. Активира системния и локален имунитет.

Уростим® за възрастни е предназначен за перорална имунотерапия и имунопрофилактика на остри, рецидивиращи или хронични неспецифични заболявания на урогениталния тракт при деца и възрастни, независимо от вида на причинителя. Особено препоръчително е приложението му при цистити, приелонефрити, уретрити, простатити, безсимптомна бактериурия и др. При необходимост се прилага с антибиотична терапия. Особено показано е приложението на Уростим® за възрастни при лица с потисната имунологична реактивност в резултат от продължителна антибиотична терапия.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Уростим® за възрастни

Не приемайте Уростим® за възрастни

- ако сте алергични към активното вещество или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Уростим® за възрастни.



Други лекарства и Уростим® за възрастни

Не е наблюдавана несъвместимост с други лекарствени средства.

Уростим® за възрастни може да бъде комбиниран с всяко друго лечение, включително и антибиотична терапия. Позволява многократно приложение без опасност от привикване.

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства, включително и такива, отпускани без лекарско предписание.

Уростим® за възрастни с храна, напитки и алкохол

Не е наблюдавана несъвместимост.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Уростим® за възрастни не се препоръчва да се прилага през първите 3 месеца на бременността.

Шофиране и работа с машини

Уростим® за възрастни не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Уростим® за възрастни съдържа пшенично нишесте, което може да представлява опасност за хора с цъолиакия (непоносимост към глутен).

Може да причини стомашно разстройство и диария.

3. Как да приемате Уростим® за възрастни

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Уростим® за възрастни се прилага под формата на таблетки от 50 mg за възрастни.

Уростим® за възрастни се прилага по следния начин:

В остър стадий на урогенитални инфекции едновременно с антибиотичната терапия се приема по една таблетка сутрин преди ядене до изчезване на симптомите, но не по-малко от 10 последователни дни.

При хронични или рецидивиращи урогенитални инфекции се прилага по една таблетка сутрин преди ядене в течение на 2 - 3 поредни месеца. След прекъсване най-малко три месеца е възможно повторение на лечебния курс.

За профилактика на постоперативни усложнения - един месец преди операцията и един месец след операцията да се приема по 1 таблетка дневно.

Ако сте приели повече от необходимата доза Уростим® за възрастни

До сега не са наблюдавани нежелани реакции при предозиране на Уростим® за възрастни.

Ако сте пропуснали да приемете Уростим® за възрастни

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.

Продължете приема на Уростим® за възрастни по установената схема.

Ако сте спрели приема на Уростим® за възрастни

Говорете с Вашия лекар, преди да прекъснете или прекратите преждевременно лечението. Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4. Възможни нежелани реакции

До сега не са наблюдавани нежелани реакции при приложение на Уростим® за възрастни. Клиничните резултати показват много добра поносимост.



Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София,

тел.: + 359 28903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Уростим® за възрастни

Да се съхранява под 25°C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте Уростим® за възрастни след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената опаковка след „Годен до:/ EXP:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Уростим® за възрастни

- **Активно вещество:** Всяка таблетка Уростим® за възрастни съдържа 50 mg лиофилизирани убити бактериални култури от: *Escherichia coli* 29, *Escherichia coli* J5 в количества съответстващи на 3×10^9 клетки, и *Proteus mirabilis*, *Enterococcus faecalis*, *Klebsiella pneumoniae* в количества съответстващи на $0,4 \times 10^9$ клетки от всеки вид.

Помощни вещества са: микрокристална целулоза, пшенично нишесте, колоиден безводен силициев диоксид, повидон, магнезиев стеарат, декстран 40 включен в състава на активното вещество.

Как изглежда Уростим® за възрастни и какво съдържа опаковката

Таблетките са с бял до бледо-кафяв цвят с мозаечна структура. Картонената кутия съдържа три блистера по десет таблетки.

Не използвайте Уростим® за възрастни ако забележите, че таблетките са с променен външен вид, напукани или натрошени.

Притежател на разрешението за употреба и производител

„БУЛ БИО – НЦЗПБ“ ЕАД,

бул. „Янко Сакъзов“ № 26,

София 1504,

България

Тел.: +359 2 944 61 91

Факс.: + 359 2 943 34 55

Дата на последно преразглеждане на листовката: март 2025 г.

