

ЛИСТОВКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Валсол плюс 160 mg/25 mg филмирани таблетки

Valsol plus 160 mg/25 mg film-coated tablets

Валсартан/Хидрохлоротиазид (Valsartan/Hydrochlorothiazide)

Разрешение №

72765-70

21-08-2026

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Виж точка 4.

В тази листовка:

1. Какво представлява Валсол плюс 160 mg/25 mg и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемете Валсол плюс 160 mg/25 mg
3. Как да приемате Валсол плюс 160 mg/25 mg
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Валсол плюс 160 mg/25 mg
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Валсол плюс 160 mg/25 mg и за какво се използва

Валсол плюс 160 mg/25 mg филмирани таблетки съдържа две активни вещества, наречени валсартан и хидрохлоротиазид. И двете вещества помагат за контролиране на високо кръвно налягане (хипертония).

- Валсартан принадлежи към клас лекарства, които се наричат ангиотензин II рецепторни антагонисти и помагат за контролиране на високото кръвно налягане. Ангиотензин II е вещество, намиращо се в организма, което причинява свиване на кръвоносните съдове и по този начин води до повишаване на Вашето кръвно налягане. Валсартан действа чрез блокиране на ефекта на ангиотензин II. В резултат на това кръвоносните съдове се отпускат и кръвното налягане се понижава.
- Хидрохлоротиазид принадлежи към група лекарства, които се наричат тиазидни диуретици (известни също и като „обезводняващи таблетки“). Хидрохлоротиазид увеличава количеството на отделената урина, с което също понижава кръвното налягане.

Валсол плюс 160 mg/25 mg се използва за лечение на високо кръвно налягане, което не е добре контролирано от всяко едно от веществата самостоятелно.

Високото кръвно налягане повишава натоварването на сърцето и артериите. Ако не се лекува, то може да увреди кръвоносните съдове в мозъка, сърцето и бъбреците и да причини мозъчен удар, сърдечна недостатъчност или бъбречна недостатъчност. Високото кръвно увеличава риска от сърдечен инфаркт. Понижаването на Вашето кръвно налягане до нормални стойности намалява риска от поява на посочените нарушения.



2. Какво трябва да знаете преди да приемете Валсол плюс 160 mg/25 mg

Не приемайте Валсол плюс 160 mg/25 mg:

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към валсартан, хидрохлоротиазид, сулфонамидни производни (вещества, химически сходни с хидрохлоротиазид) или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- ако сте бременна след 3-ия месец (добре е също така да избягвате Валсол плюс 160 mg/25 mg и през по-ранния период на бременността – вижте точката относно бременност);
- ако имате тежко заболяване на черния дроб, разрушаване на малките жлъчни каналчета в черния дроб (билиарна цироза), водещо до задържане на жлъчка в черния дроб (холестаза);
- ако имате тежко заболяване на бъбреците;
- ако не можете да отделяте урина (анурия);
- ако сте на лечение с изкуствен бъбрек;
- ако нивото на калий или натрий в кръвта Ви е по-ниско от нормалното или ако нивото на калций в кръвта Ви е по-високо от нормалното, въпреки лечението;
- ако имате подагра;
- ако имате диабет или нарушена бъбречна функция и се лекувате с лекарство за понижаване на кръвното налягане, съдържащо алискирен.

Ако някое от посочените по-горе състояния се отнася за Вас, не приемайте това лекарство и поговорете с Вашия лекар .

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт

- ако приемате калий-съхраняващи лекарства, калиеви добавки, съдържащи калий заместители на солта или други лекарства, които могат да увеличат нивото на калий в кръвта Ви, като например хепарин. Може да се наложи Вашият лекар редовно да проследява количеството на калий в кръвта Ви.
- ако имате ниски нива на калий в кръвта;
- ако имате диария или тежко повръщане;
- ако използвате високи дози обезводняващи таблетки (диуретици);
- ако имате тежко сърдечно заболяване;
- ако страдате от сърдечна недостатъчност или сте преживели сърдечен удар. Следвайте внимателно указания на Вашия лекар за началната доза. Вашият лекар може също така да провери бъбречната Ви функция;
- ако страдате от стесняване на бъбречната артерия;
- ако неотдавна сте получили нов бъбрек;
- ако страдате от хипералдостеронизъм. Това е заболяване, при което надбъбречните жлези произвеждат прекалено голямо количество алдостерон. Ако това се отнася за Вас, не се препоръчва да използвате Валсол плюс 160 mg/25 mg.
- ако имате заболяване на бъбреците или черния дроб;
- ако някога сте имали подуване на езика и лицето, причинени от алергична реакция, наречена ангиоедем при прием на друго лекарство (включително ACE инхибитори), информирайте Вашия лекар. Ако тези симптоми се появят, когато приемате Валсол плюс 160 mg/25 mg, незабавно спрете приема на Валсол плюс 160 mg/25 mg и никога не го вземайте отново. Вижте също точка 4, „Възможни нежелани реакции“;



- ако имате висока температура, обрив и болки в ставите, е възможно това да са симптоми на системен лупус еритематозус (СЛЕ, вид автоимунно заболяване);
- ако страдате от диабет, подагра, високи нива на холестерола или на мазнини в кръвта;
- ако сте имали алергични реакции при употреба на други лекарства за намаляване на високото кръвно налягане от същия клас (ангиотензин II рецепторни антагонисти) или ако имате алергия или астма;
- ако почувствате, че зрението Ви намалява или болка в окото. Това могат да бъдат симптоми на натрупване на течност в съдовия слой на окото (хороидален излив) или увеличаване на налягането във Вашето око и могат да се появят в рамките на часове до седмица от приема на Валсол плюс 160 mg/25 mg. Ако не се лекува, това може да доведе до трайно увреждане на зрението. Ако преди сте имали алергия към пеницилин или сулфонамиди, рискът от възобновяване на Вашата алергия е повишен;
- ако приемате някое от следните лекарства, използвани за лечение на високо кръвно налягане:
 - АСЕ инхибитор (например еналаприл, лизиноприл, рамиприл), особено ако имате бъбречни проблеми, свързани с диабета;
 - алискирен;
- ако сте имали рак на кожата или ако развиете неочаквана кожна лезия по време на лечението. Лечението с хидрохлоротиазид, особено продължителната употреба на високи дози, може да повиши риска от някои видове рак на кожата и устните (немеланомен рак на кожата). Защитете кожата си от излагане на слънце и ултравиолетовите лъчи, докато приемате Валсол плюс 160 mg/25 mg.
- ако сте имали проблеми с дишането или белите дробове (включително възпаление или течност в белите дробове) след прием на хидрохлоротиазид в миналото. Ако получите тежък задух или затруднено дишане след прием на Валсол плюс 160 mg/25 mg, незабавно потърсете медицинска помощ.

Вашият лекар може периодично да проверява бъбречната Ви функция, кръвното налягане и количеството на електролитите (напр. калий) в кръвта Ви.

Говорете с Вашия лекар, ако получите коремна болка, гадене, повръщане или диария след прием на Валсол плюс. Вашият лекар ще вземе решение за по-нататъшно лечение. Не спирайте да приемате лекарството Валсол плюс самостоятелно.

Вижте също информацията озаглавена “Не приемайте Валсол плюс 160 mg/25 mg”.

Валсол плюс може да причини повишена чувствителност на кожата при излагане на слънце.

Употребата на Валсол плюс 160 mg/25 mg при деца и юноши (на възраст под 18 години) не се препоръчва.

Трябва да информирате Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна (или че е възможно да забременеете). Валсол плюс 160 mg/25 mg не се препоръчва за употреба при ранна бременност и не трябва да се използва, ако сте бременна след 3-ия месец, тъй като може да причини сериозни увреждания на Вашето бебе, ако се използва през този период (вижте точката относно бременност).

Употребата на Валсол плюс 160 mg/25 mg може да предизвика положителни резултати при тестовете за допинг контрол.



Употребата на Валсол плюс 160 mg/25 mg като допинг средство може да изложи на опасност Вашето здраве.

Прием на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Ефектът от лечението може да се повлияе, ако Валсол плюс 160 mg/25 mg се приема заедно с някои определени лекарства. Възможно е да се наложи промяна на дозата, прилагане на други предпазни мерки или в някои случаи – спиране на приема на едно от двете лекарства. Това важи особено за следните лекарства:

- литий – лекарство, което се използва за лечение на някои видове психични заболявания;
- лекарства, които повлияват или могат да бъдат повлияни от нивото на калий в кръвта, като например дигоксин – лекарство, контролиращо сърдечния ритъм, някои антипсихотични лекарства;
- лекарства, които могат да повишат съдържанието на калий в кръвта Ви, като например калиеви добавки, съдържащи калий заместители на солта, калий-съхраняващи лекарства, хепарин
- лекарства, които могат да намалят количеството на калий в кръвта Ви, като например диуретици (обезводняващи таблетки), кортикостероиди, някои лаксативи, карбеноксолон, амфотерицин или пеницилин G;
- някои антибиотици (от групата на рифампицин), лекарство, използвано за предотвратяване отхвърлянето на трансплантанти (циклоспорин) или антиретровирусно лекарство, използвано за лечение на ХИВ/СПИН инфекция (ритонавир). Тези лекарства може да усилят ефекта на Валсол плюс 160 mg/25 mg;
- лекарства, които могат да предизвикат “torsades de pointes” (неравномерен сърдечен ритъм) като антиаритмици (лекарства, използвани за лечение на сърдечни проблеми) и някои антипсихотици;
- лекарства, които могат да намалят количеството на натрий в кръвта, като антидепресанти, антипсихотици, антиепилептици;
- лекарства за лечение на подагра, като алопуринол, пробенецид, сулфинпиразон;
- терапевтичните витамин D и калциеви добавки;
- лекарства за лечение на диабет (перорални средства като метформин или инсулини);
- други лекарства за понижаване на кръвното Ви налягане, вкл. метилдопа, ACE инхибитори (като еналаприл, лизиноприл и др.) или алискирен (вижте също информацията в точки “Не приемайте Валсол плюс 160 mg/25 mg” и “Предупреждения и предпазни мерки”);
- лекарства, които повишават кръвното налягане, като норадреналин или адреналин;
- дигоксин или други дигиталисови гликозиди (лекарства, използвани за лечение на сърдечни проблеми);
- лекарства, които повишават нивото на кръвната захар, като например диазоксид или бета блокери;
- цитотоксични лекарства (използвани за лечение на рак), като метотрексат или циклофосфамид;
- болкоуспокояващи, като нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), вкл. селективни инхибитори на циклооксигеназа-2 (Cox-2 инхибитори) и ацетилсалицилова киселина > 3 g ;
- мускулни релаксанти, като например тубокурарин;



- анти-холинергични лекарства, (лекарства, използвани за лечение на различни заболявания, като стомашно-чревни спазми, спазъм на пикочния мехур, астма, морска болест, мускулни спазми, болест на Паркинсон и като помощно средство при анестезия);
- амантадин (лекарство, използвано за лечение на болестта на Паркинсон и също така използвано за лечение или предпазване от някои заболявания, причинени от вируси);
- холестирамин и колестипол (лекарства, които се използват за лечение на високите нива на мазнините в кръвта);
- циклоспорин – лекарство, което се използва при трансплантация на органи за предотвратяване на отхвърлянето на органа;
- алкохол, сънотворни и анестетици (лекарства със сънотворен или обезболяващ ефект, които позволяват на пациента да се подложи на операция);
- йодни контрастни вещества (агенти, използвани при образна диагностика)

Прием на Валсол плюс 160 mg/25 mg с храна, напитки и алкохол

Може да приемате Валсол плюс 160 mg/25 mg със или без храна.

Избягвайте употребата на алкохол, преди да се консултирате с Вашия лекар. Алкохолът може да предизвика допълнително понижаване на кръвното Ви налягане и/или да повиши риска да почувствате замаяване или да Ви прималее.

Бременност и кърмене

- **Трябва да информирате Вашия лекар, ако мислите, че сте бременна (или че е възможно да забременеете)**

Обикновено, Вашият лекар ще Ви посъветва да спрете да приемате Валсол плюс 160 mg/25 mg, преди да забременеете или веднага щом разберете, че сте бременна, и ще Ви каже да започнете да използвате друго лекарство вместо Валсол плюс 160 mg/25 mg. Валсол плюс 160 mg/25 mg не се препоръчва при ранна бременност и не трябва да се използва, ако сте бременна след 3-ия месец, тъй като може да причини сериозни увреждания на Вашето бебе, ако се използва след третия месец на бременността.

- **Информирайте Вашия лекар, ако кърмите или възнамерявате да кърмите**
Валсол плюс 160 mg/25 mg не се препоръчва при майки, които кърмят и Вашият лекар може да избере за Вас друго лечение, ако желаете да кърмите, особено ако Вашето бебе е новородено или е родено преждевременно.

Шофиране и работа с машини

Преди да шофирате, да използвате инструменти, да работите с машини или да извършвате други дейности, които изискват повишена концентрация, уверете се, че знаете как Ви действа Валсол плюс 160 mg/25 mg. Подобно на много други лекарства за лечение на високото кръвно налягане, Валсол плюс 160 mg/25 mg понякога може да причини замаяване и да повлияе способността Ви да се концентрирате.

Валсол плюс 160 mg/25 mg съдържа сорбитол

Всяка таблетка Валсол плюс 160 mg/25 mg съдържа 18,5 mg.

Валсол плюс 160 mg/25 mg съдържа натрий

Този лекарствен продукт съдържа натрий, по малко от 1 mmol (23 mg) на доза, т.е. практически не съдържа натрий.

Валсол плюс 160 mg/25 mg съдържа лактоза



Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари (например лактоза), посъветвайте се с него, преди да вземете това лекарство.

3. Как да приемате Валсол плюс 160 mg/25 mg

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Това ще Ви помогне да получите най-добрите резултати и ще намали риска от нежелани лекарствени реакции. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Хората с високо кръвно налягане често не забелязват никакви признаци на този проблем. Много от тях се чувстват напълно нормално. Именно поради това е важно за Вас да спазвате уговорените часове за прегледи, дори и да се чувствате добре.

Вашият лекар ще Ви каже точно колко таблетки от Валсол плюс 160 mg/25 mg да приемате. В зависимост от това как се повлиявате от лечението, Вашият лекар може да предложи по-висока или по-ниска доза.

- Препоръчителната доза на Валсол плюс 160 mg/25 mg е една таблетка дневно.
- Не променяйте дозата и не спирайте приема на таблетките, без да сте се посъветвали с Вашия лекар.
- Лекарството трябва да се приема по едно и също време всеки ден, обикновено сутрин.
- Можете да приемате Валсол плюс 160 mg/25 mg със или без храна.
- Погълнете таблетката с чаша вода.

Ако сте приели повече от необходимата доза Валсол плюс 160 mg/25 mg

Ако почувствате силно замаяване и/или Ви прималее, легнете в хоризонтално положение и веднага се свържете с Вашия лекар.

Ако по невнимание сте взели повече от необходимия брой таблетки, се свържете с Вашия лекар, фармацевт или с болница.

Ако сте пропуснали да приемете Валсол плюс 160 mg/25 mg

Ако сте забравили да вземете Вашата таблетка, вземете я веднага, щом си спомните. Ако обаче е наближило времето за прием на следващата доза, не вземайте пропуснатата си доза.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Валсол плюс 160 mg/25 mg

Спирането на лечението с Валсол плюс 160 mg/25 mg може да предизвика влошаване на Вашето високо кръвно налягане. Не спирайте приема на Вашето лекарство, освен ако Вашият лекар не Ви е посъветвал.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства Валсол плюс 160 mg/25 mg може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.



Някои нежелани реакции могат да бъдат сериозни и да изискват спешна медицинска помощ:

- Трябва да се свържете веднага с Вашия лекар, ако при Вас се появят симптоми на ангиоедем, като например:
 - подуване на лицето, езика или фаринкса;
 - затруднено преглъщане;
 - копривна треска и затруднено дишане.
- Тежка кожна болест, която предизвиква обрив, зачервяване на кожата, образуване на мехури по устните, очите или устата, белене на кожата, температура (токсична епидермална некролиза).
- Влошено зрение или болка в очите поради високо налягане (възможни признаци от натрупване на течност във васкуларния слой на окото (хороидален излив) или на остра закритоъгълна глаукома).
- Температура, възпалено гърло, по-чести инфекции (агранулоцитоза).

Тези нежелани реакции са много редки или честотата им е неизвестна.

Ако получите някои от тези симптоми спрете приема на Валсол плюс и незабавно уведомете Вашия лекар (виж точка 2 „Предупреждения и предпазни мерки“)

Другите нежелани реакции включват:

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):

- кашлица;
- ниско кръвно налягане;
- примаяване;
- дехидратация (със симптоми на жажда, суха уста и език, рядко уриниране, тъмно оцветяване на урината, суха кожа);
- мускулни болки;
- умора;
- изтръпване или вкочаняване;
- неясно виждане;
- шум (например свистене, бучене) в ушите.

Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 души):

- замаяност;
- диария;
- болки в ставите
- интестинален ангиоедем: подуване на червата, проявяващо се със симптоми като коремна болка, гадене, повръщане и диария.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата):

- затруднено дишане;
- силно намаляване на количество на отделената урина;
- ниски нива на натрий в кръвта (което може да причини умора, объркваност, потръпване на мускулите и/или конвулсии при по-сериозни случаи);



- ниско нивото на калий в кръвта (понякога с мускулна слабост, мускулни спазми, неправилен сърдечен ритъм);
- понижен брой на белите кръвни клетки (със симптоми като висока температура, инфекции на кожата, възпалено гърло или язви в устата поради инфекция, слабост);
- повишено ниво на билирубин в кръвта (което в тежки случаи може да предизвика пожълтяване на кожата и на очите);
- повишено ниво на свързания с уреята азот и повишено нивото на креатинин в кръвта (което може да показва нарушена бъбречна функция);
- повишено ниво на пикочната киселина в кръвта (което може в тежки случаи да отключи подагра);
- синкоп (припадане).

Следните нежелани лекарствени реакции са съобщени при продукти, съдържащи само валсартан или хидрохлоротиазид

Валсартан

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):

- виене на свят
- коремна болка.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата)

- мехури по кожата (признак на булозен дерматит);
- кожен обрив със или без сърбеж, съчетан с някои от следните признаци или симптоми: повишена температура, болки в ставите, мускулни болки, подути лимфни възли и/или грипоподобни симптоми;
- обрив, червено-виолетови петна, висока температура, сърбеж (симптоми на възпаление на кръвоносните съдове);
- понижени нива на тромбоцитите в кръвта (понякога с необичайни кръвоизливи или кръвонасядания (синини));
- високо ниво на калий в кръвта (понякога с мускулни спазми, неправилен сърдечен ритъм);
- алергичните реакции (със симптоми като кожен обрив, сърбеж, копривна треска, затруднено дишане или преглъщане, замаяност);
- подуване главно в областта на лицето, гърлото, обрив, сърбеж;
- повишаване на стойностите на функционалните чернодробни тестове;
- намалено ниво на хемоглобин и намален процентен брой на червените кръвни клетки в кръвта (които в тежки случаи може да отключат анемия);
- бъбречна недостатъчност;
- ниски нива на натрий в кръвта (което може да причини умора, обърканост, потръпване на мускулите и/или конвулсии при по-сериозни случаи).

Хидрохлоротиазид

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души):

- ниско ниво на калий в кръвта;
- повишено ниво на липиди в кръвта.

Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):



- ниско ниво на натрий в кръвта;
- ниско ниво на магнезий в кръвта;
- високо ниво на пикочна киселина в кръвта;
- сърбящ обрив и други видове обриви;
- намален апетит;
- леко гадене и повръщане;
- виене на свят, световъртеж при изправяне;
- невъзможност да се постигне или поддържа ерекция.

Редки (могат да засегнат до 1 на 1000 души):

- подуване и поява на мехури по кожата (поради повишаване на чувствителността спрямо слънчева светлина);
- високо ниво на калций в кръвта;
- високо ниво на захар в кръвта;
- захар в урината;
- влошаване на диабетното метаболитно състояние;
- запек, диария, стомашен или чревен дискомфорт, чернодробни нарушения, които могат да се появят заедно с пожълтяване на кожата или очите;
- неправилен сърдечен ритъм;
- главоболие;
- нарушения на съня;
- потиснато настроение (депресия);
- понижени нива на тромбоцитите в кръвта (понякога с кръвоизливи или кръвонасядания под кожата);
- виене на свят;
- мравучкане или изтръпване;
- нарушено зрение.

Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 души):

- възпаление на кръвоносните съдове със симптоми като обрив, лилаво-червеникави петна, висока температура (васкулит);
- обрив, сърбеж, копривна треска, затруднено дишане или преглъщане, виене на свят (реакции на свръхчувствителност);
- обрив по лицето, болки в ставите, мускулни нарушения, температура (лупус еритематозус);
- силна болка в горната част на стомаха (панкреатит);
- затруднено дишане, придружено от температура, кашлица, хрипове, задух (респираторен дистрес, включително пневмония и белодробен оток);
- бледа кожа, умора, задух, потъмняване на урината (хемолитична анемия);
- температура, възпалено гърло или язви в устата, поради инфекции (левкопения);
- объркване, умора, мускулни потрепвания и спазми, учестено дишане (хипохлоремична алкалоза);
- остър респираторен дистрес (признаците включват тежък задух, повишена температура, слабост и обърканост).

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата):

- слабост, синини и чести инфекции (апластична анемия);



- силно намалено отделяне на урина (възможни признаци на бъбречно нарушение или бъбречна недостатъчност);
- обрив, зачервена кожа, мехури по устните, очите или устата, белене на кожата, висока температура (възможни признаци на еритема мутиформе);
- мускулни спазми;
- висока температура (треска);
- слабост (астения);
- рак на кожата и устните (немеланомен рак на кожата).

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите за нежеланите реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

тел.: + 359 2 890 34 17

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежеланите реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Валсол плюс 160 mg/25 mg

- Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
- Не използвайте Валсол плюс 160 mg/25 mg след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера след „Годен до:“ и „EXP“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
- Да се съхранява под 30°C. Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.
- Не използвайте Валсол плюс 160 mg/25 mg, ако опаковката е повредена или има белези на подправяне.
- Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6 Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Валсол плюс 160 mg/25 mg

Активните вещества са валсартан и хидрохлоротиазид.

Всяка филмирана таблетка Валсол плюс 160 mg/25 mg съдържа 160 mg валсартан и 25 mg хидрохлоротиазид.



Другите съставки са:

- **Сърцевина на таблетката:** целулоза, микрокристална; силициев диоксид, безводен колоиден; сорбитол; магнезиев карбонат; прежелатинизирано царевично нишесте; повидон К-30; натриев стеарилфумарат; натриев лаурилсулфат; кросповидон тип А.
- **Филмиращо покритие:** лактоза монохидрат; хипромелоза; макрогол 4000; титанов диоксид (Е 171); железен оксид, кафяв (Е 172); железен оксид, жълт (Е 172)

Как изглежда Валсол плюс 160 mg/25 mg и какво съдържа опаковката
Филмирана таблетка.

Валсол плюс 160 mg/25 mg филмирани таблетки: цилиндрична, двойноизпъкнала филмирана кафява таблетка.

Таблетките се предлагат под формата на опаковки с блистери, съдържащи по 14, 28, 30, 56, 98 или 280 таблетки.

Не всички видове опаковки или дозировки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:

ИНБИОТЕХ ООД
Ул. „Триадица“ № 5А
1000 София
България

Производител:

Място на производство:

Laboratorios LICONSA, S.A.
Avda. Miralcampo, N° 7, Polígono Industrial Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara),
ИСПАНИЯ

Laboratorios CINFA, S.A.
Olaz-Chipi, 10 - Polígono Areta
31620 Huarte (Pamplona)
ИСПАНИЯ

Laboratorios CINFA, S.A.
Avda Roncesvalles, S/N
31699 Olloqui (Navarra)
ИСПАНИЯ

Zentiva, k.s.
U. Kabelovny 130102 37, Praha 10
Чешка Република



Това лекарство е разрешено за употреба в държавите-членки на Европейското икономическо пространство, под следните имена:

160 mg/25 mg

Австрия:	Valsol plus HCT 160/25 mg Filmtabletten
България:	Валсол плюс 160/25 mg филмирани таблетки
Естония:	Valsartan hydrochlorothiazide Liconsa 160/25 mg
Гърция:	Avalsan plus 160/25 mg δισκίο επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο
Унгария:	Valsol plus 160/25 mg bevont tabletta
Ирландия:	Valsol plus 160/25 mg film-coated tablets
Латвия:	Valsol plus 160/25 mg apvalkotās tabletes
Нидерландия:	Valsartan/hydrochlorothiazide Liconsa 160/25 mg filmomhulde tablet
Португалия:	Valsol plus
Словения:	Valsartan/hidroklorotiazid Liconsa 160/25 mg filmsko obložene tablete
Испания:	Valsartán/Hidroclorotiazida Stadaфарма 160/25 mg comprimidos recubiertos con película EPG

Дата на последно преразглеждане на листовката:

Август 2026

