

## ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

VESSEL DUE F 250 LSU capsules, soft  
ВЕСЕЛ ДУЕ Ф 250 LSU капсули, меки  
VESSEL DUE F 600 LSU/ 2 ml solution for injection  
ВЕСЕЛ ДУЕ Ф 600 LSU/2 ml инжекционен разтвор  
Сулодексид (*Sulodexide*)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

### В тази листовка:

1. Какво представлява Весел Дуе Ф и за какво се използва
2. Преди да започнете да приемете Весел Дуе Ф
3. Как се приема Весел Дуе Ф
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Весел Дуе Ф
6. Допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рев. № ...	10010891
Разрешение № ...	21804
Одобрение № ...	25. 04. 2013

### 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВЕСЕЛ ДУЕ Ф И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Една капсула, мека съдържа сулодексид 250 LSU.

2 ml инжекционен разтвор съдържат сулодексид 600 LSU.

Весел Дуе Ф е предназначен за профилактика на съдови заболявания с риск от развитие на тромбоза.

### 2. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ЛЕЧЕНИЕ С ВЕСЕЛ ДУЕ Ф

#### Не приемайте ВЕСЕЛ ДУЕ Ф

- ако имате свръхчувствителност към продукта, към хепарин или хепарино-подобни лекарствени вещества, както и към някоя от останалите съставки на ВЕСЕЛ ДУЕ Ф
- ако имате хеморагична диатеза или вероятност да развиете хеморагични нарушения.

#### Обърнете специално внимание при употребата на ВЕСЕЛ ДУЕ Ф

ако провеждате антикоагулантно лечение. В този случай е препоръчително периодично да проверявате показателите на кръвосъсирването.

#### Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпусканi без рецептa.

ВЕСЕЛ ДУЕ Ф може да увеличи противосъсирващия ефект на хепарин и пероралните антикоагуланти, ако са приемани едновременно.

#### Прием на ВЕСЕЛ ДУЕ Ф с храни и напитки



**ВЕСЕЛ ДУЕ Ф** не трябва да се приема заедно с храна.

#### **Бременност и кърмене**

Като предпазна мярка по време на бременност или кърмене не се препоръчва употребата на **ВЕСЕЛ ДУЕ Ф**.

#### **Шофиране и работа с машини**

**ВЕСЕЛ ДУЕ Ф** не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

#### **Важна информация относно някои от съставките на ВЕСЕЛ ДУЕ Ф** Няма.

### **3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ВЕСЕЛ ДУЕ Ф**

Винаги приемайте **ВЕСЕЛ ДУЕ Ф** точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

**Обичайната доза е:**

**Капсули, меки:** 1-2 капсули през устата два пъти дневно; приемайте лекарството без храна, не го сдъвквайте.

**Инжекционен разтвор:** 1 ампула дневно интрамускулно или интравенозно.

Обикновено се препоръчва лечението да започне с инжекционен разтвор и след 15-20 дни да продължи с капсули за период от около 30-40 дни. Целият курс на лечение трябва да се повтаря най-малко два пъти годишно.

В зависимост от преценката на лекуващия лекар дозировката може да се променя по отношение на количество и честота на приложение.

#### **Употреба при деца**

**ВЕСЕЛ ДУЕ Ф** се използва при възрастни.

#### **Ако сте приели повече от необходимата доза ВЕСЕЛ ДУЕ Ф**

Предозирането може да причини кръвоизлив.

В случай, че сте приели повече **ВЕСЕЛ ДУЕ Ф** се препоръчва да уведомите Вашия лекар.

#### **Ако се пропуснали да приемете ВЕСЕЛ ДУЕ Ф**

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Както всички лекарства, **ВЕСЕЛ ДУЕ Ф** може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Чести нежелани реакции на **ВЕСЕЛ ДУЕ Ф**. Обикновено те са леки и краткотрайни:

Виене на свят,

Разстроен стомах, включително гадене и болка, Диария

Обрив

Нечести нежелани реакции:

Главоболие

Коремен дискомфорт, Киселини, Газове, Повръщане

Възпаление на кожата, зачеряване на кожата, копривна треска



**Болка на мястото на инжектиране, кръвоизлив на мястото на инжектиране (свързани с инжекционния разтвор)**

**Редки нежелани реакции.** Ако получите някоя от тях е необходима незабавна медицинска помощ:

Загуба на съзнание

Кървене от стомаха или червата

Периферен оток

В допълнение са съобщени изолирани случаи на следните нежелани реакции:

Меки капсули: нарушения на кръвта (анемия, нарушения в метаболизма на плазмените протеини), гастроинтестинални нарушения, кръв в изпражненията (черно оцветени изпражнения), подуване на гениталиите, зачеряване на кожата на гениталиите, нарушена честота на менструацията, копривна треска, големи кръвоизливи по кожата (ехимоза).

Инжекционен разтвор: сърцевиене (палпитации), нарушение в зрението, болка в гърдите, болка, конвулсии, треперене, чувство за нереалност, затруднено уриниране, стеснение на пикочния мехур, наличие на кръв в храчките (хемоптиза), горещи вълни, парещо усещане на мястото на инжектиране.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

## **5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ВЕСЕЛ ДУЕ Ф**

Да се съхранява под 30 °C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте ВЕСЕЛ ДУЕ Ф след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след "Годен до". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

### **Какво съдържа ВЕСЕЛ ДУЕ Ф**

#### **Капсули, меки:**

Активното вещество е сулодексид 250 LSU.

Помощни вещества:

Сърцевина:

Натриев лаурил сарказинат

Силиконов диоксид

Триацетин

Обвивка:

Желатин

Глицерол

Натриев етил паракидроксибензоат

Натриев пропил паракидроксибензоат

Титанов диоксид (Е171)

Железен оксид, червен (Е 172)



**Инжекционен разтвор:**

Активното вещество е сулодексид 600 LSU

Помощни вещества:

Натриев хлорид

Вода за инжекции

**Притежател на разрешението за употреба и производител**

**ALFA WASSERMANN S.p.A.**

Via Enrico Fermi, 1

65020 - ALANNO (PE) - Италия

**Дата на последно одобрение на листовката: 01/2013.**

