

## Листовка: информация за потребителя

### Викс АнтиГрип Макс 1 000 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор Vicks AntiGrip Max 1 000 mg/12.2 mg powder for oral solution

парацетамол/фенилефринов хидрохлорид  
(paracetamol/phenylephrine hydrochloride)

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар, фармацевт или медицинска сестра.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

#### Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Викс АнтиГрип Макс и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Викс АнтиГрип Макс
3. Как да приемате Викс АнтиГрип Макс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Викс АнтиГрип Макс
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20140362
Разрешение №	72091 / 13-06-2026
BG/MA/MP	
Одобрение №	

#### 1. Какво представлява Викс АнтиГрип Макс и за какво се използва

Викс АнтиГрип Макс е предназначен за облекчаване на симптоми на настинка и грип като главоболие, болки, възпалено гърло, запушване на носа и за понижаване на температурата. Той съдържа две активни съставки:

- парацетамол е добре известно болкоуспокояващо средство (аналгетик) и може също да понижи повишената температура (антипиретик);
- фенилефринов хидрохлорид (назален деконгестант) намалява отока в ноздрите и така облекчава състоянието при запушване на носа.

Трябва да използвате Викс АнтиГрип Макс само ако имате комбинация от симптоми на настинка и грип като болка/повишена температура и запушен нос.

Трябва да говорите с Вашия лекар, ако не се чувствате по-добре или се влошите след 3 дни.

#### 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Викс АнтиГрип Макс

##### Не приемайте Викс АнтиГрип Макс, ако:

- сте алергични към парацетамол, фенилефрин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
- имате сериозно сърдечно заболяване;
- имате високо кръвно налягане (хипертония);
- имате тежко чернодробно заболяване;
- имате бъбречно заболяване или проблеми с бъбреците;
- имате изразена свръхактивност на щитовидната жлеза (хипертиреозидизъм);
- имате глаукома (повишено вътреочно налягане) от закритоъгълен тип;



- понастоящем приемате моноаминооксидазни инхибитори (МАОИ) или сте ги приемали през последните две седмици;
- приемате други деконгестанти за настинка и грип.

### **Деца и юноши**

Да не се дава на деца под 16-годишна възраст.

Важно: съдържа парацетамол. Да не се приема едновременно с други продукти, които съдържат парацетамол.

Незабавно трябва да се търси медицинска помощ в случай на предозиране, дори и когато се чувствате добре, поради риска от забавено, сериозно чернодробно увреждане.

### **Предупреждения и предпазни мерки**

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра преди да приемете Викс АнтиГрип Макс, ако:

- имате проблем с чернодробната функция;
- имате изразена свръхактивност на щитовидната жлеза (хипертиреозидизъм);
- сте мъж и имате увеличена простатна жлеза, тъй като може да е по-трудно да уринирате;
- сте диабетик или имате проблем с кръвообращението (включително синдром на Рейно);
- страдате от недохранване (ако сте значително под нормалното тегло);
- страдате от глюкозо-6-фосфат дехидрогеназна недостатъчност (генетично нарушение);
- сте бременна или кърмите.

По време на лечение с Викс АнтиГрип Комплекс уведомете незабавно Вашия лекар, ако:

- имате тежки заболявания, включително тежко бъбречно увреждане или сепсис (когато бактериите и токсините им циркулират в кръвта, което води до увреждане на органите), или ако страдате от недохранване, хроничен алкохолизъм или ако приемате флуфлоксацилин (антибиотик); Съобщава се за сериозно състояние, наречено метаболитна ацидоза (нарушение на кръвта и телесните течности), при пациенти в случаите, когато парацетамол се приема с постоянни дози за продължителен период от време или когато парацетамол се приема заедно с флуфлоксацилин. Симптомите на метаболитна ацидоза могат да включват: сериозни затруднения при дишане с дълбоко учестено дишане, сънливост, гадене и повръщане.

### **Други лекарства и Викс АнтиГрип Макс**

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемете, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства. Уведомете Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Викс АнтиГрип Макс, ако приемате:

- лекарства, съдържащи парацетамол или други деконгестанти за настинка и грип. Ако приемате такива, не приемайте Викс АнтиГрип Макс.
- флуфлоксацилин (антибиотик), тъй като съществува сериозен риск от отклонения в кръвните показатели и алкално-киселинното равновесие (метаболитна ацидоза с голяма анионна разлика), което изисква спешно лечение (вж. точка 2).
- моноаминооксидазни инхибитори (МАОИ), използвани за лечение на депресия или болестта на Паркинсон. Не приемайте Викс АнтиГрип Макс, ако сте приемали МАОИ през последните 14 дни.
- трициклични антидепресанти за лечение на депресия, като амитриптилин или имипрамин;
- лекарство за понижаване на високо кръвно налягане (антихипертензивен продукт), включително бета-блокери, или за подобряване на сърдечната функция или коригиране на абнормен сърдечен ритъм (дигоксин, ланоксин, дигитоксин);
- лекарство против гадене и повръщане (като метоклопрамид или домперидон);
- лекарства за разреждане на кръвта (антикоагуланти), като варфарин или други;
- лекарство за намаляване на висок холестерол (като колестирамин);
- седативи (барбитурати);
- продукти, съдържащи ацетилсалицилова киселина (аспирин);
- хлорамфеникол (антибиотик);



- пробенецид или AZT (зидовудин).

#### **Викс АнтиГрип Макс с храна и напитки**

Не приемайте този продукт с алкохолни напитки.

#### **Бременност и кърмене**

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Викс АнтиГрип Макс може да бъде използван по време на бременност или кърмене само ако е абсолютно наложително и само ако сте посъветвани от лекар или фармацевт.

**Викс АнтиГрип Макс съдържа аспартам (E951)**, който е източник на фенилаланин, еквивалентен на 14 mg/дозова единица. Може да бъде вреден за хора с фенилкетонурия. Може да Ви навреди ако имате фенилкетонурия, рядко генетично заболяване, при което се натрупва фенилаланин, тъй като организмът не може да го отдели правилно.

**Викс АнтиГрип Макс съдържа захароза.** Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с него преди да приемате този лекарствен продукт.

#### **Викс АнтиГрип Макс съдържа натрий:**

Това лекарство съдържа 117,5 mg натрий (основна съставка на готварската/трапезната сол) във всяко саше. Това количество е еквивалентно на 5,875% от препоръчителния максимален дневен хранителен прием на натрий за възрастен.

### **3. Как да приемате Викс АнтиГрип Макс**

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

#### **Препоръчителна доза**

Това лекарство е прах, който трябва да бъде разтворен във вода и приет като топла напитка. Изсипете едно саше от праха в чаша със стандартен размер и напълнете с гореща, но не вряща вода (около 250 ml). Оставете да изстине до температура, подходяща за пиене.

Възрастни: 1 саше на всеки 4-6 часа, ако се налага.

Юноши (на възраст на и над 16 години): 1 саше на всеки 6 часа при необходимост.

Да не се приемат повече от 4 сашета за всеки 24-часов период.

#### **Употреба при деца и юноши**

Да не се дава на деца под 16 години, освен ако не е предписано от лекар.

**Да не се надвишава препоръчителната доза.**

Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

#### **Ако сте приели повече от необходимата доза Викс АнтиГрип Макс**

Незабавно потърсете медицинска помощ, ако по невнимание приемете повече отколкото трябва, дори ако се чувствате добре, поради риска от забавено, сериозно чернодробно увреждане.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.



#### 4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства Викс АнтиГрип Макс може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Ако получите някоя от следните нежелани реакции, или се случи нещо необичайно, незабавно прекратете приема на това лекарство.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата): Сериозно състояние, при което може да има натрупване на киселина в кръвта (наречено метаболитна ацидоза) при пациенти с тежко заболяване, които използват парацетамол (вижте точка 2)

В редки случаи фенилефрин може да причини ускорен сърдечен ритъм (палпитации). Рядко могат също да се наблюдават високо кръвно налягане с главоболие, повръщане и палпитации. Фенилефрин може в редки случаи да причини и нарушения на съня (безсъние), нервност, треперене (тремор), тревожност, безпокойство, обърканост, раздразнителност или главоболие.

Тези нежелани реакции са редки (засягат по-малко от 1 на 1 000 души, но повече от 1 на 10 000).

Загуба на апетит, гадене или повръщане са чести при фенилефрин (засягат повече от 1 на 100 души, но по-малко от 1 на 10).

При парацетамол има съобщения за нарушения на определени кръвни клетки, но това е много рядко (засяга по-малко от 1 на 10 000 души). Ако се случи това, симптомите може да включват необичайна поява на синини или инфекции като възпалено гърло.

Алергични реакции (като кожен обрив или уртики); тежки алергични реакции (анафилаксия); хрипове или затруднено дишане може да се наблюдават рядко (засягат по-малко от 1 на 1 000 души, но повече от 1 на 10 000).

Докладвани са много редки случаи на сериозни кожни реакции.

Отклонения в чернодробните показатели в кръвта (по-малко от 1 на 10 000 души).

#### Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно на Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев” № 8, 1303 София, тел.: +359 2 8903417, уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg) Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

#### 5. Как да съхранявате Викс АнтиГрип Макс

**Да се съхранява на място, недостъпно за деца.**

Не приемайте Викс АнтиГрип Макс след срока на годност, отбелязан върху сашето или картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да не се съхранява при температура над 25 °С.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.



## 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

### Какво съдържа Викс АнтиГрип Макс

- Активни вещества: парацетамол и фенилефринов хидрохлорид. Едно саше съдържа 1000 mg парацетамол и 12,2 mg фенилефринов хидрохлорид (еквивалентен на 10 mg фенилефрин).
- Други съставки: захароза, натриев цитрат дихидрат, лимонена киселина, аскорбинова киселина, калиев ацесулфам (E950), аспартам (E951), хинолиново жълто (E104), лимонени аромати.

### Как изглежда Викс АнтиГрип Макс и какво съдържа опаковката

Викс АнтиГрип Макс е жълт прах за перорален разтвор, който е опакован в ламинирани сашета, поставени в картонена опаковка. Продуктът се предлага в картонени опаковки с 5 и 10 сашета.

За допълнителна информация относно този продукт, моля, попитайте Вашия лекар или фармацевт, или се свържете с притежателя на разрешението за употреба.

### Притежател на разрешението за употреба

Wick Pharma, Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH  
Sulzbacher Strasse 40  
65824 Schwalbach am Taunus  
Германия

### Производител

Procter & Gamble Manufacturing GmbH,  
Procter & Gamble Strasse 1,  
64521 Gross-Gerau, Hessen  
Германия

Това лекарство е разрешено за употреба в държавите - членки на Европейското икономическо пространство и в Обединеното кралство (Северна Ирландия) под следните имена:

България:	Викс АнтиГрип Макс 1 000 mg/12,2 mg прах за перорален разтвор
Чешка Република:	Vicks SymptoMed Forte citrón 1000 mg/12,2 mg prášek pro perorální roztok v sáčku
Естония:	Dioppex
Унгария:	Wick Cold and Flu Max
Литва:	Dioppex 1000 mg/12,2 mg milteliai geriamajam tirpalui
Латвия:	Dioppex 1000 mg/12,2 mg pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai
Румъния:	Vicks AntiGrip Max 1000mg/12,2mg pulbere pentru soluție orală
Ирландия:	Paracetamol 1000mg, Phenylephrine hydrochloride 12.2mg, powder for oral solution, lemon flavour
Обединено кралство (Северна Ирландия):	Vicks Cold & Flu Max Strength Hot Drink Lemon

Дата на последно преразглеждане на листовката 01/2026

