

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Викс АнтиГрип Комплекс 500 mg/200 mg/10 mg прах за перорален разтвор

Vicks AntiGrip Complex 500 mg/200 mg/10 mg powder for oral solution

28-07-2022

парацетамол/гвайфенезин/фенилефринов хидрохлорид
 (paracetamol/guaifenesin/phenylephrine hydrochloride)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Викс АнтиГрип Комплекс и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Викс АнтиГрип Комплекс
3. Как да приемете Викс АнтиГрип Комплекс
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Викс АнтиГрип Комплекс
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Викс АнтиГрип Комплекс и за какво се използва

Викс АнтиГрип Комплекс е предназначен за облекчаване на симптоми на настинка и грип.

Той съдържа три активни съставки:

- Парацетамол е добре известен болкоуспокояващ продукт (аналгетик). Той е ефективен срещу болки, включително главоболие и възпалено гърло, и може също да понижава температурата (антипиретик).
- Гвайфенезин (като есплекторант) разводнява секрета, което помага да се облекчи гръдената кашлица.
- Фенилефринов хидрохлорид (известен деконгестант) намалява отока на носните проходи и така облекчава запушения нос.

Трябва да използвате Викс АнтиГрип Комплекс само ако имате болка/или висока температура, запушване на носа и гръдената кашлица.

Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Викс АнтиГрип Комплекс**Не приемайте Викс АнтиГрип Комплекс:**

- ако сте алергични към парацетамол, гвайфенезин, фенилефринов хидрохлорид или към никотин от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
- ако имате сърдечно заболяване;
- ако имате високо кръвно налягане (хипертония);
- ако имате проблем с черния дроб или тежко бъбречно заболяване;



- ако имате съръхактивност на щитовидната жлеза;
- ако сте диабетик;
- ако имате глаукома (повищено налягане в окото) от тесно-гълен тип;
- ако имате порфирия, което е наследствено нарушение, характеризиращо се с прекомерно количество пигменти в урината;
- ако приемате трициклични антидепресанти;
- ако приемате бета-блокери;
- ако приематеmonoаминооксидазни инхибитори (МАОИ) - използвани за лечение на депресия или болестта на Паркинсон или сте ги приемали през последните 14 дни;
- ако приемате лекарства за намаляване на кръвното налягане или за лечение на стенокардия.

Предупреждения и предпазни мерки

Важно: съдържа парацетамол. Да не се приема едновременно с други лекарства, които съдържат парацетамол.

Незабавно трябва да се потърси медицинска помощ в случай на предозиране, дори когато се чувствате добре, поради риска от забавено, сериозно чернодробно увреждане. Да не се приема едновременно с други продукти за лечение на грип, настинка или запущен нос.

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Викс АнтиГрип Комплекс:

- ако имате проблем с чернодробните функции;
- ако сте мъж и имате увеличена простатна жлеза, тъй като може да е по-трудно да уринирате;
- ако имате проблем с кръвообращението (включително синдром на Рейно);
- ако имате продължителна или хронична кашлица като тази при пушачи, при астма, хроничен бронхит или емфизем;
- ако имате тежка хемолитична анемия, глукозо-6-фосфатдехидрогеназна недостатъчност, хронично недохранване или сте обезводнени.

Деца и юноши

Не давайте Викс АнтиГрип Комплекс на деца под 12-годишна възраст.

Други лекарства и Викс АнтиГрип Комплекс

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, накърно сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

Кажете на Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Викс АнтиГрип Комплекс, ако приемате:

- лекарства, съдържащи парацетамол или други деконгестанти за настинка и грип. Ако приемате такива лекарства, не приемайте Викс АнтиГрип Комплекс.
- флоклоксацилин (антибиотик), тъй като съществува сериозен риск от отклонения в кръвните показатели и алкално-киселинното равновесие (метаболитна ацидоза с голяма анионна разлика), което изисква спешно лечение и може да се прояви особено при пациенти с тежка степен на бъбречно увреждане, сепсис (когато бактерии и техните токсини са попаднали в кръвообращението, което води до увреждане на органите), недохранване, хроничен алкохолизъм и при употреба на максималната дневна доза парацетамол.
- monoаминооксидазни инхибитори (МАОИ) - използвани за лечение на депресия или болестта на Паркинсон. Не приемайте Викс АнтиГрип Комплекс, ако сте приемали МАОИ през последните 14 дни.
- трициклични антидепресанти за депресия като амитриптилин или имипрамин;
- лекарство за високо кръвно налягане (антихипертензивни продукти), включително бета-блокери или за подобряване на сърдечната функция или коригиране на нередовен сърден ритъм (дигоксин, ланоксин, дигитоксин);
- фенотиазини (които се използват или като антипсихотични лекарства за лечение на състояния като шизофрения или параноя, или за предотвратяване на гадене и др.);
- лекарство за гадене и повръщане (като метоклопрамид или домперидон);
- лекарство за разреждане на кръвта (антикоагуланти) като варфарин или дроги (кумарин);
- лекарство за висок холестерол (като колестирамин);



- седативи (барбитурати);
- пробенецид или азидотимидин (зидовудин);
- изониазид (използван за лечение или предотвратяване на туберкулоза).

Викс АнтиГрип Комплекс с храна, напитки и алкохол

Не приемайте този продукт с алкохолни напитки.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство. Викс АнтиГрип Комплекс може да се употребява по време на бременност само ако е необходимо и ако е препоръчано от лекар или фармацевт. Трябва да използвате най-ниската възможна доза, която намалява болката и/или свали температурата и за възможно най-кратко време. Свържете се с Вашия лекар или акушерка, ако болката и/или температурата не са намалели или ако трябва да приемате лекарството по-често.

Шофиране и работа с машини

Този продукт може да причини замайване или объркане. Ако сте засегнати, не шофирайте и не работете с машини.

Викс АнтиГрип Комплекс съдържа аспартам, захароза и натрий:

- Аспартам (E951). Това лекарство съдържа 6 mg аспартам във всяко саше. Аспартамът е източник на фенилаланин. Може да Ви навреди ако имате фенилкетонурия, рядко генетично заболяване, при което се натрупва фенилаланин, тъй като организът не може да го отделя правилно.
- Захароза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него, преди да приемате този лекарствен продукт.
- Натрий: Това лекарство съдържа 157 mg натрий (основна съставка на готварската/ трапезната сол) във всяко саше. Това количество е еквивалентно на 7,85% от препоръчителния максимален дневен хранителен прием на натрий за възрастен. Говорете с Вашия лекар или фармацевт, ако се нуждаете от 3 или повече сашета дневно за продължителен период, особено ако Ви е препоръчано да спазвате диета с ниско съдържание на сол (натрий).

3. Как да приемате Викс АнтиГрип Комплекс

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

Възрастни и деца над 12-годишна възраст:

1 саше на всеки 4-6 часа, както е указано. Не приемайте повече от 4 сашета на всеки 24-часов период.

Да не се превишава посочената доза.

Не приемайте това лекарство с алкохолни напитки.

Употреба при деца и юноши

Да не се дава на деца под 12 години.

Начин на приложение

Това лекарство е прах, който трябва да бъде разтворен във вода и приет като топла напитка. Изсипете едно саше от праха в чаша със стандартен размер и напълнете с гореща, но не въздушна вода (около 250 ml). Оставете да изстине до температура, подходяща за писене, и изпитайте чака, непрозрачен разтвор с мириз и вкус на цитрус/ментол.



Продължителност на употреба

Продължителната употреба на този продукт не се препоръчва.

Консултирайте се с Вашия лекар, ако симптомите продължават повече от 3 дни или се влошават.

Ако сте приели повече от необходимата доза Викс АнтиГрип Комплекс:

Незабавно потърсете медицинска помощ, ако инцидентно сте приели повече отколкото трябва или ако дадете на дете повече, отколкото е препоръчано, дори ако Вие/детето се чувствате добре, поради риска от забавено сериозно чернодробно увреждане.

Ако имате никакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете Викс АнтиГрип Комплекс

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатото саше.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да причини нежелани лекарствени реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако изпитате някоя от следните сериозни нежелани реакции, незабавно спрете приема на това лекарство и потърсете спешна медицинска помощ:

- Съобщавани са много редки случаи на сериозни кожни реакции. Тежки алергични реакции (анафилаксия), хрипове или затруднено дишане може да се появят рядко.
(Редки: засягат по-малко от 1 на 1 000 души, но повече от 1 на 10 000 души; Много редки: засягат по-малко от 1 на 10 000 души).
- Много рядко може да се появят някои нарушения на кръвните клетки и панкреатит (възпаление на панкреаса) при прием на парацетамол (засягат по-малко от 1 на 10 000 души).

Други нежелани реакции

Честота	Нежелана реакция
Чести (засягат по-малко от 1 на 10 души, но повече от 1 на 100 души).	Загуба на апетит, гадене или повръщане
Редки (засягат по-малко от 1 на 1 000 души, но повече от 1 на 10 000 души).	Слаби алергични реакции (като кожни обриви или мекури); болка в стомаха, диария; главоболие, замаяност; сърцеви сърцеви (палигации); високо кръвно налягане; трудно заспиване (безсъние), нервност, треперене (тремор), раздразнителност, беспокойство, обърканост или тревожност; отклонения в резултатите от чернодробни изследвания

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции на Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Викс АнтиГрип Комплекс

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.



Да се съхранява под 25°C.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелзан върху сашето или картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Срок на годност след разтваряне: Разтворът е стабилен 90 минути.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Викс АнтиГрип Комплекс

- **Активни вещества:** пацетамол, гвайфенезин и фенилефринов хидрохлорид. Всяко саше от това лекарство представлява единична доза, съдържаща активните вещества: 500 mg пацетамол, 200 mg гвайфенезин и 10 mg фенилефринов хидрохлорид.
- **Други съставки:** захароза, лимонена киселина, винена киселина, натриев цикламат, натриев цитрат, аспартам (E951), ацесулфам калий (E950), ментол на прах, вкус на лимон, вкус на лимонов сок, хинолиново жълто (E104). Вижте края на точка 2.

Как изглежда Викс АнтиГрип Комплекс и какво съдържа опаковката

Викс АнтиГрип Комплекс е почти бял прах, който е опакован в ламинирано саше в картонена опаковка. Продуктът е наличен в картонени опаковки с 5 и 10 сашета.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба

Wick Pharma, Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH
Sulzbacher Strasse 40
65824 Schwalbach am Taunus
Германия

Производител

Procter & Gamble Manufacturing GmbH,
Procter & Gamble Strasse 1,
64521 Gross Gerau,
Hessen
Германия

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба в държавите членки на ЕИП под следните имена:

България: Викс АнтиГрип Комплекс 500 mg/200 mg/10 mg прах за перорален разтвор

Германия: Wick Daymed Kombi Erkältungsgetränk

Естония: TriFlunex

Испания: ViviGrip Expertorante polvo para solución oral

Ирландия: Paracetamol 500 mg Guaifenesin 200 mg Phenylephrine 10 mg Hydrochloride

Италия: Vicks Flu-Tripla Azione

Латвия: TriFlunex 500 mg/200 mg/10 mg Pulveris iekšīgi lietojama Šķīduma Pagatavošana

Литва: Paracetamol/Guaifenesin/ Phenylephrine Wick 500 mg/ 200 mg/10 mg Milteliai geriamajai tripalui

Полша: Vicks AntiGrip Complex

Румъния: Vicks AntiGrip Complex



Обединено кралство: Vicks Cold and Flu Care Daymed Completed Hot Drink

Унгария: Grippo Med Wick Citrom ízű por belsőleges oldathoz

Чешка Република: Vicks SymptoMed Complete citrón

Дата на последно преразглеждане на листовката:

06/2022

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Изпълнителна агенция по лекарствата (www.bda.bg).

