

ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Вируксан® Форте 1000 mg таблетки

Viruxan® Forte 1000 mg tablets

инозин ацедобен димепранол (inosine acedoben dimepranol)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате нужда от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Вируксан® Форте 1000 mg таблетки и за какво се използва
 2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Вируксан® Форте 1000 mg таблетки
 3. Как да приемате Вируксан® Форте 1000 mg таблетки
 4. Възможни нежелани реакции
 5. Как да съхранявате Вируксан® Форте 1000 mg таблетки
 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
- ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Листовка - Приложение 3

Към Рег. № 20260148

Възр. № 19-05-2026

ВГ/МА/МР - 72017

Одобрение №

1. Какво представлява Вируксан® Форте 1000 mg таблетки и за какво се използва

Вируксан® Форте 1000 mg таблетки е показан за лечение на пациенти с вирусни респираторни инфекции.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Вируксан® Форте 1000 mg таблетки

Не приемайте Вируксан® Форте 1000 mg таблетки

- ако сте алергични към инозин ацедобен димепранол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);
- ако имате остър пристъп, причинен от подагра;
- ако имате патологично повишени нива на пикочната киселина (може да бъде установено с лабораторни тестове).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Вируксан® Форте 1000 mg таблетки:

- ако страдате от бъбречни или уrolитични заболявания;
- ако страдате от някакви други заболявания;
- ако имате амнестични данни за подагра, повишено ниво на пикочна киселина в кръвта, камък в бъбреците или нарушена бъбречна функция;
- ако забележите признаци на алергична реакция, като обрив, сърбеж, затруднено дишане или подуване на лицето, устните, гърлото или езика. В такъв случай веднага спрете лечението и посетете лекаря си.

Във всички тези случаи, моля уведомете Вашия лекар преди да започнете лечение с Вируксан® Форте.



Други лекарства и Вируксан® Форте 1000 mg таблетки

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Това лекарство може да се използва заедно с други лекарства, предписани от лекар, тъй като в този случай ефектът от лекарствата може да бъде променен.

Обърнете специално внимание на лекаря си, ако вземате някое от изброените по-долу лекарства:

- лекарства, които променят имунната система;
- инхибитори на образуването на пикочна киселина или индуктори на отделяне на пикочна киселина;
- диуретици;
- зидовудин (лекарство за лечение на СПИН).

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна не приемайте Вируксан® Форте.

Ако планирате да имате бебе, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Вируксан® Форте не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

3. Как да приемате Вируксан® Форте 1000 mg таблетки

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Вируксан® Форте 1000 mg таблетки е предназначен изключително за перорално приложение.

Приемайте таблетката с достатъчно количество течност. Ако имате затруднения при преглъщането на цялата таблетка, може да я счупите и разтворите в малко количество овкусена течност.

Таблетката може да бъде разделена на равни дози.

Приемайте това лекарство със или без храна, по всяко време на деня.

Препоръчителна доза

Възрастни и пациенти в старческа възраст

Препоръчителната доза е 50 mg/kg телесно тегло, прилагана перорално в 3-4 поравно разделени дози през деня. Обикновено 3 g/дневно (1 таблетка 3 пъти дневно) до не повече от 4 g/дневно (1 таблетка 4 пъти дневно).

Деца и юноши с телесно тегло ≥ 60

Препоръчителната доза е 50 mg/kg телесно тегло/дневно, обикновено 3 g/дневно до не повече от 4 g/дневно (обикновено 1 таблетка 3-4 пъти дневно).

Дневната доза от 4 g не трябва да се надвишава.

Вируксан® Форте не трябва да се приема по дълго от 7 дни без консултация с лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Вируксан® Форте 1000 mg таблетки

До този момент няма съобщения за случаи на предозиране. Ако сте приели повече таблетки от необходимото, моля свържете се с Вашия лекар.

Ако сте пропуснали да приемете Вируксан® Форте 1000 mg таблетки

Ако сте пропуснали да приемете Вируксан® Форте, просто вземете Вашата следваща доза, както е упоменато в тази листовка. Не приемайте двойна доза, за да компенсирате



пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Вируксан® Форте 1000 mg таблетки

Ако спрете лечението, желаният ефект няма да бъде постигнат или симптомите могат да се влошат отново. Консултирайте се с Вашия лекар, преди да спрете лечението.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Всички лекарства могат да причинят алергични реакции, въпреки че сериозните алергични реакции са много редки.

Кажете незабавно на Вашия лекар, ако почувствате:

- внезапно хрипене;
- затруднения при дишане;
- подуване на клепачите, лицето или устните;
- обрив или сърбеж (особено засягащ цялото тяло).

Съобщавани са следните нежелани лекарствени реакции:

Много чести (може да засегне повече от 1 на 10 души):

- временно повишени стойности на пикочната киселина в кръвта и урината, но това ще се нормализира няколко дни след приключване на лечението.

Чести (може да засегне до 1 на 10 души):

- главоболие, световъртеж;
- гадене, повръщане, стомашен дискомфорт;
- кожен обрив, сърбеж;
- болки в ставите;
- умора или слабост (неразположение);
- повишени стойности на чернодробните ензими, повишени стойности на уреята в кръвта.

Нечести (може да засегне до 1 на 100 души):

- нервност;
- неспокоен сън (сънливост, безсъние);
- диария, запек;
- увеличено количество на урината.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):

- подуване на лицето, устните, клепачите или гърлото (ангиоедем), копривна треска; алергична реакция, засягаща цялото тяло (анафилактична реакция);
- замаяност;
- болки в стомаха и корема;
- зачервяване на кожата (еритем).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев“ № 8



1303 София
тел.: +359 2 8903417
уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Вируксан® Форте 1000 mg таблетки

Да се съхранява под 25°C в оригиналната опаковка.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера и картонената опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Вируксан® Форте 1000 mg таблетки

Активното вещество е инозин ацедобен димепранол. Всяка таблетка съдържа 1000 mg инозин ацедобен димепранол.

Другите съставки са: манитол, пшенично нишесте, повидон, магнезиев стеарат.

Как изглежда Вируксан® Форте 1000 mg таблетки и какво съдържа опаковката

Вируксан® Форте 1000 mg таблетки са бели до почти бели, продълговати, без мирис или с лек аминов мирис таблетки с делителна черта върху едната страна.

Вируксан® Форте 1000 mg таблетки се предлага в блистери с 12 и 24 таблетки в картонена кутия.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба

Ewopharma International, s.r.o.
Prokopa Vel'kého 52
811 04 Bratislava, Словакия

Производител

Lusomedicamenta – Sociedade Técnica Farmaceutica, S.A.,
Estrada Consiglieri Pedroso, 66, 69-B,
Queluz de Baixo,
2730-055 Barcarena,
Португалия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на разрешението за употреба:



Евофарма ЕООД
ул. „8 Декември” 13,
1700 София
България
тел.: +359 2 962 12 00
имейл: info@ewopharma.bg

Дата на последно преразглеждане на листовката:

