

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Visifrin Adipharm 0,5 mg/ml eye drops, solution

Визифрин Адифарм 0,5 mg/ml капки за очи, разтвор

Тетризолинов хидрохлорид (*tetryzoline hydrochloride*)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да прилагате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Визифрин Адифарм и за какво се използва
2. Преди да използвате Визифрин Адифарм
3. Как да използвате Визифрин Адифарм
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Визифрин Адифарм
6. Допълнителна информация

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. № 20100333	
Разрешение № 11 - 9657 / 25.05.2010	
Одобрение № /	

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВИЗИФРИН АДИФАРМ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Визифрин Адифарм принадлежи към групата лекарства, наречени симпатикомиметици.

За временно облекчение признаките на хиперемията (зачервяване) на окото вследствие на леки дразнения.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВИЗИФРИН АДИФАРМ

Не използвайте Визифрин Адифарм:

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното вещество и/или някое от помощните вещества на продукта;
- ако имате тясно-ъгълна глаукома (очно заболяване свързано с повишено въtreочно налягане)
- при деца под 3-годишна възраст.

Обърнете специално внимание при употребата на **ВИЗИФРИН АДИФАРМ**

Преди използването на лекарството трябва да информирате вашия лекар, ако:

- носите контактни лещи;
- ако сте дете под 6 години;

- ако сте бременна
- ако кърмите.
- се лекувате с МАО инхибитори, водещи до артериална хипертония.

Необходимо е преустановяване на лечението и преоценка на състоянието от страна на лекар, ако не се постигне облекчение до 72 часа или ако дразненето или засечеряването продължават или се повишат, както и при появата на болка в окото или промени в зрението.

Прием на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или накъсно сте приемали други лекарства, включително и такива, отпусканi без рецептa.

Не е известно взаимодействие на Визифрин Адифарм с други лекарства.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате Визифрин Адифарм капки за очи.

Шофиране и работа с машини

Подобно на всички капки за очи, възможно е да установите краткотрайно замъгливане на зрението, непосредствено след използване на Визифрин Адифарм. Не шофирайте или не работете с машини, докато зрението Ви не се проясни.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВИЗИФРИН АДИФАРМ


Винаги използвайте Визифрин Адифарм точно така, както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обичайната доза е:


При възрастни и деца над 6 години: по една или две капки в засегнатото око (очи), до 4 пъти дневно.

Приложението при деца под 6 години трябва да се провежда само под наблюдението на лекар.

Използвайте Визифрин Адифарм и в двете очи **само**, ако така Ви е казал Вашия лекар.
Използвайте Визифрин Адифарм само за накапване във Вашите очи.



1



2



3

- Вземете бутилката Визифрин Адифарм и огледало.
- Измийте ръцете си.
- Отвъртете капачката.
- Дръжте бутилката, насочена надолу, между палеца и пръстите.
- Наклонете главата назад. Разтворете клепача, с почиствените вече пръсти, така че да се образува "джоб" между него и окото. Капката трябва да попадне точно на това място. (Фигура 1). Приближете апликатора-капкомер на бутилката близо до окото. Използвайте огледалото, ако това Ви улеснява.
- **Внимавайте да не докосвате окото, клепачите, заобикалящата ги площ или други повърхности с върха на апликатора-капкомер.** Има опасност от замърсяване на капките.
- Внимателно натиснете основата на бутилката, за да изпусне само една капка Визифрин Адифарм. (Фигура 2)
- След като поставите Визифрин Адифарм, затворете клепача и натиснете с пръст окото въгълчето при носа, и задръжте така за 2-3 минути. (Фигура 3). Това ще попречи на Визифрин Адифарм да премине към други части на тялото.
- Ако трябва да използвате капките и за двете очи, повторете всички предходни стъпки и с другото око, като отново измиете ръцете си преди да започнете. Това спредотвратява евентуално пренасяне на инфекцията от едното към другото око.
- Затворете добре бутилката веднага след употреба.

Ако капката не попадне в окото, опитайте отново.

Ако сте поставили повече от необходимото количество Визифрин Адифарм

Незабавно изплакнете с топла вода. Не поставяйте повече капки, докато дойде времето за следващата обичайна доза.

Симптомите на предозиране включват: забавен пулс, сънливост, понижено кръвно налягане, отпуснатост и понижена телесна температура.

Ако случайно погълнете Визифрин Адифарм, посъветвайте се веднага с Вашия лекар или фармацевт.

Възможно е затруднено дишане, потискане на централната нервна система и много рядко кома.

Ако сте пропуснали да поставите Визифрин Адифарм

Продължете със следващата доза по Вашата обичайна схема. **Не поставяйте двойна доза, за да компенсирате забравената и така ще избегнете риск от предозиране.**

Ако имате някакви допълнителни въпроси свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Визифрин Адифарм може да предизвика някои нежелани лекарствени реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Възможна е появата на мидриаза (разширение на зениците), парене, дразнене, болка или зачервяване на окото и сълзене.

Прекомерната употреба на това лекарство може да доведе до зачервяване на окото.

Честотата се определя, както следва:

- **Чести нежелани реакции:** проявяват се при 1 до 10 потребители от 100;
- **Нечести нежелани реакции:** проявяват се при 1 до 10 на 1 000 пациенти;
- **Редки нежелани реакции:** проявяват се при 1 до 10 на 10 000 пациенти;
- **Много редки нежелани реакции:** проявяват се при 1 на 10 000 пациенти;

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ВИЗИФРИН АДИФАРМ

Да се съхранява в оригиналната опаковка, при температура под 25°C. Това лекарство не изиска специални условия на съхранение.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Да не се използва повече от 28 дни след първоначалното отваряне на бутилката, за да бъдат избегнати евентуални инфекции.

Да не се използва след изтичане на срока на годност. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа ВИЗИФРИН АДИФАРМ

Активната съставка е Тетризолинов хидрохлорид.

Един милилитър от капките за очи съдържа 0,5 mg Тетризолинов хидрохлорид.

15 ml от разтвора (съдържанието на една бутилка) съдържа 7,5 mg Тетризолинов хидрохлорид.

Другите съставки са: борна киселина, боракс, динатриев едетат,ベンзалкониев хлорид и пречистена вода.

Как изглежда ВИЗИФРИН АДИФАРМ и какво съдържа опаковката

ВИЗИФРИН АДИФАРМ е течност (прозрачен, безцветен разтвор) и се доставя в опаковка, съдържаща пластмасова бутилка от 15 ml, с капкомер и капачка на винт, запечатана с предпазен пръстен.

Притежател на разрешението за употреба и производител

АДИФАРМ ЕАД

бул. Симеоновско шосе № 130

София 1700, България

Дата на последна актуализация на текста

Март, 2010 г.