

## ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

**ВИТА-МЕРФЕН 1mg/g + 5mg/g + 2000 IU/g Маз**

Хлорхексидинов глюконат/ Бензоксониев хлорид/ /Витамин А

**VITA-MERFEN® 1mg/g + 5mg/g + 2000 IU/g Ointment**

Chlorhexidine gluconate /Benzoxonium chloride /Vitamin A

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВОТА

Листовка - Приложение 2

Към Рез. № ..... 9600198

Разрешение № ..... 22239 / Д. 05.2013

Одобрение № ..... /

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като съдържа важна за вас информация.

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както ви е казал вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.
- Ако след 7 дни не се чувствате по-добре или състоянието ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

### Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява **ВИТА-МЕРФЕН 1mg/g + 5mg/g + 2000 IU/g Маз** и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате **ВИТА-МЕРФЕН 1mg/g + 5mg/g + 2000 IU/g Маз**
3. Как да използвате **ВИТА-МЕРФЕН 1mg/g + 5mg/g + 2000 IU/g Маз**
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате **ВИТА-МЕРФЕН 1mg/g + 5mg/g + 2000 IU/g Маз**
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява **ВИТА-МЕРФЕН 1mg/g + 5mg/g + 2000 IU/g** и за какво се използва

**ВИТА-МЕРФЕН 1mg/g + 5mg/g + 2000 IU/g Маз** съдържа активните вещества хлорхексидинов глюконат и бензоксониев хлорид, които принадлежат към групата лекарствени продукти, наречени антисептици (предотвратяват инфекцията на раните).

**ВИТА-МЕРФЕН 1mg/g + 5mg/g + 2000 IU/g Маз** се използва за дезинфекция на малки рани от всякакъв тип (охлузване, разкъсване, порязване), одрасквания, напуквания, леки изгаряния (малки, повърхностни изгаряния 1<sup>ва</sup> степен и 2<sup>ра</sup> степен) и ухапвания от насекоми. **ВИТА-МЕРФЕН 1mg/g + 5mg/g + 2000 IU/g Маз** улеснява заздравяването на раните.



**2. Какво трябва да знаете, преди да използвате ВИТА-МЕРФЕН 1mg/g + 5mg/g + 2000 IU/g Маз**

**Не използвайте ВИТА-МЕРФЕН 1mg/g + 5mg/g + 2000 IU/g Маз:**

- Ако сте алергични (свръхчувствителни) към активните вещества хлорхексидинов глюконат, бензоксониев хлорид или други кватернерни амониеви съединения по принцип, към витамин А или негови производни (например ретинол-конюгирана киселина), към ланолин (маз, извлечена от вълната на овце или *Adeps lanae*) или някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка б).

**Предупреждения и предпазни мерки**

- **ВИТА-МЕРФЕН 1mg/g + 5mg/g + 2000 IU/g Маз** е предназначен само за външно прилагане.
- Избягвайте контакт с очите, ушите (ушния канал), мукозните мембрани (като тези на устата и носа). В случай на инцидентен контакт с очите, да се измие с обилно количество вода.
- **ВИТА-МЕРФЕН 1mg/g + 5mg/g + 2000 IU/g Маз** не трябва да се поглъща.
- Ако симптомите продължават или състоянието се влоши (раната е подута, болезнена или е придружена с температура) или се появят кожни реакции, спрете използването на **ВИТА-МЕРФЕН 1mg/g + 5mg/g + 2000 IU/g Маз** и се консултирайте с вашия лекар.
- **ВИТА-МЕРФЕН 1mg/g + 5mg/g + 2000 IU/g Маз** не трябва да се използва често или за продължителен период от време без лекарска консултация.

**Други лекарства и ВИТА-МЕРФЕН 1mg/g + 5mg/g + 2000 IU/g Маз**

Не са наблюдавани клинично значими лекарствени взаимодействия поради слабата абсорбция на хлорхексидиновия глюконат и бензоксониевия хлорид.

**Бременност, кърмене и фертилитет**

Бременност

**ВИТА-МЕРФЕН 1mg/g + 5mg/g + 2000 IU/g Маз** може да се използва в малки количества (върху малки рани) по време на бременността.

Не съществуват достатъчно данни за използването на хлорхексидиновия глюконат и бензоксониевия хлорид при бременни жени. Потенциалният риск за хората е с неизвестна честота, но в повечето случаи е много нисък, тъй като хлорхексидиновият глюконат и бензоксониевият хлорид се абсорбират незначително при прилагане върху кожата. Като допълнение, приложението върху кожата витамин А по-вероятно ще влияе при системни дози след нормален дневен прием.

Въпреки всичко, за използването на **ВИТА-МЕРФЕН 1mg/g + 5mg/g + 2000 IU/g Маз** по време на първите три месеца от бременността, моля, обърнете се за съвет към вашия лекар.

Кърмене

**ВИТА-МЕРФЕН 1mg/g + 5mg/g + 2000 IU/g Маз** може да се използва в малки количества (върху малки рани) по време на кърмене, но не трябва да се прилага върху гърдите на кърмачки. Общо предупреждение- изплакнете старателно гърдите с вода преди кърмене.

**Шофиране и работа с машини**



**ВИТА-МЕРФЕН 1mg/g + 5mg/g + 2000 IU/g Маз** не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

**Важна информация за помощните вещества на ВИТА-МЕРФЕН 1mg/g + 5mg/g + 2000 IU/g Маз**

**ВИТА-МЕРФЕН 01mg/g + 5mg/g + 2000 IU/g Маз** съдържа ланолин (маз, извлечена от вълната на овце или *Adeps lanae*), който може да причини локална кожна реакция (напр. контактен дерматит).

### 3. Как да използвате **ВИТА-МЕРФЕН 1mg/g + 5mg/g + 2000 IU/g Маз**

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както ви е казал вашия лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте вашия лекар или фармацевт.

**ВИТА-МЕРФЕН 1mg/g + 5mg/g + 2000 IU/g Маз** е предназначен за прилагане върху кожата. Нанесете тънък слой от **ВИТА-МЕРФЕН 1mg/g + 5mg/g + 2000 IU/g Маз** директно или върху компрес на подлежащата на дезинфекция област. Масажирайте леко, ако не е много болезнено, за да се улесни пенетрацията.

Ако сте използвали повече от необходимата доза **ВИТА-МЕРФЕН 1mg/g + 5mg/g + 2000 IU/g Маз**:

В случай на инцидентно поглъщане, информирайте вашия лекар незабавно.

### 4. Възможни нежелани реакции

Като всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

**Някои нежелани лекарствени реакции са много редки, но биха могли да бъдат сериозни (могат да засегнат по-малко от 1 на всеки 10000 човека):**

- затруднено дишане, замаяност (анафилактична реакция), подуване главно на лицето и гърлото (ангиоедем).

**Незабавно СПРЕТЕ** използването на **ВИТА-МЕРФЕН 1mg/g + 5mg/g + 2000 IU/g Маз** ако вие или вашето дете получите някои от изброените по-горе признаци на алергична реакция.

**Някои нежелани лекарствени реакции са редки (могат да засегнат между 1 и 10 на всеки 10000 човека):**

- кожно раздразнение.

**Някои нежелани лекарствени реакции са много редки (могат да засегнат по-малко от 1 на всеки 10000 човека):**

- копривна треска (уртикария).

### 5. Как да съхранявате **ВИТА-МЕРФЕН 1mg/g + 5mg/g + 2000 IU/g Маз**



- Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
- Да се съхранява под 25 °С.
- Съхранявайте в оригиналната опаковка.
- Не използвайте ВИТА-МЕРФЕН 1mg/g + 5mg/g + 2000 IU/g Маз след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
- Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

### Какво съдържа ВИТА-МЕРФЕН 1mg/g + 5mg/g + 2000 IU/g Маз

Активните вещества са: хлорхексидинов глюконат, бензоксониев хлорид и Витамин А.

Другите съставки (помощни вещества) са : бял пчелен восък, ланолин (маз, извлечена от вълната на овце или *Adeps lanae*), мазилкова основа (Protegin® XN, който съдържа течност- парафин, озокерит или минерален восък, глицеролов моноолеат), глицерол и пречистена вода.

### Как изглежда ВИТА-МЕРФЕН 1mg/g + 5mg/g + 2000 IU/g Маз и какво съдържа опаковката

ВИТА-МЕРФЕН 1mg/g + 5mg/g + 2000 IU/g Маз се разпространява в алуминиева туба с покривен лаков вътрешен слой от фенол-епоксидна смола, затворена с полипропиленова капачка на винт и латексово съединение (в сгънатата част на тубата, която не влиза в контакт с лекарствения продукт).

Опаковка: 20 g.

### Притежател на разрешението за употреба и производител

Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstrasse 40, 81379 München, Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

Салвис Фарма ООД,

1528 София, ул. „Димитър Пешев“ № 5,

Тел.: +359 882 532 901

И-мейл: [pharmacovigilance@salvis-bg.com](mailto:pharmacovigilance@salvis-bg.com)

Дата на последното преразглеждане на листовката

