

VITAMIN B COMPLEX sol.inj.

Информация за пациента

Моля, прочетете внимателно тази листовка преди да започнете лечение. Тя съдържа кратка информация относно Вашето лекарство. Ако не разбирате нещо или имате допълнителни въпроси, обърнете се към Вашия лекуващ лекар. Запазете я, защото може да се наложи да я прочетете отново. Това лекарство е предписано лично на Вас и не трябва да го давате на други. То може да им навреди, дори ако симптомите им са същите като Вашите.

VITAMIN B COMPLEX
ВИТАМИН В КОМПЛЕКС
Инжекционен разтвор

КАКВО СЪДЪРЖА ВИТАМИН В КОМПЛЕКС?

1 ампула инжекционен разтвор 2 ml съдържа:

Лекарствени вещества:

Thiamine hydrochloride (Vitamin B₁) 10 mg;
Riboflavin sodium phosphate as 100 % Riboflavin (Vitamin B₂) 2 mg;
Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B₆) 10 mg,
Nicotinamide (Vitamin PP) 100 mg.

Помощни вещества: динатриев едетат, метил парахидроксибензоат, глицерол, солна киселина, вода за инъекции.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА И ПРОИЗВОДИТЕЛ
СОФАРМА АД

София 1220, ул. "Илиенско шосе" 16, България

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА

Инжекционен разтвор в ампули от 2 ml, по 10 ампули в блистер от PVC фолио, по 1 или 10 блистера в картонена кутия заедно с листовка с указания за употреба.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВИТАМИН В КОМПЛЕКС?

Комбиниран лекарствен продукт, съдържащ витамини от група В и никотинамид, необходими за нормалното функциониране на организма. Участват в обмяната на белтъците, въглехидратите и мазнините.

ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА ВИТАМИН В КОМПЛЕКС?

Продуктът се използва за лечение на заболявания, свързани с дефицит на витамини от група В и никотинамид.

КОГА НЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ВИТАМИН В КОМПЛЕКС?

Не трябва да използвате Витамин В комплекс в следните случаи:

- Свръхчувствителност към лекарствените или помощните вещества
- Хипертонична болест II-III стадий.



ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ЛЕЧЕНИЕ С ВИТАМИН В КОМПЛЕКС

Уведомете лекуващия си лекар, ако имате някакво хронично заболяване, ако сте свръхчувствителни към други лекарства или храни или ако вземате други лекарства.

Предпазни мерки и предупреждения

Преди употреба на Витамин В комплекс инжекционен разтвор е желателно да се направи кожно-алергична проба.

Уведомете лекуващия си лекар, ако страдате от злокачествено заболяване, язва, гастрит, подагра, както ако имате кървене, чернодробни или жлъчни увреждания.

Витамин В₂ в състава на Витамин В комплекс може да оцвети урината в жълто-оранжево.

Бременност и кърмене

Уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете. Преди да вземате някакво лекарство по време на бременност, непременно се консултирайте с лекуващия си лекар.

Бременност

Лекарствения продукт не оказва неблагоприятно влияние върху плода при лечение по време на бременност, ако се прилага в препоръчаните лечебни дози.

Кърмене

Не се препоръчва прием на витамин В комплекс по време на кърмене. В случай, че се налага лечение с него, кърменето трябва да се прекрати.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Витамин В комплекс в препоръчаните дози не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация за помощните вещества

Лекарственият продукт съдържа метилпарахидроксибензоат като помощно вещество, което може да предизвика алергични реакции. Обикновено това са реакции от забавен тип като контактен дерматит. По рядко може да предизвика реакции от бърз тип като уртикария и бронхоспазм.

КАКВИ ЛЕКАРСТВА МОГАТ ДА ВЗАИМОДЕЙСТВАТ С ВИТАМИН В КОМПЛЕКС?

*Моля, уведомете лекуващия си лекар за **ВСИЧКИ** лекарства, които вземате в момента или сте вземали доскоро, независимо дали са предписани от лекар или сте ги купили без рецепта.*

Уведомете лекуващия си лекар, ако приемате медикаменти за лечение на високо кръвно налягане, успокоителни, сънотворни, медикаменти за лечение на депресия, лекарства за лечение на Паркинсонова болест, антиепилептични средства.

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Дозата и продължителността на лечение се определят от лекуващия Ви лекар

Лекарственият продукт се прилага обикновено мускулно и по-рядко венозно в доза 1-2 ml дневно или през ден в продължение на 5-10 дни. След приключване на курса може да се премине на лечение с витамин В комплекс таблетки.

Ако имате чувството, че ефектът на лекарството е много силен или твърде слаб, моля, консултирайте се с лекуващия си лекар.



Ако Ви се приложи повече Витамин В комплекс

В много високи дози продуктът може да предизвика симптоми на свръхдозирание: възбуда, страх, тремор, херпес, безсъние, главоболие, гърчове. В случай на предозирание незабавно се консултирайте с лекуващия си лекар.

Лечението на тези симптоми се провежда от лекар в здравно заведение.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Витамин В комплекс може да има нежелани ефекти. Те обаче не се наблюдават задължително при всички пациенти, така че Вие може да не получите никаква реакция.

Много рядко могат да се появят обриви, сърбеж, оток, особено при предразположени пациенти, чувство за топлина или зачервяване кожата на лицето и шията.

Ако получите нежелани ефекти, включително и такива, които не са споменати в тази листовка, информирайте лекуващия си лекар.

СЪХРАНЕНИЕ

На сухо и защитено от светлина място, при температура под 25°C.

Съхранявайте лекарството в оригиналната опаковка, на сигурно място, където децата не могат да го видят и достигнат.

Да не се замразява!

Лекарството не трябва да се използва след датата на изтичане на срока на годност, отбелязана върху опаковката.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

По лекарско предписание.

Тази листовка е редактирана за последен път на 31.10.2005 г

