

Кратка характеристика на продукта

1. Име на лекарственото средство

Vomitusheel S, suppositories
Вомитусхил S, супозитории

2. Качествен и количествен състав

1 супозитория от 2 g съдържа:

Активни вещества:

Aethusa cynapium	D2	1.1 mg
Apomorphinum hydrochloricum	D4	1.65 mg
Colchicum autumnale	D4	2.75 mg
Psychotria ipecacuanha	D2	1.1 mg
Strychnos ignatii	D4	3.3 mg
Strychnos nux vomica	D2	1.1 mg

За пълния списък на помощните вещества виж точка 6.1

3. Лекарствена форма

супозитории

4. Клинични данни

4.1. Показания

Симптоматично лечение на гадене и повръщане

4.2. Дозировка и начин на приложение

Обикновено, при остро настъпила симптоматика, се поставя по 1 супозитория в ректума на всеки час (до 8 пъти). След овладяване на острата фаза – по 1 супозитория 2-3 пъти дневно.

За кърмачета до 6 м. – по 1 супозитория 2 пъти дневно, което не отменя необходимостта от консултация с педиатър.

4.3. Противопоказания

Няма.

4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба

Ако симптомите продължат или се влошат да се преоценят лечението.

При продължителни или неясни оплаквания трябва да се потърси лекарска консултация, тъй като може да се касае за заболяване, изискващо изследване и специално лечение!

4.5. Лекарствени взаимодействия

Не са известни.

4.6. Бременност и кърмене

Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция е пренебрежимо малка.

4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Кратка характеристика на продукта - Приложение 1	
Към Рег. №	26010231
Разрешение №	Б-17208, 27. 04. 2012
Одобрение №	/

