

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Листовка - Приложение 3	
Към Рег. № <u>20010331</u>	
Разрешение №	12-12-2024
BG/MA/MP -	67320
Одобрение №	

Листовка: информация за потребителя

Вомитусхил S супозитории
Vomitushel S suppositories

Хомеопатичен лекарствен продукт

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след два дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Вомитусхил S и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Вомитусхил S
3. Как да приемете Вомитусхил S
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Вомитусхил S
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Вомитусхил S и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт.
Симптоматично лечение на гадене и повръщане

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Вомитусхил S

Не приемайте Вомитусхил S

- ако сте алергични към някоя от съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Вомитусхил S.

Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар.

Други лекарства и Вомитусхил S

Не са известни лекарствени взаимодействия.

Вомитусхил S с храна, напитки и алкохол

Няма несъвместимости.



Бременност, кърмене и фертилитет

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Вомитусхил S не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини.

3. Как да се прилага Вомитусхил S

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

Обикновено, при остро настъпила симптоматика, се поставя по 1 супозитория в ректума на всеки час (до 8 пъти). След овладяване на острата фаза – по 1 супозитория 2-3 пъти дневно.

Употреба при деца

При деца от 6 до 11 годишна възраст - по 1 супозитория 2 пъти дневно. При остри състояния - до 4 супозитории дневно.

Ако сте приели повече от необходимата доза Вомитусхил S

Вомитусхил S няма доза на предозиране.

Ако сте пропуснали да приемете Вомитусхил S

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.

Ако сте спрели употребата на Вомитусхил S

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Вомитусхил S може да причини нежелани реакции, въпреки че не всички ги получават.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.



5. Как да съхранявате Вомитусхил S

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца!

Срок на годност – 3 години.

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Вомитусхил S

1 супозитория от 2 g съдържа:

- Активни вещества:

Aethusa cynapium	D2	1,1 mg
Apomorphinum hydrochloricum	D4	1,65 mg
Colchicum autumnale	D4	2,75 mg
Psychotria ipecacuanha	D2	1,1 mg
Strychnos ignatii	D4	3,3 mg
Strychnos nux vomica	D2	1,1 mg

- Други съставки (помощни вещества): Твърда маз.

Как изглежда Вомитусхил S и какво съдържа опаковката

Двуслойна лента от бяло, твърдо PVC-фолио с по 12 супозитории, поставени в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Германия

Phone: 0049 (0)7221 501 00, Fax: 0049 (0)7221 501 485

E-Mail: info@heel.com

Дата на последно преразглеждане на листовката

11/2023

