

## Листовка: информация за пациента

**Х-Преп 75 ml перорален разтвор  
X-Prep 75 ml oral solution**

остролистна сена, сух стандартизиран екстракт от плод  
dry Senna extract

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

**Какво съдържа тази листовка**

1. Какво представлява Х-Преп и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Х-Преп
3. Как да приемате Х-Преп
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Х-Преп
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

**1. Какво представлява Х-Преп и за какво се използва**

Х-Преп съдържа стандартизиран сух екстракт от плодовете на остролистна сена, който принадлежи към групата на слабителните вещества.


Х-Преп е разтвор за приемане през устата и се използва за пълно почистване на дебелото черво преди рентгенови прегледи и други диагностични изследвания и хирургични манипулации, в случай че не е постигнат достатъчен ефект само с електролитни разтвори или тяхното прилагане е невъзможно.

**2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Х-Преп****Не приемайте Х-Преп**

- ако сте алергични към сух екстракт от плодовете на остролистна сена (сенозиди) или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- при запушване на червата и стеноза;
- остър хирургичен корем;
- при болка в корема от неизвестен произход;
- при остри хронични възпалителни заболявания на червата (например болест на Хрон, улцерозен колит) или апендицит;
- при илеус (чревна непроходимост);
- при тежко обезводняване със загуба на течности и електролити.

При остри хронични възпалителни заболявания или апендицит, Х-Преп може да се използва само след консултация с лекар.

Х-Преп не трябва да се използва при деца под 3 годишна възраст. Пациентите в старческа възраст трябва да приемат вода в големи количества при прилагане на Х-Преп.



### **Предупреждения и предпазни мерки**

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете X-Преп.

Специално внимание трябва да се обърне от пациентите с неспособност за задържане на изпражнения или урина. Избягвайте продължителен контакт между кожата и изпражненията, като често сменяте пелените.

Пациенти в старческа възраст, пациенти с астения и тегло под нормата, и пациенти с лабилно кръвообращение са рискови по отношение на колапс поради загуба на течности. Тези пациенти трябва да приемат големи количества вода (вижте точка 3 „Как да приемате X-Преп“).

### **Деца**

Не давайте това лекарство на деца под 3 годишна възраст.

### **Други лекарства и X-Преп**

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

При едновременно лечение с дигиталисови препарати, ефектът на сърдечните гликозиди може да бъде засилен поради недостиг на калий.

Ефектът на други едновременно приемани лекарства може да бъде намален поради намаленото време на престой в червата.

### **X-Преп с храна, напитки и алкохол**

След приемане на X-Преп не трябва да пиете мляко. За повече информация вижте точка 3 „Как да приемате X-Преп“).

### **Бременност, кърмене и фертилитет**

По време на бременност и кърмене X-Преп не трябва да се използва.

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

### **Шофиране и работа с машини**

Поради алкохолното съдържание на X-Преп е възможно нарушение на реакциите.

### **X-Преп съдържа 2,75 обемни % алкохол и захароза.**

При спазване на указанията за дозиране при всяка доза (съдържанието на 1 бутилка) се приемат до 1,75 g алкохол. Това представлява известен риск при пациенти с чернодробни заболявания, алкохолици, епилептици, пациенти с мозъчни увреждания, бременни, кърмещи жени и деца. X-Преп съдържа 49,5 g захароза на бутилка и трябва да се използва внимателно при диабетици.

## **3. Как да приемате X-Преп**

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

### **В деня преди изследването**


Сутрин - обичайна закуска.

На обяд трябва да се приеме течна храна, например бистър бульон, лека супа, чай или кафе.

В 14 часа след обяд се приема съдържанието на 1 бутилка с голяма чаша течност (вода или чай). Не трябва да се пие мляко!

Дозата (максимална дозировка) не трябва да надвишава 150 mg хидроксиантраценови деривати еквивалентни на 75 ml разтвор X-Преп (= 1 бутилка).

При деца над 3 години и при възрастни с тегло под нормата препоръчаната доза е 1 ml X-Преп на kg телесно тегло.



След приема на X-Преп на всеки час до времето за лягане трябва да се изпива по една голяма чаша течност (общо 2-3 литра). До завършване на изследването не трябва да се приема храна. Изпразването на дебелото черво става 5 до 8 часа след приемане на X-Преп. При малки деца над 3 годишна възраст и пациенти в старческа възраст, както и при пациенти с астения и тегло под нормата, трябва да се обърне голямо внимание на приемането на достатъчно течности. Не са необходими специални диетични мерки.

#### В деня на изследването

Да не се закусва. Позволен са само негазирани напитки. Преди рентгенови изследвания на бъбреците (пиелографии) в деня на изследването не трябва да се пият течности.

#### **Ако сте приели повече от необходимата доза X-Преп**

В случай на предозиране потърсете незабавно лекарска помощ.

Признаците на предозиране са пронизваща болка и тежка диария, загуба на течности и електролити, и риск от колабиране.

Необходимите мерки включват възстановяване на водно-електролитния баланс (особено калиевия), ако е необходимо лечение на шока и елиминиране на токсините.

#### **4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Честотата на възможните нежелани реакции изброени по-долу се определя като се използва следната спогодба:

Много чести: могат да засегнат повече от 1 на 10 човека

Чести: могат да засегнат до 1 на 10 човека

Нечести: могат да засегнат до 1 на 100 човека

Редки: могат да засегнат до 1 на 1 000 човека

Много редки: могат да засегнат до 1 на 10 000 човека

С неизвестна честота: от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата

Чести нежелани реакции са: болки в корема.

Нечести нежелани реакции са: потъмняване на изпражненията, гадене, ректално кървене, повръщане, уртикария, оцветяване на урината, обрив и раздразнение около ануса.

В редки случаи се съобщава за затруднено дишане и ниско кръвно налягане (хипотония) с риск от колапс.

Анафилактични и анафилактоидни (видове алергични) реакции са много редки.


Диария, свъхчувствителност, сърбеж, утежнен съществуващ недостиг на електролити и червено оцветяване на урината са с неизвестна честота.

Потъмняването на цвета на урината или изпражненията се дължи на наличието на определено вещество и е без клинично значение. Това потъмняване може да повлияе разчитането на лабораторните резултати.

Пациенти с тегло под нормата и пациенти с риск от колапс трябва да приемат големи количества течности.

#### **Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, в Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, Тел.: +35 928903417, уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg). Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.



## 5. Как да съхранявате X-Преп

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.  
Да се съхранява под 25°C.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

### Какво съдържа X-Преп

- Активното вещество е: стандартизиран сух екстракт от плодовете на остролистна сена, 1,92 – 2,76 g, стандартизиран по съдържание на хидроксиантрацен гликозид, изчислен като сенозид В 150 mg.
- Другите съставки са: етанол, захароза, калиев сорбат, малтодекстрин, какаов ароматизатор, пречистена вода.

### Как изглежда X-Преп и какво съдържа опаковката

X-Преп е светло-кафява сироповидна течност с вкус и мирис на сладък шоколад.  
Разтвор за приемане през устата в полипропиленова бутилка от 75 ml с алуминиева капачка.  
Опаковка от 1 бутилка.

### Притежател на разрешението за употреба и производител

#### Притежател на разрешението за употреба

Mundipharma Gesellschaft m.b.H.  
Apollogasse 16-18  
1070 Wien  
Австрия

#### Производител

Fidelio Healthcare Limburg GmbH  
65549 Limburg (Lahn)  
Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:  
Мундифарма Медикъл ООД Представителство в България  
тел.: 02 962 1354/56  
факс: 02 962 1357

Дата на последно преразглеждане на листовката 10/2018.

