

## **ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА**

200200807/86  
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА BG/ММ/МР-44682-3  
19-02-2019

**XYLOPHARM® 0,05% капки за нос, разтвор  
КСИЛОФАРМ 0,05% капки за нос, разтвор**

**XYLOPHARM® 0,1% капки за нос, разтвор  
КСИЛОФАРМ 0,1% капки за нос, разтвор**

*Ксилометазолин (xylometazoline)*

- Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете лечение. Тя съдържа кратка информация относно Вашето лекарство.
- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**В тази листовка:**

1. Какво представлява XYLOPHARM® и за какво се използва
2. Преди да приложите XYLOPHARM®
3. Как да прилагате XYLOPHARM®
4. Възможни нежелани ефекти
5. Съхранение на XYLOPHARM®
6. Допълнителна информация

**1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА XYLOPHARM® И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА**  
XYLOPHARM® съдържа лекарствено вещество от групата на така наречените деконгестанти. При накапване в носа действа директно върху кръвоносните съдове (arterии и вени) в носната лигавица като предизвиква свиването им. В резултат на това притока на кръв към носа и синусите намалява, отока на лигавицата спада, отделянето на секрети намалява, проходимостта на носните ходове и дишането се подобряват. Ефектът на лекарството настъпва бързо (2-3 минути) и продължава от 6 до 12 часа.

XYLOPHARM® се използва за повлияване на отока при остьр, вазомоторен и алергичен ринит; за подпомагане дренажа на секретите при синузити; в комплексната терапия на възпаление на средното ухо, за отбъбване на лигавицата в носогълътката.

XYLOPHARM® капки за нос 0,1% е предназначен за приложение при възрастни и деца над 12 годишна възраст.

**2. ПРЕДИ ДА ПРИЛОЖИТЕ XYLOPHARM®**

**Не трябва да се прилага XYLOPHARM®:**

- Ако сте алергични (с повишена чувствителност) към лекарственото вещество ксилометазолин или някое от помощните вещества на продукта;



- При операции, които са извършени през носа;
- Хроничен атрофичен ринит;
- Новородени, кърмачета и деца до 2 годишна възраст.

**Предупредете лекуващия лекар ако имате:**

- Заболявания на сърцето (например синдром на удължен QT интервал, исхемична болест, ритъмни нарушения);
- Високо кръвно налягане;
- Заболяване на щитовидната жлеза (тиреотоксикоза);
- Повищено вътречно налягане (глаукома);
- Уголемяване на простатата;
- Диабет.

**Прием на други лекарства**

***Моля информирайте Вашия лекар ако приемате или накоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускати без рецепт.***

Въпреки че XYLOPHARM® е лекарство, което се прилага в носа, е възможно, макар и рядко, да взаимодейства с лекарства, които се приемат през устата. Не прилагайте XYLOPHARM® ако приемате или сте приемали през последните 2 седмици лекарства за лечение на депресия и паркинсонизъм (антидепресанти и МАО-инхибитори).

**Бременност и кърмене**

***Посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на което и да е лекарство, ако сте бременна или планирате да забременеете.***

Приложението на XYLOPHARM® по време на бременност е възможно само в случаите на сериозни медицински показания за това. Необходимо е да се избягва приложението му по време на кърмене, тъй като няма данни дали лекарственото вещество се екскретира в кърмата.

**Влияние върху способността за шофиране и работа с машини**

XYLOPHARM®, при продължителна употреба и във високи дози, макар и рядко, може да предизвика виене на свят, трепор, нарушение на сърдечния ритъм, повишаване на кръвното налягане. В тези случаи способността Ви за шофиране и работа с машини може да бъде нарушена.

### 3. КАК ДА ПРИЛАГАТЕ XYLOPHARM

***Прилагайте XYLOPHARM® като спазвате инструкциите в тази листовка или както Ви е препоръчал лекуващия лекар. Ако не сте сигурни, попитайте Вашия лекар или фармацевт.***


За да накапете капките в носа трябва да сте с наклонена назад глава. При прилагането на лекарството се постарате да не докосвате вътрешната повърхност на ноздрите с откапващото устройство.

Не прилагайте същото флаконче с капки за нос и откапващото устройство на други болни за да се избегне разпространяването на инфекцията!

Не превишавайте дозата, посочена в тази листовка!

Не прилагайте лекарството повече от 5 дни. Продължителното лечение може да предизвика увреждане на носната лигавица и хронично запушване на носа (конгестия). Ако не сте почувствали облекчение на симптомите, консултирайте се с лекар.

При необходимост от повторно лечение с XYLOPHARM®, започнете приложението на капките след прекъсване от няколко дни.



Лекарството не трябва да се прилага по-често от 2-3 пъти дневно (през 8 – 10 часов интервал).

**XYLOPHARM капки за нос 0,1%**

При възрастни и деца над 12-годишна възраст се прилагат по 1-2 капки от разтвора във всяка ноздра 2-3 пъти дневно.

**XYLOPHARM капки за нос 0,05%**

При деца от 6 до 12-годишна възраст се прилагат по 2-3 капки от разтвора във всяка ноздра 2-3 пъти дневно.

При деца от 2 до 6-годишна възраст се прилагат по 1-2 капки от разтвора във всяка ноздра 2-3 пъти дневно.

*Ако имате никакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.*

**Ако сте приложили повече капки XYLOPHARM® от необходимото**

При предозиране или случайно поглъщане могат да се наблюдават следните симптоми: силно главоболие, гадене, повръщане, разширение на зениците, повишаване на кръвното налягане, сърдебиене, загуба на съзнанието. В някои случаи могат да се наблюдават сънливост, понижаване на телесната температура, забавяне на сърдечния ритъм, рязко спадане на артериалното налягане.

При появя на тези симптоми потърсете лекарска помощ.

**Ако сте пропуснали да приложите XYLOPHARM®**

Ако сте пропуснали една доза, приложете капките за нос колкото е възможно по-скоро. Ако почти е станало време за следващото приложение на лекарството, приложете го както обикновено. Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Продължете да прилагате лекарството, както е посочено в тази листовка или Ви е предписано от лекар.

#### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

*Както всички лекарства, XYLOPHARM® може да има нежелани ефекти. Те обаче не се наблюдават задължително при всички пациенти, така че Вие може да не получите никаква реакция.*

При употребата на XYLOPHARM®, особено при по-чувствителни пациенти, могат да се наблюдават реакции на мястото на приложение като чувство на парене, сухост на носната лигавица и фарингса. При продължителна употреба във високи дози могат да се появят, макар и рядко, следните нежелани лекарствени реакции: главоболие, световъртеж, безсъние, ускоряване на сърдечния пулс, повишаване на кръвното налягане, засилване отока на носната лигавица и влошаване проходимостта на носните ходове.

*Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.*

#### **5. СЪХРАНЕНИЕ НА XYLOPHARM®**

Съхранявайте лекарството в оригиналната опаковка, на защитено от светлина място, при температура под 25°C!

Съхранявайте лекарството на сигурно място, където децата не могат да го видят и достигнат.

Лекарството не трябва да се използва след изтичане срока на годност, отбелязан на опаковката.



Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Създайте си навик да връщате неизползваните или стари лекарства на Вашия фармацевт.



## **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

### **Какво съдържа XYLOPHARM®**

#### **XYLOPHARM® капки за нос 0,05%**

В 1 мл разтвор се съдържа лекарствено вещество ксилометазолин хидрохлорид (*xylometazoline hydrochloride*) 0,5 мг.

#### **XYLOPHARM® капки за нос 0,1%**

В 1 мл разтвор се съдържа лекарствено вещество ксилометазолин хидрохлорид (*xylometazoline hydrochloride*) 1 мг.

Другите съставки са натриев хлорид, дисодиум ЕДТА, HCl, триетаноламин, бензалкониев хлорид, пречистена вода.

### **Как изглежда XYLOPHARM® и какво съдържа опаковката**

По 10 мл бистър, безцветен разтвор в бяла, непрозрачна бутилка от полипропилен с капачка с осигурителен пръстен от полиетилен. По 1 бутилка се поставя в картонена кутия, заедно с откапващо устройство и листовка.

### **Притежател на разрешението за употреба**

СОФАРМА АД

ул. Илиенско шосе 16, 1220 София, България

### **Производител**

СОФАРМА АД

ул."Тр. Станоев" 3, 1797 София, България

**Последна редакция на текста: Януари 2019 г.**

