

<b>Симптоми</b>	<b>Приблизително в брой пациенти (когато са налични) при които се среща симптома</b>
Аплазия на мускулатурата на коремната стена	Много често (присъствие в 80% -99% от случаите)
Аплазия / хипоплазия на белите дробове	Много често (присъствие в 80% -99% от случаите)
Вродена задна уретрална клапа	Много често (присъствие в 80% -99% от случаите)
Крипторхизъм	Много често (присъствие в 80% -99% от случаите)
Намалена плодовитост	Много често (присъствие в 80% -99% от случаите)
Хидроуретер / разширен уретер /	Много често (присъствие в 80% -99% от случаите)
Неоплазма на тимуса/	Много често (присъствие в 80% -99% от случаите)
Везикоуретрален рефлукс/Връщане на част от урината в уретерите/	Много често (присъствие в 80% -99% от случаите)
Аномалии на ребрата	Често срещан (в 30% -79% от случаите)
Болка в гърдите	Често срещан (в 30% -79% от случаите)
Запек	Често срещан (в 30% -79% от случаите)
Кашлица	Често срещан (в 30% -79% от случаите)
Намален ртазмер на тестисите	Често срещан (в 30% -79% от случаите)
Парализа на диафрагмата	Често срещан (в 30% -79% от случаите)
Дисгамаглобулинемия/нивото на гама-глобулини, измерено чрез електрофореза на серумни протеини, е намалено./	Често срещан (в 30% -79% от случаите)
Задух	Често срещан (в 30% -79% от случаите)
Имунодефицит	Често срещан (в 30% -79% от случаите)
Медиастенална лимфаденопатия	Често срещан (в 30% -79% от случаите)
Поликистозна бъбречна дисплазия	Често срещан (в 30% -79% от случаите)
Олигохидрамнион Намалено количество на околоплодните води спрямо срока на	Често срещан (в 30% -79% от случаите)

бременността	
Палпебрален оток	Често срещан (в 30% -79% от случаите)
Рецидивиращи респираторни инфекции	Често срещан (в 30% -79% от случаите)
Рецидивиращи инфекции на пикочните пътища	Често срещан (в 30% -79% от случаите)
Бъбречна недостаточност	Често срещан (в 30% -79% от случаите)
Аномално кървене	случаен(в 5% -29% от случаите)
Аномалия на матката	случаен(в 5% -29% от случаите)
Анална атрезия	случаен(в 5% -29% от случаите)
Дефект на предсърдната стена	случаен(в 5% -29% от случаите)
Авроимунни заболявания	случаен(в 5% -29% от случаите)
Сърдечен арест	случаен(в 5% -29% от случаите)
Увреждане конюктивата	случаен(в 5% -29% от случаите)
Вродено изкривяване на тазобедрената става	случаен(в 5% -29% от случаите)
Дисфагия / нарушение в гълтането/	случаен(в 5% -29% от случаите)
Нарушение в растежа	случаен(в 5% -29% от случаите)
Лесна уморяемост/слабост	случаен(в 5% -29% от случаите)
Главоболие	случаен(в 5% -29% от случаите)
Повишено вътречерепно налягане	случаен(в 5% -29% от случаите)
Чревна атрезия/чревна непроходимост	случаен(в 5% -29% от случаите)
Непълно завъртане на червата	случаен(в 5% -29% от случаите)
Увреждане на езика	случаен(в 5% -29% от случаите)
Невроендокринна неоплазма	случаен(в 5% -29% от случаите)
Открит артериален /Боталов/ проток	случаен(в 5% -29% от случаите)
Хлътнал гръден кош	случаен(в 5% -29% от случаите)
Перикардит	случаен(в 5% -29% от случаите)
Птоза/спадане на клепача/	случаен(в 5% -29% от случаите)
Сколиоза	случаен(в 5% -29% от случаите)
Вродено криво стъпало /еквиноварус	случаен(в 5% -29% от случаите)
Тетралогия на Фало	случаен(в 5% -29% от случаите)
Урогенитална синусова аномалия	случаен(в 5% -29% от случаите)
Вентрикуларен септален дефект	случаен(в 5% -29% от случаите)
Дефекти на част от гръбначния стълб .	случаен(в 5% -29% от случаите)
Завъртане на част от стомашно-чревния тракт около оста му Вид илеус .	случаен(в 5% -29% от случаите)

Източник : <https://ojrd.biomedcentral.com>